

ブドウ

- ・べと病：平年比やや少なかった。
- ・うどんこ病・さび病：発生を認めなかった(平年並)。
- ・褐斑病：山科区①②で発生を認め、平年比やや多かった。
- ・ハダニ類：発生を認めなかった(平年並)。
- ・その他の病害虫：発生を認めなかった。

ブドウ巡回調査結果（100葉調査）（単位：％）

調査：令和元年8月13、15日

| 調査結果 | べと病 | | うどんこ病 | | さび病 | | 褐斑病 | | ハダニ類 | |
|-----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 寄生葉率 | ほ場率 |
| 京都市山科区 ① | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 25.0 | | 0.0 | |
| ” ② | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.0 | | 0.0 | |
| 京丹後市久美浜町① | 20.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| ” ② | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| ” ③ | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| ” ④ | 9.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 元年 | 4.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 平年比 | 並 | 少 | 並 | 並 | 並 | 並 | やや多 | 多 | 並 | 並 |
| 平 年 | 12.5 | 67.0 | 0.2 | 5.0 | 1.3 | 13.3 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 4.0 |
| 30年 | 4.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29年 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28年 | 3.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27年 | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26年 | 1.8 | 50.0 | 1.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25年 | 10.5 | 83.3 | 0.2 | 16.7 | 4.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24年 | 19.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23年 | 16.8 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22年 | 30.4 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.8 | 40.0 |
| 21年 | 23.2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

発生程度別基準

| | (%) | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | べと病 発病葉率 | さび病 発病葉率 | 褐斑病 発病葉率 | ハダニ類 寄生葉率 |
| 無 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少 | 1～10 | 1～10 | 1～10 | 1～10 |
| 中 | 11～30 | 11～30 | 11～30 | 11～20 |
| 多 | 31～50 | 31～70 | 31～70 | 21～40 |
| 甚 | 51以上 | 71以上 | 71以上 | 41以上 |