

# ブドウ

- ・べと病は、発生を認めなかった（平年比やや少ない）。
- ・うどんこ病・さび病・褐斑病は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・灰色かび病は、発生を認めなかった。
- ・ハダニ類は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・チャノキイロアザミウマは、発生を認めなかった。

ブドウ巡回調査結果（100葉、50果穂調査）（単位：％）

令和2年6月16、17日

調査結果	べと病			うどんこ病			灰色かび病		さび病		褐斑病		ハダニ類		チャノキイロアザミウマ	
	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	被害果穂率	ほ場率
京都市山科区 ①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ③	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ④	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	やや少	-	やや少	並	-	並	-	-	並	並	並	並	並	並	-	-
平年	0.9	-	24.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.3	-	-
R元年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H29年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	33.3	0.7	16.7
H28年	0.8	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H27年	2.8	-	33.3	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
H26年	3.0	-	66.7	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
H25年	1.0	-	33.3	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
H24年	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
H23年	1.0	-	40.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	20.0	-	-
H22年	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

発生程度別基準

(%)

	べと病		うどんこ病	灰色かび病	さび病	褐斑病	ハダニ類	チャノキイロアザミウマ
	発病葉率	発病花穂率	発病花穂率	発病花穂率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	被害果穂率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1~10	1~10	1~5	1~10	1~10	1~10	1~10	1~10
中	11~30	11~30	6~15	11~30	11~30	11~30	11~20	11~30
多	31~50	31~50	16~30	31~50	31~70	31~70	21~40	31~50
甚	51以上	51以上	31以上	51以上	71以上	71以上	41以上	51以上