ブドウ

・べと病は平年並の発生であった。
・うどんこ病、さび病、褐斑病は発生を認めなかった(平年並)。
・ハダニ類は発生を認めなかった(平年並)。
・果房調査は久美浜町③のみで行い、病害虫の発生は認めなかった。
・山科区②でマメコガネの発生を認めた。

発生程度別基準　　（%）

	べと病	さび病	褐斑病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	１～１０	１～１０	１～１０	１～１０
中	１１～３０	１１～３０	１１～３０	１１～２０
多	３１～５０	３１～７０	３１～７０	２１～４０
甚	５１以上	７１以上	７１以上	４１以上

ブドウ巡回調査結果（１００葉調査）　　調査日：令和４年７月１４日

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類		備考
	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	寄生葉率(%)	ほ場率(%)	
京都市山科区　①	1.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　②	3.0		0.0		0.0		0.0		0.0		マメコガネの発生を認めた。
京丹後市久美浜町①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　②	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　③	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　④	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Ｒ４年	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	
平　年	3.5	41.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.1	3.3	
Ｒ３年	0.2	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｒ２年	0.8	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0	
Ｒ元年	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ３０年	15.8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２９年	1.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	33.3	
Ｈ２８年	5.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２７年	6.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２６年	1.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２４年	4.2	60.0	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	