

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病・・・平年比やや多かった。
- 2 白さび病・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 3 モザイク病・・・木津川市①の調査外で発生を認めた（平年比やや多）。
- 4 アブラムシ類・・・平年並の発生であった。
- 5 コナガ・・・平年比やや多かった。
- 6 ハスモンヨトウ・・・平年比やや多かった。
- 7 ハイマダラノメイガ 平年並の発生であった。
- 8 その他の病害虫・・・ダイコンハムシの発生を認めた（木津川市①：幼虫数0.8頭/10株、寄生株率8.0%）。ウワバ類の発生を認めた（木津川市①：幼虫数0.4頭/10株、寄生株率4.0%）。
白斑病の発生を認めた（木津川市①：発病株率24.0%）。

発生程度別基準

調査項目	無	少	中	多	甚
モザイク病 発病株率(%)	0	1～20	21～40	41～70	71以上

ダイコン調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和4年10月11、12日

調査場所	黒斑細菌病	白さび病	モザイク病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	
木津川市 ①	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	4.0	1.2	12.0	0.0	1.6	16.0	0.0	0.0	
木津川市 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市弥栄町	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	R4年	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.3	3.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0
	平年(例年)比	やや多	並	並	並	並	並	やや多	やや多	並	やや多	多	並	並
	平年(例年)	2.2	0.2	0.0	0.0	3.0	3.0	0.2	1.0	0.0	1.1	0.7	1.1	7.4
	R3年	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	10.0	1.0	0.2	2.0
	R2年	20.8	0.7	0.0	0.2	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.9
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.1	16.8	10.9	0.1	0.6	0.0	0.1	1.1	0.3	2.9
	H29年	0.0	1.6	0.0	0.0	7.6	2.4	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	0.1	0.8
	H27年	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発生 ほ場率 (%)	R4年	25.0	0.0	25.0	25.0			25.0		25.0			0.0	
	平年(例年)比	やや多	並	多	並			やや多		やや多			並	
	平年(例年)	6.5	3.7	4.2	24.8			8.4		12.9			35.1	
	R3年	25.0	0.0	25.0	0.0			50.0		25.0			50.0	
	R2年	0.0	16.7	16.7	33.3			0.0		16.7			0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	42.9			0.0		0.0			85.7	
	H30年	0.0	0.0	0.0	71.4			14.3		14.3			28.6	
	H29年	0.0	20.0	0.0	40.0			20.0		0.0			0.0	
	H28年	40.0	0.0	0.0	20.0			0.0		40.0			20.0	
	H27年	0.0	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			0.0	
H26年	0.0	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			0.0		
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		33.3			100.0		
H24年	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			66.7		