

ホウレンソウ

病害虫発生状況

- 1 ベと病発生を認めなかった（平年並）。
- 2 アブラムシ類発生を認めなかった（平年並）。
- 3 ヨトウガ発生を認めなかった（平年並）。
- 4 シロオビノメイガ発生を認めなかった（平年並）。
- 5 ハダニ類発生を認めなかった。
- 6 その他病害虫とくになし

ホウレンソウ調査結果（25株調査：害虫個体数は1株換算）

調査日：令和元年11月12日

調査場所	べと病	アブラムシ類		ヨトウガ		シロオビノメイガ		ハダニ類	葉数 (枚)	
	発病株率(%)	虫数(/株)	寄生株率(%)	幼虫数(/株)	寄生株率(%)	幼虫数(/株)	寄生株率(%)	寄生株率(%)		
西京①	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	7.1	
西京②	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	7.3	
西京③	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	4.6	
久御山①	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	3.7	
久御山②	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	4.0	
平均	元年	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	5.3
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	—	—
	平年	0.0	0.02	1.7	0.00	0.0	0.003	0.3	—	5.2
	30年	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	5.1
	29年	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	7.0
	28年	0.0	0.03	3.2	0.00	0.0	0.00	0.0	—	3.7
	27年	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	—	5.4
	26年	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	—	4.7
	25年	0.0	0.01	1.0	0.00	0.0	0.00	0.0	—	5.3
	24年	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	—	4.4
	23年	0.0	0.05	5.0	0.00	0.0	0.02	2.0	—	5.6
	22年	0.0	0.13	7.0	0.00	0.0	0.00	0.0	—	5.4
21年	0.0	0.01	1.0	0.00	0.0	0.01	1.0	—	5.3	
発生 ほ場率 (%)	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	平年比	並	並	並	並	並	並	—		
	平年	0.0	25.0	0.0	0.0	7.5	—			
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	28年	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	—			
	27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—			
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—			
	25年	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	—			
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—			
	23年	0.0	75.0	0.0	0.0	50.0	—			
	22年	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	—			
21年	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	—				