

# イネ

## 病害虫の発生状況

- (1) 葉いもち  
京丹波町蒲生でのみ発生を認めた。  
府全体では平年比やや少ない発生。
- (2) 穂いもち  
京都市京北下弓削町及び京丹波町蒲生でのみ発生を認めた。  
府全体では平年比やや少ない発生。
- (3) 紋枯病  
**山城及び南丹では平年並、中丹では平年比多く、丹後では平年比やや多い発生。**  
府全体では平年比やや多い発生。
- (4) 白葉枯病  
発生を認めなかった。
- (5) 縞葉枯病  
発生を認めなかった。
- (6) ばか苗病  
木津川市加茂町大野で発生を認めた。
- (7) ツマグロヨコバイ  
中丹では、本田見取り及びすくい取り調査ともに平年比やや多い発生であったが、  
府全体では平年比少ない発生。
- (8) セジロウンカ  
本田見取り調査では平年比やや少ない発生。  
本田すくい取り調査では平年比少ない発生。
- (9) トビイロウンカ  
本田見取り及びすくい取り調査では発生を認めなかった。(平年並)  
**予察灯調査では、京田辺市で8月8日に雄成虫1頭の誘殺を認めた。**
- (10) ニカメイガ  
丹後の一部ほ場(調査定点外)で発生を認めた。
- (11) コブノメイガ  
**確認ほ場率は平年比やや多い発生となったが、被害葉率は平年並であった。**
- (12) 斑点米カメムシ類  
**本田すくい取り調査では丹後で平年比多い発生。**  
府全体では平年並の発生。**ケヘリカメムシ、ホリカメムシ及びアカシガシカメの発生が目立つ。**  
**畦畔すくい取り調査では中丹で平年比やや多く、丹後で平年比多い発生。**  
府全体では平年並の発生。  
**ケヘリカメムシ、シホカメムシ及びアカシガシカメの発生が目立つ。**
- (13) スクミリンゴガイ  
山城及び南丹の一部で発生を認めた。
- (14) その他
  - ・ごま葉枯病：京都市京北下弓削町で発生を認めた。
  - ・イトトムシ、フタオビコヤガ及びトウムシ類(クシロキトリ?)：一部のほ場で発生を認めた。
  - ・コバネイナゴ、ササキリ：広域で発生を認めた。

発病・発生程度別基準

		無	少	中	多	甚
葉いもち	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
穂いもち	発病穂率	0	1~10	11~30	31~60	61以上
紋枯病	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
セジロウンカ	25株当たり虫数	0	1~250	~1250	~2500	2501以上
	すくい取り虫数	0	1~100	101~300	301~700	701以上
ヒメトビウンカ	25株当たり虫数	0	1~50	~125	~250	251以上
	すくい取り虫数	0	1~10	11~30	31~100	101以上
ツマグロヨコバイ	25株当たり虫数	0	1~125	~375	~750	751以上
	すくい取り虫数	0	1~50	51~750	751~1500	1501以上
斑点米カメムシ類	すくい取り虫数(本田)	0	1~3	4~10	11~30	31以上
イネクロカメムシ	25株当たり虫数	0	1~5	6~10	11~25	25以上
ニカメイガ	被害株率	0	1~30	31~60	61~90	91以上
イトトムシ	25株当たり幼虫数	0	1~10	11~20	21~40	41以上
フタオビコヤガ	25株当たり幼虫数	0	1~25	26~100	101~250	251以上
コブノメイガ	被害葉率	0	1~5	6~15	16~45	46以上

表1 葉いもち調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*
元年	0.0	0.0	0.00	11.1	0.4	0.11	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	3.3	0.1	0.03
平年比	やや少	並	並	やや少	少	並	並	並	並	並	並	並	少	少	やや少
	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	やや少
平年	25.0	2.6	0.05	27.8	6.7	0.15	11.7	0.8	0.11	13.3	2.0	0.07	19.7	3.4	0.10
30年	16.7	0.0	0.00	44.4	7.6	0.20	16.7	0.0	0.00	55.6	5.3	0.25	36.7	3.9	0.13
29年	16.7	0.7	0.00	11.1	2.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.9	0.00
28年	50.0	3.3	0.04	22.2	2.7	0.06	16.7	1.3	0.01	44.4	4.4	0.08	33.3	3.1	0.05
27年	0.0	0.0	0.00	11.1	1.8	0.00	33.3	2.0	1.00	0.0	0.0	0.00	10.0	0.9	0.20
26年	50.0	13.3	0.33	22.2	10.7	0.18	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	16.7	5.9	0.12
25年	66.7	7.0	0.11	33.3	12.0	0.38	16.7	1.3	0.07	0.0	0.0	0.00	26.7	5.3	0.15
24年	0.0	0.0	0.00	33.3	3.1	0.00	0.0	0.0	0.00	11.1	8.4	0.34	13.3	3.5	0.10
23年	16.7	0.7	0.00	22.2	1.3	0.00	33.3	3.3	0.06	0.0	0.0	0.00	16.7	1.2	0.01
22年	0.0	0.0	0.00	44.4	13.3	0.50	0.0	0.0	0.00	11.1	1.3	0.05	16.7	4.4	0.17
21年	33.3	1.3	0.01	33.3	12.0	0.21	0.0	0.0	0.00	11.1	0.8	0.01	20.0	4.8	0.07

※詳細は表12参照。 \* 発病葉率は上位2葉調査

表2 穂いもち調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率
元年	0.0	0.0	0.00	22.2	0.9	0.03	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.3	0.01
平年比	並	並	並	並	並	やや少	並	並	並	並	並	並	並	やや少	少
	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	やや少
平年	14.3	0.6	0.03	21.1	4.8	0.20	8.3	1.2	0.07	4.4	0.3	0.02	11.4	2.1	0.10
30年	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
29年	0.0	0.0	0.00	77.8	10.4	0.62	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	28.0	3.8	0.22
28年	100.0	4.0	0.20	33.3	3.6	0.23	66.7	7.3	0.41	22.2	0.9	0.07	40.0	3.5	0.21
27年	0.0	0.0	0.00	11.1	1.3	0.07	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	4.0	0.5	0.03
26年	0.0	0.0	0.00	22.2	6.7	0.42	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	8.0	2.4	0.15
25年	-	-	-	11.1	9.8	0.29	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	3.3	3.7	0.11
24年	-	-	-	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	11.1	1.8	0.08	3.3	0.7	0.03
23年	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	16.7	4.7	0.28	0.0	0.0	0.00	3.3	1.1	0.07
22年	-	-	-	33.3	4.0	0.17	0.0	0.0	0.00	11.1	0.4	0.02	16.7	1.7	0.07
21年	0.0	0.0	0.00	22.2	12.0	0.22	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	7.4	4.0	0.07

※詳細は表12参照。

表3 紋枯病調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度
元年	33.3	5.3	1.3	44.4	10.2	2.6	66.7	14.7	3.7	11.1	2.7	0.7	36.7	7.9	2.0
平年比	並	並	並	並	やや多	並	多	多	多	並	やや多	やや多	並	多	やや多
	並	並	並	並	並	並	多	多	多	並	やや多	やや多	並	多	やや多
平年	40.0	5.9	1.8	48.9	6.7	2.4	25.0	3.4	0.9	15.6	1.6	0.5	32.7	4.4	1.4
30年	16.7	4.7	1.2	77.8	6.7	1.6	33.3	6.0	1.5	11.1	0.9	0.2	36.7	4.4	1.1
29年	66.7	15.3	4.0	66.7	4.4	1.3	50.0	16.0	4.0	11.1	1.3	0.3	46.7	8.0	2.1
28年	66.7	14.7	5.2	22.2	1.3	0.4	50.0	2.0	0.5	11.1	0.4	0.2	33.3	3.9	1.3
27年	33.3	5.3	2.2	44.4	7.1	2.0	0.0	0.0	0.0	44.4	2.7	0.9	33.3	4.0	1.3
26年	50.0	4.7	1.3	77.8	10.2	3.8	16.7	2.0	0.5	33.3	4.9	1.9	46.7	5.9	2.1
25年	50.0	3.3	0.8	44.4	13.8	6.1	0.0	0.0	0.0	22.2	4.4	1.2	33.3	6.1	2.4
24年	0.0	0.0	0.0	22.2	5.8	1.6	33.3	2.7	0.7	11.1	1.3	0.4	16.7	2.7	0.7
23年	33.3	2.7	0.7	44.4	7.1	4.1	16.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	23.3	2.8	1.4
22年	16.7	2.0	0.5	44.4	3.6	1.9	16.7	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	20.0	2.0	0.8
21年	66.7	6.7	1.8	44.4	6.7	1.7	33.3	2.0	0.5	11.1	0.4	0.1	36.7	3.9	1.0

※詳細は表13参照。

表4 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
元年	66.7	6.2	22.2	0.3	33.3	1.0	0.0	0.0	26.7	1.5
平年比	並	やや少	並	並	並	やや多	少	少	やや少	少
	やや少		並		やや多		少		少	
平年	80.0	22.3	26.6	1.9	23.3	0.6	35.6	1.9	39.3	5.7
30年	100.0	32.8	22.2	0.2	33.3	0.7	0.0	0.0	33.3	6.8
29年	50.0	8.3	11.1	0.4	0.0	0.0	33.3	0.7	23.3	2.0
28年	66.7	22.2	22.2	0.2	33.3	1.0	44.4	5.7	40.0	6.4
27年	83.3	68.5	11.1	0.1	16.7	0.5	22.2	0.2	30.0	13.9
26年	66.7	4.0	11.1	0.4	16.7	0.5	22.2	0.9	26.7	1.2
25年	100.0	4.7	44.4	4.4	16.7	0.5	55.6	0.9	53.3	2.6
24年	66.7	9.5	44.4	3.9	16.7	1.0	22.2	1.0	36.7	3.5
23年	83.3	33.8	44.4	7.4	33.3	0.5	22.2	4.9	43.3	10.4
22年	100.0	14.2	44.4	1.4	33.3	0.5	55.5	3.7	56.7	4.4
21年	83.3	25.3	11.1	0.1	33.3	0.3	77.8	1.2	50.0	5.4

※詳細は表14参照。 \* 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表5 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
元年	66.7	1.0	11.1	0.1	16.7	9.2	44.4	4.9	33.3	3.5
平年比	やや少	少	やや少	少	やや少	やや多	並	やや少	やや少	少
	少		少		やや多		やや少		少	
平年	80.0	72.8	34.4	18.1	38.3	4.0	47.8	25.1	48.3	28.3
30年	50.0	148.7	11.1	0.3	33.3	1.2	33.3	0.8	30.0	30.3
29年	83.3	44.2	0.0	0.0	33.3	1.2	33.3	6.1	33.3	10.9
28年	66.7	49.8	22.2	2.7	50.0	11.5	44.4	10.7	43.3	16.3
27年	83.3	28.8	22.2	0.3	33.3	9.2	33.3	4.8	40.0	9.1
26年	50.0	7.0	22.2	17.7	16.7	1.0	55.6	9.1	36.7	9.6
25年	83.3	6.2	55.6	110.8	66.7	4.3	44.4	48.3	60.0	49.8
24年	100.0	110.0	66.7	15.3	50.0	3.7	33.3	9.1	60.0	29.4
23年	83.3	39.2	44.4	6.9	16.7	0.8	22.2	50.8	40.0	26.1
22年	100.0	240.0	55.5	14.6	50.0	5.0	77.8	15.7	70.0	56.7
21年	100.0	54.3	44.4	11.9	33.3	1.7	100.0	95.1	70.0	45.0

※詳細は表16参照。 \* 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表6 セジロウンカ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
元年	66.7	10.0	88.9	3.8	66.7	2.2	88.9	7.2	80.0	5.7
平年比	少	やや少	並	並	やや少	やや少	並	やや多	並	やや少
	やや少		並		やや少		やや多		やや少	
平年	91.7	23.2	75.6	10.3	81.7	6.1	73.9	5.8	79.7	10.6
30年	83.3	4.0	33.3	0.9	66.7	1.5	44.4	1.2	53.3	1.7
29年	66.7	21.2	22.2	0.4	100.0	4.5	55.6	1.2	56.7	5.6
28年	100.0	19.3	88.9	8.3	100.0	8.7	88.9	7.0	93.3	10.2
27年	100.0	53.7	55.6	2.2	50.0	2.2	33.3	1.7	56.7	12.3
26年	83.3	5.8	77.8	2.9	83.3	2.3	77.8	6.2	80.0	4.4
25年	83.3	26.7	100.0	9.2	100.0	13.0	100.0	5.6	96.7	12.1
24年	100.0	33.7	88.9	20.4	83.3	4.0	83.3	5.8	90.0	15.1
23年	100.0	28.2	100.0	10.3	83.3	6.8	100.0	16.7	96.7	15.2
22年	100.0	14.5	100.0	44.2	83.3	13.5	88.9	4.7	93.3	19.8
21年	100.0	25.3	88.9	3.9	66.7	4.3	66.7	8.1	80.0	9.5

※詳細は表14参照。 \* 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表7 セジロウンカ調査結果（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
元年	33.3	0.8	0.0	0.0	16.7	0.8	88.9	21.6	36.7	6.8
平年比	やや少	少	少	少	やや少	少	やや少	並	少	少
	少		少		少		並		少	
平年	80.0	45.5	76.7	44.0	83.3	37.7	94.4	45.0	84.0	43.3
30年	33.3	18.0	33.3	4.9	100.0	22.7	88.9	6.8	63.3	11.6
29年	33.3	2.8	11.1	0.6	100.0	27.7	100.0	22.9	60.0	13.1
28年	100.0	16.2	100.0	24.9	100.0	38.5	100.0	37.3	100.0	29.6
27年	83.3	9.8	100.0	20.9	16.7	0.8	88.9	33.7	76.7	18.5
26年	50.0	14.2	88.9	16.0	16.7	5.0	66.7	29.8	60.0	18.0
25年	100.0	19.5	55.6	9.0	100.0	44.8	100.0	65.9	86.7	36.3
24年	100.0	86.3	100.0	43.8	100.0	23.7	100.0	25.1	100.0	42.1
23年	100.0	3.0	88.9	25.9	100.0	41.0	100.0	18.7	96.7	22.1
22年	100.0	227.3	100.0	232.6	100.0	148.3	100.0	11.8	100.0	144.0
21年	100.0	58.0	88.9	61.7	100.0	24.8	100.0	198.0	96.7	97.8

※詳細は表16参照。 \* 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表8 トビイロウンカ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	並		並		並		並		並	
平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※詳細は表14参照。 \* 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表9 斑点米カメムシ類調査結果（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
元年	16.7	0.2	11.1	0.1	50.0	1.7	66.7	4.2	36.7	1.7
平年比	並	やや少	少	少	並	並	やや多	多	やや少	並
	やや少		少		並		多		並	
平年	30.0	0.8	48.9	1.5	48.3	1.9	50.0	1.2	45.3	1.3
30年	16.7	0.8	44.4	1.3	66.7	2.3	44.4	0.9	43.3	1.3
29年	33.3	2.5	55.6	0.8	66.7	5.0	77.8	1.1	60.0	2.1
28年	66.7	1.5	66.7	2.3	33.3	1.3	44.4	0.9	53.3	1.5
27年	0.0	0.0	55.6	4.0	33.3	1.0	66.7	1.2	43.3	1.8
26年	50.0	1.2	77.8	2.3	33.3	2.3	55.6	1.1	56.7	1.7
25年	50.0	0.7	44.4	1.6	66.7	1.8	55.6	2.3	53.3	1.7
24年	33.3	0.3	55.6	1.1	33.3	2.0	22.2	0.4	36.7	0.9
23年	33.3	0.5	44.4	0.6	66.7	1.7	44.4	2.2	46.7	1.3
22年	16.7	0.2	0.0	0.0	50.0	0.5	33.3	0.7	23.3	0.3
21年	0.0	0.0	44.4	0.8	33.3	0.8	55.6	0.7	36.7	0.6

※詳細は表17参照。 \* 虫数は、1調査当たりの平均値

表10 斑点米カメムシ類調査結果（8月第4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
元年	50.0	15.0	22.2	0.4	50.0	1.3	55.6	5.3	43.3	5.0
平年比	少	並	並	並	並	やや多	やや多	多	並	並
	並		並		やや多		多		並	
平年	81.7	17.8	30.0	1.1	41.7	1.3	36.7	1.3	44.7	4.5
30年	100.0	22.7	22.2	0.4	33.3	0.8	33.3	1.4	43.3	5.3
29年	83.3	13.3	33.3	0.6	33.3	1.3	33.3	1.3	43.3	3.5
28年	66.7	6.8	33.3	3.9	16.7	0.7	33.3	1.0	36.7	3.0
27年	50.0	1.0	33.3	1.6	33.3	1.2	11.1	0.1	30.0	0.9
26年	83.3	46.3	22.2	0.2	16.7	0.2	22.2	0.4	33.3	9.5
25年	100.0	44.7	44.4	2.6	83.3	4.2	55.6	3.0	66.7	11.4
24年	66.7	14.5	22.2	0.7	66.7	2.0	66.7	1.3	53.3	3.9
23年	100.0	6.7	22.2	0.4	50.0	1.2	22.2	0.4	43.3	1.8
22年	100.0	19.7	55.5	0.8	50.0	0.8	55.5	3.2	63.3	5.3
21年	66.7	2.3	11.1	0.1	33.3	0.5	33.3	0.7	33.3	0.8

※詳細は表18参照。 \* 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表11 コブノメイガ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率
元年	66.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	23.3	0.0
平年比	多	並	やや多	並	並	並	やや多	並	やや多	並
	並		並		並		並		並	
平年	15.0	3.1	11.1	2.4	3.3	0.1	5.6	0.2	8.7	1.4
30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28年	33.3	0.7	33.3	0.0	16.7	0.0	22.2	0.0	26.7	0.1
27年	16.7	0.0	11.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.3
26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25年	33.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.4
24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.4	3.3	0.1
23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22年	66.7	28.0	66.7	22.7	16.7	0.7	22.2	1.8	43.3	13.1
21年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※詳細は表15参照。 \* 上位2葉調査

表12 水稲巡回調査結果①（8月第4半旬：25株見取り調査）

地 点	葉いもち				穂いもち					備考
	発病株率	発病度	程度	上位葉発病率	発病株率	発病穂数		発病穂率	程度	
						a	b			
京都市西京区	0.0	0	無	0.00	-	-	-	-	-	
京都市伏見区	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
久御山町	0.0	0	無	0.00	-	-	-	-	-	
八幡市	0.0	0	無	0.00	-	-	-	-	-	
精華町	0.0	0	無	0.00	-	-	-	-	-	
木津川市	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	周辺田：ばか苗、葉いもち
山城平均	R1	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
	H30	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
亀岡市 1	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
亀岡市 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京都市右京区	0.0	0	無	0.00	4.0	0	1	0.14	少	ごま葉枯病
南丹市 1	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市 3	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 1	4.0	1	少	0.08	4.0	0	1	0.16	少	
京丹波町 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 3	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹平均	R1	0.4	0.1	少	0.01	0.9	0.0	0.2	0.03	少
	H30	7.6	1.9	少	0.20	0.0	0.0	0.0	0.00	無
綾部市	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市 1	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市 3	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市 4	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
舞鶴市	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
中丹平均	R1	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
	H30	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
宮津市	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
与謝野町	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
伊根町	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 1	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 3	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 4	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 5	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 6	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
丹後平均	R1	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
	H30	5.3	1.4	少	0.25	0.0	0.0	0.0	0.00	無
府平均	R1	0.1	0.0	無	0.00	0.3	0.0	0.1	0.01	少
	H30	3.9	1.0	少	0.13	0.0	0.0	0.0	0.00	無

\*発病穂数

a：穂首部が罹病して白穂、またはかなりの不稔

b：穂首部以外で一次枝梗以上が侵され、枯死

表13 水稲巡回調査結果②（8月第4半旬：25株見取り調査）

地 点	紋枯病							白葉枯病			縞葉枯病			その他	
	発病株率	発病程度				発病度	程度	発病株率	発病度	程度	発病株率	発病度	程度		
		A	B	C	D										
京都市西京区	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京都市伏見区	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
久御山町	12.0	0	0	0	3	3	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
八幡市	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
精華町	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
木津川市	20.0	0	0	0	5	5	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
山城平均	R1	5.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	H30	4.7	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
亀岡市 1	36.0	0	0	0	9	9	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
亀岡市 2	36.0	0	0	0	9	9	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
京都市右京区	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹市 1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹市 2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹市 3	16.0	0	0	0	4	4	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹波町 1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹波町 2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹波町 3	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹平均	R1	10.2	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	H30	6.7	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
綾部市	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市 1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市 2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市 3	8.0	0	0	0	2	2	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市 4	60.0	0	0	0	15	15	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
舞鶴市	16.0	0	0	0	4	4	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
中丹平均	R1	14.7	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	H30	6.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
宮津市	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
与謝野町	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
伊根町	24.0	0	0	0	6	6	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市 1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市 2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市 3	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市 4	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市 5	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市 6	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
丹後平均	R1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	H30	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
府平均	R1	7.9	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	H30	4.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	

表14 水稲巡回調査結果③（8月第4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

地 点	ツマゲ <sup>+</sup> ロコハ <sup>+</sup> イ					ヒメビ <sup>+</sup> ウカ					セゾ <sup>+</sup> ロウカ					トビ <sup>+</sup> イロウカ						
	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫		幼虫	計	程度	
																	長翅	短翅				
京都市西京区	8.0	0	3	3	少	20.0	1	6	7	少	20.0	4	6	10	少	0.0	0	0	0	0	無	
京都市伏見区	40.0	7	7	14	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
久御山町	0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
八幡市	32.0	8	10	18	少	44.0	0	12	12	少	20.0	0	7	7	少	0.0	0	0	0	0	無	
精華町	0.0	0	0	0	無	32.0	0	26	26	少	56.0	1	36	37	少	0.0	0	0	0	0	無	
木津川市	8.0	0	2	2	少	24.0	0	6	6	少	12.0	0	6	6	少	0.0	0	0	0	0	無	
山城平均	R1	14.7	2.5	3.7	6.2	少	22.0	0.2	8.8	9.0	少	18.0	0.8	9.2	10.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	30.0	0.7	32.2	32.8	少	30.7	0.0	16.0	16.0	少	12.7	1.3	2.7	4.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市 1	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
亀岡市 2	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
京都市右京区	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	32.0	2	13	15	少	0.0	0	0	0	0	無	
南丹市 1	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	無	12.0	0	3	3	少	0.0	0	0	0	0	無	
南丹市 2	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	20.0	5	3	8	少	0.0	0	0	0	0	無	
南丹市 3	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹波町 1	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹波町 2	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	4.0	1	0	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹波町 3	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	8.0	0	3	3	少	0.0	0	0	0	0	無	
南丹平均	R1	1.3	0.0	0.3	0.3	少	0.4	0.0	0.1	0.1	少	10.2	0.9	2.9	3.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	0.9	0.0	0.2	0.2	少	3.6	0.0	3.8	3.8	少	2.2	0.1	0.8	0.9	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市	0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	4.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 1	0.0	0	0	0	無	24.0	2	10	12	少	20.0	0	6	6	少	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 2	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 3	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	12.0	0	3	3	少	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 4	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
舞鶴市	12.0	0	4	4	少	40.0	1	25	26	少	4.0	1	1	2	少	0.0	0	0	0	0	無	
中丹平均	R1	3.3	0.0	1.0	1.0	少	12.0	0.5	6.2	6.7	少	6.7	0.2	2.0	2.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	2.0	0.5	0.2	0.7	少	4.0	0.0	1.0	1.0	少	4.7	0.0	1.5	1.5	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市	0.0	0	0	0	無	32.0	1	17	18	少	8.0	3	0	3	少	0.0	0	0	0	0	無	
与謝野町	0.0	0	0	0	無	24.0	1	7	8	少	16.0	0	4	4	少	0.0	0	0	0	0	無	
伊根町	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	8.0	2	2	4	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 1	0.0	0	0	0	無	8.0	0	3	3	少	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 2	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 3	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	20.0	0	5	5	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 4	0.0	0	0	0	無	40.0	1	23	24	少	32.0	9	13	22	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 5	0.0	0	0	0	無	16.0	0	4	4	少	40.0	1	23	24	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 6	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
丹後平均	R1	0.0	0.0	0.0	0.0	無	14.2	0.3	6.2	6.6	少	15.1	1.7	5.6	7.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	0.0	0.0	0.0	0.0	無	1.3	0.1	0.2	0.3	少	3.6	0.0	1.2	1.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R1	4.0	0.5	1.0	1.5	少	11.2	0.2	4.9	5.1	少	12.5	1.0	4.8	5.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	6.7	0.2	6.5	6.8	少	8.4	0.0	4.6	4.6	少	5.2	0.3	1.4	1.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無



表15 水稲巡回調査結果④（8月第4半旬：25株見取り調査）

地 点	イネツトムシ				ニカメイ*		フナヒコヤ*		コブノメイガ				イナカハシ		スクリンコガイ		その他	
	食害株率	ツト数	幼虫数	程度	被害株率	程度	幼虫数	程度	被害率	程度	被害株率	本田被害	虫数	程度	25株卵塊数	周辺卵塊		
京都市西京区	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	○		
京都市伏見区	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0	○	*5	
久御山町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0	○		
八幡市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	○		
精華町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0			
木津川市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0			
山城平均	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	4/6	0.0	無	0.0	4/6	
	H30	9.3	4.3	2.7	少	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.8	3/6	
亀岡市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
亀岡市2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0		*5, *6	
京都市右京区	0.0	0	0	無	0.0	無	2	少	0.00	無	0.0		0	無	0			
南丹市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
南丹市2	0.0	0	0	無	0.0	無	1	少	0.00	無	0.0		0	無	0		*7	
南丹市3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0	○		
京丹波町1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
京丹波町2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
京丹波町3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
南丹平均	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.3	少	0.00	無	0.0	2/9	0.0	無	0.0	1/9	
	H30	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.1	少	0.00	無	0.0	0/9	0.0	無	0.0	0/9	
綾部市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
福知山市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
福知山市2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
福知山市3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
福知山市4	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		*5	
舞鶴市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
中丹平均	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.0	0/6	
	H30	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.0	0/6	
宮津市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
与謝野町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		*2 (定点外)	
伊根町	0.0	0	0	無	0.0	無	3	少	0.00	無	0.0	○	0	無	0			
京丹後市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
京丹後市2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
京丹後市3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		*1	
京丹後市4	0.0	0	0	無	0.0	無	3	少	0.00	無	0.0		0	無	0		*1, *6	
京丹後市5	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
京丹後市6	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0			
丹後平均	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.7	無	0.00	無	0.0	1/9	0.0	無	0.0	0/9	
	H30	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/9	0.0	無	0.0	0/9	
府平均	R1	0.0	0.0	0.0	少	0.0	無	0.3	無	0.00	無	0.0	7/30	0.0	無	0.00	4/30	
	H30	1.9	0.9	0.5	少	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/30	0.0	無	0.17	3/30	

\*1 ケマカハシ

\*2 ニカメイ\*

\*3 ホリハカハシ

\*4 イナカハシ

\*5 イネズリウシ

\*6 ヨウ類

\*7 イネツトムシ

表16 水稲巡回調査結果⑤（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点	ツマグロヨコバイ				ヒメビウカ				セジロウカ				トビイロウカ					
	成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫		幼虫	計	程度	
													長翅	短翅				
京都市西京区	1	0	1	少	1	0	1	少	4	0	4	少	0	0	0	0	無	
京都市伏見区	1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
久御山町	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
八幡市	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
精華町	1	0	1	少	0	0	0	無	0	1	1	少	0	0	0	0	無	
木津川市	3	0	3	少	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
山城平均	R1	1.0	0.0	1.0	少	0.2	0.0	0.2	少	0.7	0.2	0.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	121.2	27.5	148.7	中	0.0	9.2	9.2	少	1.2	16.8	18.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市1	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
亀岡市2	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京都市右京区	1	0	1	少	1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹市1	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹市2	0	0	0	無	2	0	2	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹市3	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京丹波町1	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京丹波町2	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京丹波町3	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹平均	R1	0.1	0.0	0.1	少	0.3	0.0	0.3	少	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	0.0	0.3	0.3	少	0.4	8.7	9.1	少	0.2	4.7	4.9	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
福知山市1	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
福知山市2	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
福知山市3	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
福知山市4	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
舞鶴市	17	38	55	中	0	6	6	少	0	5	5	少	0	0	0	0	無	
中丹平均	R1	2.8	6.3	9.2	少	0.0	1.0	1.0	少	0.0	0.8	0.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	0.2	1.0	1.2	少	1.5	9.5	11.0	中	0.8	21.8	22.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市	0	0	0	無	0	6	6	少	1	23	24	少	0	0	0	0	無	
与謝野町	0	0	0	無	2	0	2	少	0	3	3	少	0	0	0	0	無	
伊根町	0	1	1	少	3	10	13	中	8	16	24	少	0	0	0	0	無	
京丹後市1	0	40	40	少	0	5	5	少	1	10	11	少	0	0	0	0	無	
京丹後市2	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京丹後市3	0	0	0	無	0	0	0	無	1	0	1	少	0	0	0	0	無	
京丹後市4	1	1	2	少	10	20	30	中	20	40	60	少	0	0	0	0	無	
京丹後市5	0	1	1	少	3	5	8	少	10	33	43	少	0	0	0	0	無	
京丹後市6	0	0	0	無	2	2	4	少	3	25	28	少	0	0	0	0	無	
丹後平均	R1	0.1	4.8	4.9	少	2.2	5.3	7.6	少	4.9	16.7	21.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	0.3	0.4	0.8	少	0.4	0.3	0.8	少	1.1	5.7	6.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R1	0.8	2.7	3.5	少	0.8	1.8	2.6	少	1.6	5.2	6.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	H30	24.4	5.9	30.3	少	0.6	6.4	7.0	少	0.8	10.8	11.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無

表17 水稲巡回調査結果⑥（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点	イナトムシ		アサヒコヤガ		斑点米カムシ類			その他カムシ類		コハネ 付ゴ	併 判	その他
	幼虫	蛹	成虫	幼虫	種類	虫数	程度	種類	虫数			
京都市西京区	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京都市伏見区	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
久御山町	0	0	0	0		0	無		0	1	0	
八幡市	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
精華町	1	0	0	1		0	無		0	0	0	
木津川市	0	0	0	0	イナメA1	1	少		0	0	0	
山城平均	R1	0.2	0.0	0.0	0.2		0.2	少		0.0	0.2	0.0
	H30	0.0	0.0	0.0	0.8		0.8	少		0.0	0.5	4.0
亀岡市 1	0	0	0	0	ホソハラA1	1	少		0	12	2	
亀岡市 2	0	0	0	0		0	無		0	1	0	ヨトリ類L1
京都市右京区	0	0	0	0		0	無		0	0	1	
南丹市 1	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
南丹市 2	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
南丹市 3	0	0	0	0		0	無		0	1	0	
京丹波町 1	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹波町 2	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹波町 3	0	0	0	0		0	無		0	3	0	
南丹平均	R1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	少		0.0	1.9	0.3
	H30	0.0	0.0	0.0	0.0		1.3	少		0.0	1.9	0.3
綾部市	0	0	0	0	イナメL1	1	少		0	2	0	
福知山市 1	0	0	0	0	アサヒケ A2	2	少		0	4	1	
福知山市 2	0	0	0	0		0	無		0	5	1	
福知山市 3	0	0	1	0		0	無		0	5	0	
福知山市 4	0	0	0	0	アサシ A1, ホソハラA3, トゲシラA3	7	中		0	7	2	
舞鶴市	0	0	0	0		0	無		0	8	0	
中丹平均	R1	0.0	0.0	0.2	0.0		1.7	少		0.0	5.2	0.7
	H30	0.0	0.0	0.0	0.3		2.3	少		0.0	6.0	3.3
宮津市	0	0	0	0	クモヘリA6L1, シラネシL1, アサシ A4L1	13	多		0	0	0	
与謝野町	0	0	0	0		0	無		0	0	1	
伊根町	0	0	0	4		1	少		0	0	8	
京丹後市 1	0	0	0	0	ホソハラL2, クモヘリL5	7	中		0	0	0	
京丹後市 2	0	0	0	0	クモヘリA1	1	少		0	8	1	
京丹後市 3	0	0	0	0	クモヘリL1	1	少		0	2	0	
京丹後市 4	0	0	0	0	アサシ A15	15	多		0	2	1	
京丹後市 5	0	0	0	0		0	無		0	9	0	
京丹後市 6	0	0	0	0		0	無		0	3	0	
丹後平均	R1	0.0	0.0	0.0	0.4		4.2	中		0.0	2.7	1.2
	H30	0.0	0.0	0.0	0.0		0.9	少		0.0	4.1	1.4
府平均	R1	0.0	0.0	0.0	0.2		1.7	少		0.00	2.4	0.6
	H30	0.0	0.0	0.0	0.2		1.3	少		0.00	3.1	2.0

(種名のカムシ、カスカムシは略)

表18 水稲巡回調査結果⑦（8月第4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

地 点	斑点米カメムシ類										その 他 カメムシ 類	コハ ネ イ コ	サ サ キ	その 他
	シラホシ カメムシ	トゲ シラホシ カメムシ	ホリハリ カメムシ	クモハリ カメムシ	アカヒゲ ホリミドリ カメムシ	アサ ジ カメ ムシ	その他 斑点米カメムシ類	計	確 認 ほ 率					
京都市西京区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
京都市伏見区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	
久御山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八幡市	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	
精華町	0	0	1	0	0	13	0	14	0	0	0	0	0	
木津川市	30	3	25	0	15	0	0	73	0	0	0	20		
山城平均	R1	5.0	0.5	4.3	0.0	2.5	2.7	0.0	15.0	50.0	0.0	0.5	3.7	
	H30	0.5	0.2	0.5	0.0	9.0	9.2	3.3	22.7	100.0	0.0	0.0	1.0	
亀岡市 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	
亀岡市 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
京都市右京区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
南丹市 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	ツマゲ 口A1
南丹市 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ツマゲ 口A1
南丹市 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
京丹波町 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
京丹波町 2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	
京丹波町 3	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	フタヒ コヤカ L1
南丹平均	R1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	22.2	0.0	2.2	0.4	
	H30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	22.2	0.0	0.1	0.2	
綾部市	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
福知山市 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
福知山市 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
福知山市 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福知山市 4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	
舞鶴市	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
中丹平均	R1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	50.0	0.0	2.7	0.0	
	H30	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	33.3	0.0	3.3	0.2	
宮津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	チヤハ 社セリL3
与謝野町	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	2	
伊根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
京丹後市 1	0	0	0	31	0	0	イホムL1	1	32	0	0	3	2	
京丹後市 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
京丹後市 3	3	0	0	8	0	0	0	11	0	0	0	2	8	
京丹後市 4	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	2	フタヒ コヤカ L2
京丹後市 5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	フタヒ コヤカ L1, イネツL1
京丹後市 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
丹後平均	R1	0.4	0.1	0.1	4.3	0.0	0.2	0.1	5.3	55.6	0.0	3.3	2.0	
	H30	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	33.3	0.0	3.3	0.3	
府平均	R1	1.13	0.1	1.3	1.3	0.5	0.6	0.0	5.0	43.3	0.0	2.3	1.5	
	H30	0.13	0.1	0.3	0.20	1.8	2.1	0.7	5.3	43.3	0.0	1.7	0.4	