

イネ

病害虫の発生状況

- (1) 葉いもち
山城で平年比やや多く、丹後で平年比多い発生。
府全体では平年比やや多い発生。
- (2) 穂いもち
南丹、中丹及び丹後で平年比やや多い発生。
府全体では平年並の発生。
- (3) 紋枯病
山城及び丹後では平年比やや多く、南丹及び中丹では平年並の発生。
府全体では平年比やや多い発生。
- (4) 白葉枯病
発生を認めなかった。
- (5) 縞葉枯病
発生を認めなかった。
- (6) ばか苗病
発生を認めなかった。
- (7) ツマグロヨコバイ
中丹では、本田見取り調査で平年比多い発生。
府全体では平年並の発生。
- (8) セジロウンカ
本田見取り調査では、山城で平年比多く、府全体では平年比やや多い発生。
本田すくい取り調査では、山城で平年比やや多く、府全体では平年並の発生。
- (9) トビイロウンカ
本田見取り調査では、山城で及び府全体で平年比多い発生。
予察灯調査では、京田辺市で8月4、5及び14日に、亀岡市で8月6日に、京丹後市で8月5及び7日に、成虫の誘殺を認めた。
- (10) ニカメイガ
福知山市半田で発生を認めた。
- (11) コブノメイガ
山城及び中丹で平年比多く、南丹及び丹後で平年比やや多い発生。
府全体では、平年比多い発生。
- (12) 斑点米カメムシ類
本田すくい取り調査では、南丹及び中丹で平年比多い発生。
府全体では平年比やや多い発生。クモリカメムシ及びイナカメムシの発生が目立つ。
畦畔すくい取り調査では、南丹で平年比やや多く、中丹及び丹後で平年比多い発生。
府全体では平年比やや多い発生。
ホリカメムシ、アカヒゲホトリカメムシ及びアカシガメムシの発生が目立つ。
- (13) スクミリンゴガイ
山城の一部ほ場で発生を認めた。
- (14) その他
 - ・ヒメトビウンカ：本田すくい取り調査で、京都市3で甚発ほ場を、広範囲で多発ほ場を認めた。
 - ・フタオビコヤガ：一部のほ場で発生を認めた。
 - ・コバネイナゴ、ササキリ：広域で発生を認めた。

発病・発生程度別基準

		無	少	中	多	甚
葉いもち	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
穂いもち	発病穂率	0	1~10	11~30	31~60	61以上
紋枯病	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
セジロウンカ	25株当り虫数	0	1~250	~1250	~2500	2501以上
	すくい取り虫数	0	1~100	101~300	301~700	701以上
ヒメトビウンカ	25株当り虫数	0	1~50	~125	~250	251以上
	すくい取り虫数	0	1~10	11~30	31~100	101以上
ツマグロヨコバイ	25株当り虫数	0	1~125	~375	~750	751以上
	すくい取り虫数	0	1~50	51~750	751~1500	1501以上
斑点米カメムシ類	すくい取り虫数(本田)	0	1~3	4~10	11~30	31以上
イネクロカメムシ	25株当り虫数	0	1~5	6~10	11~25	25以上
ニカメイガ	被害株率	0	1~30	31~60	61~90	91以上
イネツトムシ	25株当り幼虫数	0	1~10	11~20	21~40	41以上
フタオビコヤガ	25株当り幼虫数	0	1~25	26~100	101~250	251以上
コブノメイガ	被害葉率	0	1~5	6~15	16~45	46以上

表1 葉いもち調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*
2年	83.3	10.7	0.00	44.4	7.6	0.00	33.3	0.7	0.00	88.9	16.0	0.19	63.3	9.7	0.06
平年比	多	多	並	やや多	並	並	やや多	並	並	多	多	やや多	多	多	並
	やや多			並			並			多			やや多		
平年	21.7	2.5	0.05	25.5	5.6	0.14	11.7	0.8	0.11	12.2	1.9	0.07	18.0	2.9	0.10
元年	0.0	0.0	0.00	11.1	0.4	0.11	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	3.3	0.1	0.03
30年	16.7	0.0	0.00	44.4	7.6	0.20	16.7	0.0	0.00	55.6	5.3	0.25	36.7	3.9	0.13
29年	16.7	0.7	0.00	11.1	2.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.9	0.00
28年	50.0	3.3	0.04	22.2	2.7	0.06	16.7	1.3	0.01	44.4	4.4	0.08	33.3	3.1	0.05
27年	0.0	0.0	0.00	11.1	1.8	0.00	33.3	2.0	1.00	0.0	0.0	0.00	10.0	0.9	0.20
26年	50.0	13.3	0.33	22.2	10.7	0.18	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	16.7	5.9	0.12
25年	66.7	7.0	0.11	33.3	12.0	0.38	16.7	1.3	0.07	0.0	0.0	0.00	26.7	5.3	0.15
24年	0.0	0.0	0.00	33.3	3.1	0.00	0.0	0.0	0.00	11.1	8.4	0.34	13.3	3.5	0.10
23年	16.7	0.7	0.00	22.2	1.3	0.00	33.3	3.3	0.06	0.0	0.0	0.00	16.7	1.2	0.01
22年	0.0	0.0	0.00	44.4	13.3	0.50	0.0	0.0	0.00	11.1	1.3	0.05	16.7	4.4	0.17

※詳細は表12参照。 * 発病葉率は上位2葉調査

表2 穂いもち調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率
2年	0.0	0.0	0.00	33.3	1.8	0.22	16.7	0.7	0.03	22.2	0.9	0.04	20.0	0.9	0.08
平年比	並	並	並	やや多	並	並	やや多	やや多	やや多	多	やや多	やや多	やや多	並	並
	並			並			やや多			やや多			並		
平年	14.3	0.6	0.03	21.1	3.7	0.18	8.3	1.2	0.07	4.4	0.3	0.02	11.3	1.8	0.09
元年	0.0	0.0	0.00	22.2	0.9	0.03	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.3	0.01
30年	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
29年	0.0	0.0	0.00	77.8	10.4	0.62	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	28.0	3.8	0.22
28年	100.0	4.0	0.20	33.3	3.6	0.23	66.7	7.3	0.41	22.2	0.9	0.07	40.0	3.5	0.21
27年	0.0	0.0	0.00	11.1	1.3	0.07	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	4.0	0.5	0.03
26年	0.0	0.0	0.00	22.2	6.7	0.42	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	8.0	2.4	0.15
25年	-	-	-	11.1	9.8	0.29	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	3.3	3.7	0.11
24年	-	-	-	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	11.1	1.8	0.08	3.3	0.7	0.03
23年	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	16.7	4.7	0.28	0.0	0.0	0.00	3.3	1.1	0.07
22年	-	-	-	33.3	4.0	0.17	0.0	0.0	0.00	11.1	0.4	0.02	16.7	1.7	0.07

※詳細は表12参照。

表3 紋枯病調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度
2年	50.0	14.7	3.7	22.2	11.1	3.1	33.3	3.3	0.8	33.3	3.1	1.0	33.3	7.9	2.1
平年比	並	やや多	やや多	やや少	やや多	並	並	並	並	やや多	やや多	やや多	並	やや多	やや多
	やや多			並			並			やや多			やや多		
平年	36.7	5.8	1.7	48.9	7.0	2.5	28.3	4.7	1.2	15.6	1.9	0.6	32.7	4.8	1.5
元年	33.3	5.3	1.3	44.4	10.2	2.6	66.7	14.7	3.7	11.1	2.7	0.7	36.7	7.9	2.0
30年	16.7	4.7	1.2	77.8	6.7	1.6	33.3	6.0	1.5	11.1	0.9	0.2	36.7	4.4	1.1
29年	66.7	15.3	4.0	66.7	4.4	1.3	50.0	16.0	4.0	11.1	1.3	0.3	46.7	8.0	2.1
28年	66.7	14.7	5.2	22.2	1.3	0.4	50.0	2.0	0.5	11.1	0.4	0.2	33.3	3.9	1.3
27年	33.3	5.3	2.2	44.4	7.1	2.0	0.0	0.0	0.0	44.4	2.7	0.9	33.3	4.0	1.3
26年	50.0	4.7	1.3	77.8	10.2	3.8	16.7	2.0	0.5	33.3	4.9	1.9	46.7	5.9	2.1
25年	50.0	3.3	0.8	44.4	13.8	6.1	0.0	0.0	0.0	22.2	4.4	1.2	33.3	6.1	2.4
24年	0.0	0.0	0.0	22.2	5.8	1.6	33.3	2.7	0.7	11.1	1.3	0.4	16.7	2.7	0.7
23年	33.3	2.7	0.7	44.4	7.1	4.1	16.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	23.3	2.8	1.4
22年	16.7	2.0	0.5	44.4	3.6	1.9	16.7	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	20.0	2.0	0.8

※詳細は表13参照。

表4 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
2年	66.7	9.7	11.1	0.4	50.0	1.8	11.1	0.1	30.0	2.5
平年比	並	並	やや少	並	多	多	やや少	やや少	やや少	並
	並		並		多		やや少		並	
平年	78.3	20.4	27.8	1.9	23.3	0.6	27.8	1.8	37.0	5.3
元年	66.7	6.2	22.2	0.3	33.3	1.0	0.0	0.0	26.7	1.5
30年	100.0	32.8	22.2	0.2	33.3	0.7	0.0	0.0	33.3	6.8
29年	50.0	8.3	11.1	0.4	0.0	0.0	33.3	0.7	23.3	2.0
28年	66.7	22.2	22.2	0.2	33.3	1.0	44.4	5.7	40.0	6.4
27年	83.3	68.5	11.1	0.1	16.7	0.5	22.2	0.2	30.0	13.9
26年	66.7	4.0	11.1	0.4	16.7	0.5	22.2	0.9	26.7	1.2
25年	100.0	4.7	44.4	4.4	16.7	0.5	55.6	0.9	53.3	2.6
24年	66.7	9.5	44.4	3.9	16.7	1.0	22.2	1.0	36.7	3.5
23年	83.3	33.8	44.4	7.4	33.3	0.5	22.2	4.9	43.3	10.4
22年	100.0	14.2	44.4	1.4	33.3	0.5	55.5	3.7	56.7	4.4

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表5 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
2年	66.7	34.7	11.1	13.3	16.7	2.8	0.0	0.0	20.0	11.5
平年比	並	並	やや少	並	やや少	並	少	少	少	並
	並		並		並		少		やや少	
平年	76.7	67.5	31.1	16.9	36.7	4.7	42.2	16.0	44.7	24.2
元年	66.7	1.0	11.1	0.1	16.7	9.2	44.4	4.9	33.3	3.5
30年	50.0	148.7	11.1	0.3	33.3	1.2	33.3	0.8	30.0	30.3
29年	83.3	44.2	0.0	0.0	33.3	1.2	33.3	6.1	33.3	10.9
28年	66.7	49.8	22.2	2.7	50.0	11.5	44.4	10.7	43.3	16.3
27年	83.3	28.8	22.2	0.3	33.3	9.2	33.3	4.8	40.0	9.1
26年	50.0	7.0	22.2	17.7	16.7	1.0	55.6	9.1	36.7	9.6
25年	83.3	6.2	55.6	110.8	66.7	4.3	44.4	48.3	60.0	49.8
24年	100.0	110.0	66.7	15.3	50.0	3.7	33.3	9.1	60.0	29.4
23年	83.3	39.2	44.4	6.9	16.7	0.8	22.2	50.8	40.0	26.1
22年	100.0	240.0	55.6	14.6	50.0	5.0	77.8	15.7	70.0	56.7

※詳細は表16参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表6 セジロウンカ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
2年	66.7	137.2	33.3	3.7	83.3	4.5	11.1	0.1	43.3	29.5
平年比	やや少	多	やや少	並	並	並	少	少	少	多
	多		並		並		少		やや多	
平年	88.3	21.7	75.6	10.3	81.7	5.9	76.1	5.7	79.7	10.2
元年	66.7	10.0	88.9	3.8	66.7	2.2	88.9	7.2	80.0	5.7
30年	83.3	4.0	33.3	0.9	66.7	1.5	44.4	1.2	53.3	1.7
29年	66.7	21.2	22.2	0.4	100.0	4.5	55.6	1.2	56.7	5.6
28年	100.0	19.3	88.9	8.3	100.0	8.7	88.9	7.0	93.3	10.2
27年	100.0	53.7	55.6	2.2	50.0	2.2	33.3	1.7	56.7	12.3
26年	83.3	5.8	77.8	2.9	83.3	2.3	77.8	6.2	80.0	4.4
25年	83.3	26.7	100.0	9.2	100.0	13.0	100.0	5.6	96.7	12.1
24年	100.0	33.7	88.9	20.4	83.3	4.0	83.3	5.8	90.0	15.1
23年	100.0	28.2	100.0	10.3	83.3	6.8	100.0	16.7	96.7	15.2
22年	100.0	14.5	100.0	44.2	83.3	13.5	88.9	4.7	93.3	19.8

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表7 セジロウンカ調査結果（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
2年	66.7	67.8	33.3	2.6	83.3	11.0	77.8	13.4	63.3	20.6
平年比	並	やや多	やや少	並	並	やや少	やや少	やや少	並	並
	やや多		並		やや少		やや少		並	
平年	73.3	39.8	67.8	37.9	75.0	35.3	93.3	27.4	78.0	34.2
元年	33.3	0.8	0.0	0.0	16.7	0.8	88.9	21.6	36.7	6.8
30年	33.3	18.0	33.3	4.9	100.0	22.7	88.9	6.8	63.3	11.6
29年	33.3	2.8	11.1	0.6	100.0	27.7	100.0	22.9	60.0	13.1
28年	100.0	16.2	100.0	24.9	100.0	38.5	100.0	37.3	100.0	29.6
27年	83.3	9.8	100.0	20.9	16.7	0.8	88.9	33.7	76.7	18.5
26年	50.0	14.2	88.9	16.0	16.7	5.0	66.7	29.8	60.0	18.0
25年	100.0	19.5	55.6	9.0	100.0	44.8	100.0	65.9	86.7	36.3
24年	100.0	86.3	100.0	43.8	100.0	23.7	100.0	25.1	100.0	42.1
23年	100.0	3.0	88.9	25.9	100.0	41.0	100.0	18.7	96.7	22.1
22年	100.0	227.3	100.0	232.6	100.0	148.3	100.0	11.8	100.0	144.0

※詳細は表16参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表8 トビイロウンカ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
2年	33.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.1
平年比	多	多	並	並	並	並	並	並	多	多
	多		並		並		並		多	
平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表9 斑点米カメムシ類調査結果（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
2年	0.0	0.0	66.7	9.4	50.0	5.3	22.2	0.3	36.7	4.0
平年比	少	少	やや多	多	並	多	少	少	やや少	多
	少		多		多		少		やや多	
平年	31.7	0.8	45.6	1.4	50.0	2.0	51.1	1.5	45.3	1.4
元年	16.7	0.2	11.1	0.1	50.0	1.7	66.7	4.2	36.7	1.7
30年	16.7	0.8	44.4	1.3	66.7	2.3	44.4	0.9	43.3	1.3
29年	33.3	2.5	55.6	0.8	66.7	5.0	77.8	1.1	60.0	2.1
28年	66.7	1.5	66.7	2.3	33.3	1.3	44.4	0.9	53.3	1.5
27年	0.0	0.0	55.6	4.0	33.3	1.0	66.7	1.2	43.3	1.8
26年	50.0	1.2	77.8	2.3	33.3	2.3	55.6	1.1	56.7	1.7
25年	50.0	0.7	44.4	1.6	66.7	1.8	55.6	2.3	53.3	1.7
24年	33.3	0.3	55.6	1.1	33.3	2.0	22.2	0.4	36.7	0.9
23年	33.3	0.5	44.4	0.6	66.7	1.7	44.4	2.2	46.7	1.3
22年	16.7	0.2	0.0	0.0	50.0	0.5	33.3	0.7	23.3	0.3

※詳細は表17参照。 * 虫数は、1調査当たりの平均値

表10 斑点米カメムシ類調査結果（8月第4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
2年	50.0	21.0	44.4	1.6	50.0	4.3	44.4	6.1	46.7	7.4
平年比	少	並	やや多	やや多	並	多	並	多	並	やや多
	並		やや多		多		多		やや多	
平年	80.0	19.1	31.1	1.2	43.3	1.4	38.9	1.7	45.7	5.0
元年	50.0	15.0	22.2	0.4	50.0	1.3	55.6	5.3	43.3	5.0
30年	100.0	22.7	22.2	0.4	33.3	0.8	33.3	1.4	43.3	5.3
29年	83.3	13.3	33.3	0.6	33.3	1.3	33.3	1.3	43.3	3.5
28年	66.7	6.8	33.3	3.9	16.7	0.7	33.3	1.0	36.7	3.0
27年	50.0	1.0	33.3	1.6	33.3	1.2	11.1	0.1	30.0	0.9
26年	83.3	46.3	22.2	0.2	16.7	0.2	22.2	0.4	33.3	9.5
25年	100.0	44.7	44.4	2.6	83.3	4.2	55.6	3.0	66.7	11.4
24年	66.7	14.5	22.2	0.7	66.7	2.0	66.7	1.3	53.3	3.9
23年	100.0	6.7	22.2	0.4	50.0	1.2	22.2	0.4	43.3	1.8
22年	100.0	19.7	55.5	0.8	50.0	0.8	55.6	3.2	63.3	5.3

※詳細は表18参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表11 コブノメイガ調査結果（8月第4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率
2年	100.0	23.3	44.4	8.4	33.3	4.0	22.2	0.4	46.7	8.1
平年比	多	多	やや多	やや多	多	多	やや多	やや多	多	多
	多		やや多		多		やや多		多	
平年	15.0	3.1	11.1	2.4	3.3	0.1	5.6	0.2	8.7	1.4
元年	66.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	23.3	0.0
30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28年	33.3	0.7	33.3	0.0	16.7	0.0	22.2	0.0	26.7	0.1
27年	16.7	0.0	11.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.3
26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25年	33.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.4
24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.4	3.3	0.1
23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22年	66.7	28.0	66.7	22.7	16.7	0.7	22.2	1.8	43.3	13.1
21年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※詳細は表15参照。 * 上位2葉調査

表12 水稲巡回調査結果①（8月第4半旬：25株見取り調査）

地 点	葉いもち				穂いもち					備考
	発病株率	発病度	程度	上位葉発病率	発病株率	発病穂数		発病穂率	程度	
						a	b			
京都市 1	8.0	2	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京都市 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
久御山町	8.0	2	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
八幡市	12.0	3	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
精華町	32.0	8	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
木津川市	4.0	1	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
山城平均	R2	10.7	2.7	少	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
	R1	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
亀岡市 1	4.0	1	少	0.00	4.0	0	0	0.15	少	
亀岡市 2	4.0	1	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京都市 3	40.0	10	少	0.00	8.0	2	0	1.40	少	
南丹市 1	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市 3	20.0	5	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 1	0.0	0	無	0.00	4.0	1	0	0.40	少	
京丹波町 2	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 3	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹平均	R2	7.6	1.9	少	0.00	1.8	0.3	0.0	0.22	少
	R1	0.4	0.1	少	0.01	0.9	0.0	0.2	0.03	少
綾部市	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市 1	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市 2	12.0	3	少	0.00	4.0	1	0	0.20	少	
福知山市 3	4.0	1	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市 4	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
舞鶴市	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
中丹平均	R2	2.7	0.7	少	0.00	0.7	0.2	0.0	0.03	少
	R1	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
宮津市	4.0	1	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
与謝野町	8.0	2	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
伊根町	4.0	2	少	0.00	4.0	1	0	0.16	少	
京丹後市 1	24.0	9	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 2	64.0	22	中	1.17	4.0	1	0	0.17	少	
京丹後市 3	28.0	12	少	0.15	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 4	0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 5	8.0	4	少	0.43	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市 6	4.0	1	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
丹後平均	R2	16.0	5.9	少	0.19	0.9	0.2	0.0	0.04	少
	R1	0.0	0.0	無	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無
府平均	R2	9.7	3.0	少	0.06	0.9	0.2	0.0	0.08	少
	R1	0.1	0.0	無	0.00	0.3	0.0	0.1	0.01	少

* 発病穂数

a : 穂首部が罹病して白穂、またはかなりの不稔

b : 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され、枯死

表13 水稻巡回調査結果②（8月第4半旬：25株見取り調査）

地点	紋枯病							白菜枯病			縞葉枯病			その他	
	発病株率	発病程度				発病度	程度	発病株率	発病度	程度	発病株率	発病度	程度		
		A	B	C	D										
京都市1	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
京都市2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
久御山町	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
八幡市	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
精華町	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
木津川市	80.0	0	0	0	20	20	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
山城平均	R2	14.7	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R1	5.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
亀岡市1	72.0	0	0	3	15	21	中	0.0	0	無	0.0	0	無		
亀岡市2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京都市3	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹市1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹市2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹市3	28.0	0	0	0	7	7	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹波町1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹波町2	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹波町3	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
南丹平均	R2	11.1	0.0	0.0	0.3	2.4	3.1	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R1	10.2	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
綾部市	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市2	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市3	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
福知山市4	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
舞鶴市	16.0	0	0	0	4	4	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
中丹平均	R2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R1	14.7	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
宮津市	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
与謝野町	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
伊根町	12.0	0	0	2	1	5	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市1	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市2	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市3	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市4	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市5	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無		
京丹後市6	12.0	0	0	0	3	3	少	0.0	0	無	0.0	0	無		
丹後平均	R2	3.1	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
府平均	R2	7.9	0.0	0.0	0.2	1.8	2.1	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	

表14 水稲巡回調査結果③（8月第4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

地 点	ツマグロヨコバイ					ヒメビウカ					セジロウカ					トビイロウカ						
	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫		幼虫	計	程度	
																	長翅	短翅				
京都市 1	56.0	0	20	20	少	44.0	5	24	29	少	16.0	2	6	8	少	8.0	1	2	1	4	少	
京都市 2	48.0	8	7	15	少	20.0	1	6	7	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
久御山町	0.0	0	0	0	無	40.0	2	15	17	少	52.0	1	17	18	少	0.0	0	0	0	0	無	
八幡市	36.0	11	10	21	少	28.0	0	14	14	少	100.0	26	677	703	中	0.0	0	0	0	0	無	
精華町	4.0	1	0	1	少	0.0	0	0	0	無	88.0	5	89	94	少	4.0	0	1	0	1	少	
木津川市	4.0	0	1	1	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
山城平均	R2	24.7	3.3	6.3	9.7	少	22.0	1.3	9.8	11.2	少	42.7	5.7	131.5	137.2	少	2.0	0.2	0.5	0.2	0.3	少
	R1	14.7	2.5	3.7	6.2	少	22.0	0.2	8.8	9.0	少	18.0	0.8	9.2	10.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市 1	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
亀岡市 2	0.0	0	0	0	無	8.0	0	5	5	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京都市 3	12.0	0	4	4	少	20.0	1	11	12	少	44.0	3	28	31	少	0.0	0	0	0	0	無	
南丹市 1	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
南丹市 2	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
南丹市 3	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹波町 1	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹波町 2	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
京丹波町 3	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
南丹平均	R2	1.3	0.0	0.4	0.4	少	3.6	0.1	1.9	2.0	少	5.8	0.3	3.3	3.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	1.3	0.0	0.3	0.3	少	0.4	0.0	0.1	0.1	少	10.2	0.9	2.9	3.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市	8.0	0	2	2	少	24.0	0	10	10	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 1	4.0	0	1	1	少	16.0	1	3	4	少	8.0	1	1	2	少	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 2	0.0	0	0	0	無	8.0	0	3	3	少	4.0	1	0	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 3	0.0	0	0	0	無	16.0	0	5	5	少	8.0	1	1	2	少	0.0	0	0	0	0	無	
福知山市 4	28.0	2	6	8	少	4.0	1	0	1	少	52.0	4	17	21	少	0.0	0	0	0	0	無	
舞鶴市	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
中丹平均	R2	6.7	0.3	1.5	1.8	少	11.3	0.3	3.5	3.8	少	12.7	1.2	3.3	4.5	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	3.3	0.0	1.0	1.0	少	12.0	0.5	6.2	6.7	少	6.7	0.2	2.0	2.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	4.0	1	0	1	少	0.0	0	0	0	0	無	
与謝野町	0.0	0	0	0	無	8.0	1	1	2	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
伊根町	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 1	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 2	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 3	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 4	0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 5	4.0	0	1	1	少	12.0	0	3	3	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
京丹後市 6	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無	
丹後平均	R2	0.4	0.0	0.1	0.1	少	2.7	0.1	0.6	0.7	少	0.4	0.1	0.0	0.1	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	0.0	0.0	0.0	0.0	無	14.2	0.3	6.2	6.6	少	15.1	1.7	5.6	7.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R2	6.8	0.7	1.7	2.5	少	8.5	0.4	3.4	3.8	少	12.9	1.5	28.0	29.5	少	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	少
	R1	0.0	0.0	0.0	0.0	少	14.2	0.3	6.2	6.6	少	15.1	1.7	5.6	7.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無

表15 水稲巡回調査結果④（8月第4半旬：25株見取り調査）

地点	イネツトムシ				ニカメイ		フジヒコヤガ		コブノメイガ				イカリカメシ		スクミリンゴガイ		その他
	食害株率	ツト数	幼虫数	程度	被害株率	程度	幼虫数	程度	被害率	程度	被害株率	本田被害	虫数	程度	25株卵塊数	周辺卵塊	
京都市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.20	少	4.0	○	0	無	1	○	*1*7
京都市2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0	○	
久御山町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.20	無	4.0	○	0	無	0	○	
八幡市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	3.84	少	72.0	○	0	無	0	○	
精華町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	6.72	中	60.0	○	0	無	0		
木津川市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0		
山城平均	R2	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	1.83	少	23.3	6/6	0.0	無	0.2	4/6
	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	4/6	0.0	無	0.0	4/6
亀岡市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.60	少	8.0	○	0	無	0		*4
亀岡市2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	4.88	少	44.0	○	0	無	0		
京都市3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
南丹市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
南丹市2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
南丹市3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.52	少	16.0	○	0	無	0		
京丹波町1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.61	少	8.0	○	0	無	0		*5
京丹波町2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
京丹波町3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
南丹平均	R2	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.73	少	8.4	4/9	0.0	無	0.0	0/9
	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.3	少	0.00	無	0.0	2/9	0.0	無	0.0	1/9
綾部市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
福知山市1	0.0	0	0	無	0.0	無	1	少	0.20	少	4.0	○	0	無	0		*4
福知山市2	0.0	0	0	無	8.0	少	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
福知山市3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
福知山市4	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	1.08	少	20.0	○	0	無	0		
舞鶴市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
中丹平均	R2	0.0	0.0	0.0	無	1.3	少	0.2	少	0.21	少	4.0	2/6	0.0	無	0.0	0/6
	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.0	0/6
宮津市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0		
与謝野町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
伊根町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
京丹後市1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
京丹後市2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
京丹後市3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
京丹後市4	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.16	少	4.0	○	0	無	0		
京丹後市5	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
京丹後市6	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0		
丹後平均	R2	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.02	少	0.4	2/9	0.0	無	0.0	0/9
	R1	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.7	少	0.00	無	0.0	1/9	0.0	無	0.0	0/9
府平均	R2	0.0	0.0	0.0	無	0.3	少	0.0	無	0.63	少	8.1	14/30	0.0	無	0.03	4/30
	R1	0.0	0.0	0.0	少	0.0	無	0.3	無	0.00	無	0.0	7/30	0.0	無	0.00	4/30

*1 ケモヒカメシ

*2 ニカメイ

*3 ホソヒカメシ

*4 イネカメシ

*5 イネズソウムシ

*6 ヨトウ類

*7 ミネアオカメシ

表16 水稲巡回調査結果⑤（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点	ツマゲ`ロコハ`イ				ヒメヒ`ウカ				セシ`ロウカ				トヒ`イロウカ					
	成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫		幼虫	計	程度	
													長翅	短翅				
京都市1	88	47	135	甚	65	12	77	多	65	9	74	少	0	0	0	0	無	
京都市2	56	9	65	多	1	3	4	少	1	2	3	少	0	0	0	0	無	
久御山町	0	0	0	無	2	0	2	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
八幡市	0	0	0	無	0	0	0	無	120	200	320	多	0	0	0	0	無	
精華町	3	0	3	少	0	0	0	無	10	0	10	少	0	0	0	0	無	
木津川市	0	5	5	少	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
山城平均	R2	24.5	10.2	34.7	多	11.3	2.5	13.8	中	32.7	35.2	67.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	1.0	0.0	1.0	少	0.2	0.0	0.2	少	0.7	0.2	0.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市1	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
亀岡市2	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京都市3	0	0	0	無	80	200	280	甚	10	0	10	少	0	0	0	0	無	
南丹市1	20	100	120	甚	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹市2	0	0	0	無	10	25	35	多	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹市3	0	0	0	無	40	50	90	多	5	0	5	少	0	0	0	0	無	
京丹波町1	0	0	0	無	15	40	55	多	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京丹波町2	0	0	0	無	0	0	0	無	8	0	8	少	0	0	0	0	無	
京丹波町3	0	0	0	無	1	5	6	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
南丹平均	R2	2.2	11.1	13.3	中	16.2	35.6	51.8	多	2.6	0.0	2.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	0.1	0.0	0.1	少	0.3	0.0	0.3	少	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市	0	0	0	無	2	4	6	少	0	1	1	少	0	0	0	0	無	
福知山市1	0	0	0	無	13	12	25	中	3	0	3	少	0	0	0	0	無	
福知山市2	0	0	0	無	47	49	96	多	16	7	23	少	0	0	0	0	無	
福知山市3	0	0	0	無	8	30	38	多	6	7	13	少	0	0	0	0	無	
福知山市4	12	5	17	中	35	21	56	多	19	7	26	少	0	0	0	0	無	
舞鶴市	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
中丹平均	R2	2.0	0.8	2.8	少	17.5	19.3	36.8	多	7.3	3.7	11.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	2.8	6.3	9.2	少	0.0	1.0	1.0	少	0.0	0.8	0.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
与謝野町	0	0	0	無	10	0	10	少	5	0	5	少	0	0	0	0	無	
伊根町	0	0	0	無	0	0	0	無	1	0	1	少	0	0	0	0	無	
京丹後市1	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無	
京丹後市2	0	0	0	無	25	0	25	少	10	0	10	少	0	0	0	0	無	
京丹後市3	0	0	0	無	0	0	0	無	7	1	8	少	0	0	0	0	無	
京丹後市4	0	0	0	無	0	0	0	無	3	0	3	少	0	0	0	0	無	
京丹後市5	0	0	0	無	0	0	0	無	60	30	90	少	0	0	0	0	無	
京丹後市6	0	0	0	無	0	0	0	無	4	0	4	少	0	0	0	0	無	
丹後平均	R2	0.0	0.0	0.0	無	3.9	0.0	3.9	少	10.0	3.4	13.4	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	0.1	4.8	4.9	少	2.2	5.3	7.6	少	4.9	16.7	21.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R2	6.0	5.5	11.5	中	11.8	15.0	26.8	中	11.8	8.8	20.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R1	0.8	2.7	3.5	少	0.8	1.8	2.6	少	1.6	5.2	6.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無

表17 水稻巡回調査結果⑥（8月第4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点	イネトシ		ワオビコヤガ		斑点米カムシ類			その他カムシ類		コハネ 付ゴ	併 判	その他
	幼虫	蛹	成虫	幼虫	種類	虫数	程度	種類	虫数			
京都市 1	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京都市 2	0	0	0	0		0	無		0	0	2	
久御山町	0	0	0	0		0	無		0	2	1	
八幡市	0	0	0	0		0	無		0	1	3	
精華町	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
木津川市	0	0	0	0		0	無		0	3	0	
山城平均	R2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	無		0.0	1.0	1.0
	R1	0.2	0.0	0.0	0.2		0.2	少		0.0	0.2	0.0
亀岡市 1	0	0	0	0	イネ	2	少		0	5	0	
亀岡市 2	0	0	0	0		0	無		0	5	0	
京都市 3	0	0	0	0	クモヘリ	30	多		0	0	0	
南丹市 1	0	0	0	0	クモヘリ	40	甚		0	0	0	
南丹市 2	0	0	0	0	イネ	6	中		0	0	0	
南丹市 3	0	0	0	0		0	無		0	5	1	
京丹波町 1	0	0	0	0	イネ	6	中		0	1	0	
京丹波町 2	0	0	0	0	シラホシ	1	少		0	4	0	
京丹波町 3	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
南丹平均	R2	0.0	0.0	0.0	0.0		9.4	多		0.0	2.2	0.1
	R1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	少		0.0	1.9	0.3
綾部市	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
福知山市 1	0	0	0	0	イネ、クモヘリ	29	多		0	7	4	
福知山市 2	0	0	0	0		0	無		0	5	0	
福知山市 3	0	0	0	0	クモヘリ	1	少		0	0	0	
福知山市 4	0	0	0	0	アカスジ	2	少		0	2	0	
舞鶴市	0	0	0	0		0	無		0	16	0	
中丹平均	R2	0.0	0.0	0.0	0.0		5.3	中		0.0	5.0	0.7
	R1	0.0	0.0	0.2	0.0		1.7	少		0.0	5.2	0.7
宮津市	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
与謝野町	0	0	0	0		0	無		0	3	0	
伊根町	0	0	0	0	クモヘリ	1	少		0	0	0	
京丹後市 1	0	0	0	0		0	無		0	1	0	
京丹後市 2	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹後市 3	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹後市 4	0	0	0	0	クモヘリ、トゲシラホシ	2	少		0	13	0	
京丹後市 5	0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹後市 6	0	0	0	0		0	無		0	6	0	イネスズメシA1
丹後平均	R2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.3	少		0.0	2.6	0.0
	R1	0.0	0.0	0.0	0.4		4.2	中		0.0	2.7	1.2
府平均	R2	0.0	0.0	0.0	0.0		4.0	中		0.00	2.6	0.4
	R1	0.0	0.0	0.0	0.2		1.7	少		0.00	2.4	0.6

(種名のカムシ、カスカミは略)

表18 水稲巡回調査結果⑦（8月第4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

地 点	斑点米カメムシ類										その他カメムシ類	コバネイコ	ササキリ	その他
	シラホシカメムシ	トゲシラホシカメムシ	ホソハラカメムシ	クモヘリカメムシ	アカヒゲホソミドリカスミカメ	アカシカスミカメ	その他斑点米カメムシ類	計	確認 ほ率					
京都市 1	0	0	0	0	47	0	0	47	○	0	0	1		
京都市 2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
久御山町	0	0	11	0	0	0	0	11	○	0	0	0		
八幡市	0	2	6	0	0	60	0	68	○	0	0	4	ヒメトビウカA1	
精華町	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	セン'ロウカA10	
木津川市	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	0		
山城平均	R2	0.0	0.3	2.8	0.0	7.8	10.0	0.0	21.0	50.0				
	R1	5.0	0.5	4.3	0.0	2.5	2.7	0.0	15.0	50.0	0.0	0.5	3.7	
亀岡市 1	5	0	0	0	0	3	0	8	○	0	0	0		
亀岡市 2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5	0		
京都市 3	0	2	0	2	0	0	0	4	○	0	0	0		
南丹市 1	0	1	0	0	0	0	0	1	○	0	0	0		
南丹市 2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
南丹市 3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	ヒメトビウカA2	
京丹波町 1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	0	ヒメトビウカA1	
京丹波町 2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
京丹波町 3	0	0	1	0	0	0	0	1	○	0	0	2		
南丹平均	R2	0.6	0.3	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	1.6	44.4	0.0	0.9	0.2	
	R1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	22.2	0.0	2.2	0.4	
綾部市	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
福知山市 1	3	0	14	0	0	0	0	17	○	0	10	3		
福知山市 2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5	0		
福知山市 3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
福知山市 4	0	0	0	0	0	2	0	2	○	0	0	0		
舞鶴市	0	0	0	7	0	0	0	7	○	0	7	0		
中丹平均	R2	0.5	0.0	2.3	1.2	0.0	0.3	0.0	4.3	50.0	0.0	3.7	0.5	
	R1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	50.0	0.0	2.7	0.0	
宮津市	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
与謝野町	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5	0	ヒメトビウカA3	
伊根町	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
京丹後市 1	0	0	0	0	0	3	0	3	○	0	2	0		
京丹後市 2	0	0	0	0	50	0	0	50	○	0	0	0		
京丹後市 3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	セン'ロウカA15	
京丹後市 4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
京丹後市 5	0	0	0	1	0	0	0	1	○	0	5	0	セン'ロウカA15	
京丹後市 6	0	1	0	0	0	0	0	1	○	0	6	0		
丹後平均	R2	0.0	0.1	0.0	0.1	5.6	0.3	0.0	6.1	44.4	0.0	2.0	0.0	
	R1	0.4	0.1	0.1	4.3	0.0	0.2	0.1	5.3	55.6	0.0	3.3	2.0	
府平均	R2	0.27	0.2	1.1	0.3	3.2	2.3	0.0	7.4	43.3	0.0	1.7	0.3	
	R1	1.1	0.1	1.3	1.3	0.5	0.6	0.0	5.0	43.3	0.0	2.3	1.5	