

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年並の発生であった。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 発生比多い発生であった。
- 4 白斑病 平年比やや多い発生であった。
- 5 白さび病 平年比多い発生であった。
- 6 アブラムシ類 . . . 発生を認めなかった（平年比少）。
- 7 コナガ 発生を認めなかった（平年並）。
- 8 ハモグリバエ類 . . 平年比やや少ない発生であった。
- 9 その他病害虫 . . 亀岡②でオオタバコガ幼虫（0.4頭/10株）、ウワバ類幼虫（0.4頭/10株）およびウイルス病（4.0%）認めた。また、弥栄①の調査株外でウイルス病を認めた。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和元年11月13日

調査場所	べと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (/10株)	無翅虫数 (/10株)	発生株率 (%)	幼虫・蛹数 (/10株)	発生株率 (%)	被害株率 (%)	
亀岡①	48.0	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
亀岡②	88.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	
弥栄①	0.0	0.0	20.0	4.0	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	元年	45.3	0.0	6.7	36.0	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
	平年比	並	並	多	やや多	多	並	並	少	並	並	やや少
	平年	40.3	0.1	0.2	15.1	0.3	0.1	3.5	5.9	0.8	5.6	13.9
	30年	64.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	4.0
	29年	50.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.5	17.0	13.0
	28年	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	18.0	1.5	13.0	10.0
	27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	23.0	43.0
	26年	36.0	0.0	0.8	39.2	3.2	0.0	0.2	1.6	0.1	0.8	21.6
	25年	1.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.3	5.1	14.0	0.0	0.0	13.0
	24年	29.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.4	13.9	8.0	0.0	0.0	1.0
	23年	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.9	14.0	0.1	1.0	13.0
22年	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	13.0	
21年	26.0	1.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	7.0	
発生 ほ場率 (%)	元年	66.7	0.0	33.3	100.0	33.3	0.0			0.0	66.7	
	平年比	やや多	並	並	多	多	少			並	やや多	
	平年	57.7	2.5	4.5	29.7	4.5	44.8			24.5	67.2	
	30年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3			0.0	66.7	
	29年	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0			75.0	75.0	
	28年	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0			50.0	100.0	
	27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			50.0	100.0	
	26年	60.0	0.0	20.0	80.0	20.0	40.0			20.0	80.0	
	25年	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	75.0			0.0	75.0	
	24年	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	75.0			0.0	25.0	
	23年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0			25.0	50.0	
22年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0			0.0	50.0		
21年	100.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0			25.0	50.0		