

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年並の発生であった。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 発生比やや多かった。
- 4 白斑病 平年比やや多かった。
- 5 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 . . . 発生比多かった。
- 7 コナガ 発生を認めなかった（平年並）。
- 8 ハモグリバエ類 . 平年比やや少なかった。
- 9 その他病害虫 . . シロイチモジヨトウ幼虫を亀岡市②で認めた（0.8頭/10株、寄生株率8.0%）。
 チョウ目幼虫を京丹後市久美浜町で認めた（0.8頭/10株、寄生株率8.0%）。
 カブラハバチ幼虫を京丹後市弥栄町で認めた（0.8頭/10株、寄生株率4.0%）。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和2年11月18日

調査場所	ベと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (/10株)	無翅虫数 (/10株)	発生株率 (%)	幼虫・蛹数 (/10株)	発生株率 (%)	被害株率 (%)	
亀岡市 ①	100.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.8	1.2	16.0	0.0	0.0	8.0	
亀岡市 ②	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0	1.6	6.0	32.0	0.0	0.0	4.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	5.2	91.6	84.0	0.0	0.0	0.0	
平均	2年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.9	24.8	34.0	0.0	0.0	3.0
	平年比	並	並	やや多	やや多	並	多	多	多	並	並	やや少
	平年	42.2	0.0	0.8	16.2	3.3	0.1	3.5	5.9	0.8	5.5	13.7
	元年	45.3	0.0	6.7	36.0	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
	30年	64.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	4.0
	29年	50.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.5	17.0	13.0
	28年	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	18.0	1.5	13.0	10.0
	27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	23.0	43.0
	26年	36.0	0.0	0.8	39.2	3.2	0.0	0.2	1.6	0.1	0.8	21.6
	25年	1.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.3	5.1	14.0	0.0	0.0	13.0
	24年	29.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.4	13.9	8.0	0.0	0.0	1.0
23年	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.9	14.0	0.1	1.0	13.0	
22年	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	13.0	
発生 ほ場率 (%)	2年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0	100.0			0.0	50.0	
	平年比	並	並	やや多	並	並	多			並	やや少	
	平年	54.3	0.0	7.8	34.7	7.8	44.8			22.0	68.8	
	元年	66.7	0.0	33.3	100.0	33.3	0.0			0.0	66.7	
	30年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3			0.0	66.7	
	29年	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0			75.0	75.0	
	28年	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0			50.0	100.0	
	27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			50.0	100.0	
	26年	60.0	0.0	20.0	80.0	20.0	40.0			20.0	80.0	
	25年	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	75.0			0.0	75.0	
	24年	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	75.0			0.0	25.0	
23年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0			25.0	50.0		
22年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0			0.0	50.0		