

ムギ

- 1 二条大麦では、赤かび病の発生は認めなかった(平年並)。
- 2 小麦では、赤かび病の発生は平年比多く、うどんこ病は50%のほ場で発生を認め、綾部市①②では多～甚発であった。
- 3 その他の病害虫は、綾部市①②の小麦でメイガによる心枯茎被害を認めた。

表1 二条大麦調査結果(令和元年5月16日)

	赤かび病	
	発病穂率(%)	発病度
亀岡市①	0.0	0.0
〃 ②	0.0	0.0
〃 ③	0.0	0.0
〃 ④	0.0	0.0
〃 ⑤	0.0	0.0
〃 ⑥	0.0	0.0
平 均	元年	0.0
	平年比	並
	平年	0.1
	30年	0.7
	29年	0.0
	28年	0.0
	27年	0.0
	26年	0.0
	25年	0.0
	24年	0.0
	23年	0.0
確 認 ほ 場 率	元年	0.0
	平年比	並
	平年	1.7
	30年	16.7
	29年	0.0
	28年	0.0
	27年	0.0
	26年	0.0
	25年	0.0
	24年	0.0
	23年	0.0
22年	0.0	
21年	0.0	

表2 小麦調査結果(令和元年5月13、16日)

	赤かび病		うどんこ病	
	発病穂率(%)	発病度	病斑面積率(%)	発病茎率(%)
福知山市①	0.0	0.0	0.1	12.0
〃 ②	0.0	0.0	0.04	4.0
〃 ③	0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ④	0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ⑤	0.0	0.0	0.3	12.0
〃 ⑥	0.0	0.0	0.0	0.0
綾部市 ①	12.0	2.0	14.2	100.0
〃 ②	4.0	0.7	29.6	100.0
南丹市 ①	4.0	0.7	0.0	0.0
〃 ②	0.0	0.0	0.0	0.0
平 均	元年	2.0	0.3	4.4
	平年比	多	多	-
	平年	0.1	0.03	0.0
	30年	0.0	0.0	0.0
	29年	0.7	0.1	0.0
	28年	0.0	0.0	-
	27年	0.4	0.1	-
	26年	0.0	0.0	-
	25年	0.0	0.0	-
	24年	0.0	0.0	-
	23年	0.0	0.0	0.0
確 認 ほ 場 率	元年	30.0	50.0	
	平年比	多	-	
	平年	2.7	0.0	
	30年	0.0	0.0	
	29年	16.7	0.0	
	28年	0.0	0.0	
	27年	10.0	-	
	26年	0.0	-	
	25年	0.0	-	
	24年	0.0	-	
	23年	0.0	-	
22年	0.0	0.0		
21年	0.0	0.0		

(程度別基準)

	程 度	無	少	中	多	甚
赤かび病 発病穂率(%)		0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病 病斑面積率(%)		0	1~4	5~8	9~16	17以上