

ムギ

- 1 赤かび病は二条大麦、小麦において発生を認めなかった(平年並)。
- 2 うどんこ病の発生は、小麦では認めなかった。
- 3 その他の病害虫は、小麦で黄斑症状を100%のほ場で認めた。

表1 二条大麦調査結果(令和3年5月19日) 表2 小麦調査結果(令和3年5月14日、19日)

		赤かび病		うどんこ病		黄斑症状				
		発病穂率(%)	発病度	発病穂率(%)	発病度	病斑面積率(%)	発病莖率(%)	斑点面積率(%)	被害莖率(%)	
亀岡市①		0.0	0.0							
	②	0.0	0.0							
	③	0.0	0.0							
	④	0.0	0.0							
	⑤	0.0	0.0							
	⑥	0.0	0.0							
平均	R3年	0.0	0.0							
	平年比	並	並							
	平年	0.1	0.01							
	R2年	0.0	0.0							
	R元年	0.0	0.0							
	H30年	0.7	0.1							
	H29年	0.0	0.0							
	H28年	0.0	0.0							
	H27年	0.0	0.0							
	H26年	0.0	0.0							
	H25年	0.0	0.0							
	H24年	0.0	0.0							
H23年	0.0	0.0								
確認ほ場率	R3年		0.0		0.0		0.0		100.0	
	平年比		並		(並)					
	平年		1.7		5.7		10.0			
	R2年		0.0		0.0		0.0		83.3	
	R元年		0.0		30.0		50.0			
	H30年		16.7		0.0		0.0			
	H29年		0.0		16.7		0.0			
	H28年		0.0		0.0		0.0			
	H27年		0.0		10.0					
	H26年		0.0		0.0					
	H25年		0.0		0.0					
	H24年		0.0		0.0					
H23年		0.0		0.0						
福知山市①		0.0	0.0			0.0	0.0	0.64	32.0	
	②	0.0	0.0			0.0	0.0	0.44	28.0	
	③	0.0	0.0			0.0	0.0	0.08	8.0	
	④	0.0	0.0			0.0	0.0	0.32	32.0	
	⑤	0.0	0.0			0.0	0.0	0.04	4.0	
	⑥	0.0	0.0			0.0	0.0	1.08	44.0	
	綾部市	①	0.0	0.0			0.0	0.0	20.00	100.0
		②	0.0	0.0			0.0	0.0	26.40	100.0
	南丹市	①	0.0	0.0			0.0	0.0	11.20	100.0
		②	0.0	0.0			0.0	0.0	8.00	100.0
	平均	R3年	0.0	0.0			0.0	0.0	6.82	54.8
		平年比(例年比)	並	並			-	(並)		
平年(例年)		0.3	0.06			1.1	(4.6)			
R2年		0.0	0.0			0.0	0.0	2.2	40.8	
R元年		2.0	0.3			4.4	22.8			
H30年		0.0	0.0			0.0	0.0			
H29年		0.7	0.1			0.0	0.0			
H28年		0.0	0.0			-	-			
H27年		0.4	0.1			-	-			
H26年		0.0	0.0			-	-			
H25年		0.0	0.0			-	-			
H24年		0.0	0.0			-	-			
H23年	0.0	0.0			-	0.0				

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率(%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病	病斑面積率(%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上