

ムギ

- 1 赤かび病:二条大麦では発生を認めず(平年並)、小麦においては、綾部市②の調査外で発生を認めた(平年比やや多)。
- 2 うどんこ病の発生は、小麦では認めなかった。
- 3 小麦で黄斑症状を100%のほ場で認めた。

表1 二条大麦調査結果(令和5年5月17日) 表2 小麦調査結果(令和5年5月16日)

| | | 赤かび病 | | うどんこ病 | | 黄斑症状 | | | |
|-------|--|---------|------|---------|------|----------|---------|----------|---------|
| | | 発病穂率(%) | 発病度 | 発病穂率(%) | 発病度 | 病斑面積率(%) | 発病基率(%) | 斑点面積率(%) | 被害基率(%) |
| 亀岡市① | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 100.0 |
| " ② | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 100.0 |
| " ③ | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 100.0 |
| " ④ | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 100.0 |
| " ⑤ | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 100.0 |
| " ⑥ | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 76.0 |
| 綾部市① | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 100.0 |
| " ② | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 100.0 |
| 南丹市① | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 100.0 |
| " ② | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 100.0 |
| 平 | | R5年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 97.6 |
| 均 | | 平年比 | 並 | 並 | (並) | (並) | - | - | - |
| | | 平年 | 0.1 | 0.01 | 0.9 | (3.8) | - | - | - |
| | | R4年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 69.2 | - |
| | | R3年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 54.8 | - |
| | | R2年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 40.8 | - |
| | | R元年 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 4.4 | 22.8 | - |
| | | H30年 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | | H29年 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| | | H28年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| | | H27年 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | - | - | - |
| | | H26年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| | | H25年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 確認ほ場率 | | R5年 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| | | 平年比 | 並 | 並 | やや多 | (並) | - | - | - |
| | | 平年 | 1.7 | 1.7 | 5.7 | 7.1 | - | - | - |
| | | R4年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | - | - |
| | | R3年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | - |
| | | R2年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | - | - |
| | | R元年 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | - | - | - |
| | | H30年 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| | | H29年 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | - | - | - |
| | | H28年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| | | H27年 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - |
| | | H26年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| | | H25年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |

(程度別基準)

| | 程度 | 無 | 少 | 中 | 多 | 甚 |
|-------|----------|---|------|-------|-------|------|
| 赤かび病 | 発病穂率(%) | 0 | 1~40 | 41~60 | 61~80 | 81以上 |
| うどんこ病 | 病斑面積率(%) | 0 | 1~4 | 5~8 | 9~16 | 17以上 |