

# 果樹の病害虫

## ナシ

発生程度別基準

(%)

	黒斑病	黒星病	赤星病	うどんこ病	ハダニ類	アブラムシ類	ハマキムシ類	カメムシ類・ シンクイムシ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	寄生新梢率	被害新梢率	被害果率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1~5	1~5	1~5	1~5	1~15	1~5	1~2	1~2
中	6~15	6~15	6~15	6~15	16~30	6~15	3~5	3~5
多	16~30	16~30	16~30	16~30	31~45	16~30	6~10	6~10
甚	31以上	31以上	31以上	31以上	46以上	31以上	11以上	11以上

- ・黒斑病は、平年比やや多い発生であった。
- ・黒星病は、平年比やや多い発生であった。
- ・赤星病は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・うどんこ病は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・ハダニ類は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・アブラムシ類は、平年並の発生であった。
- ・ハマキムシ類は、発生を認めなかった（例年並）。
- ・カメムシ類、シンクイムシ類は、発生を認めなかった（平年並）。
- ・カイガラムシ類は発生を認めなかった。

ナシ巡回調査結果（100葉、50果、50新梢調査）

調査日：令和5年6月13、14日

(%)

調査結果	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類		アブラムシ類		ハマキムシ類		カメムシ類		シンクイムシ類		カイガラムシ類		
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生新梢率	ほ場率	被害新梢率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	被害果率	ほ場率	
京丹後市久美浜町①	二十	4.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			-	
〃 ②	〃	2.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-			-	
〃 ③	〃	49.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-			-	
京丹後市網野町 ①	〃	6.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-			-	
〃 ②	〃	4.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			0.0	
〃 ③	赤			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-			-	
京丹後市久美浜町④	〃			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			0.0	
〃 ⑤	〃			34.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-			-	
八幡市 ①	〃			2.0		0.0		0.0		0.0		12.0		0.0		0.0		0.0			0.0	
〃 ②	〃			8.0		0.0		0.0		0.0		2.0		0.0		-		-			-	
京丹後市久美浜町⑥	ゴ	0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-			-	
R5年		13.0	100.0	8.8	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比（例年比）		多	やや多	やや多	やや多	やや少	やや少	並	並	並	並	（並）	（並）	（並）	（並）	並	並	並	並	-	-	
平年（例年）		3.2	61.7	3.5	40.0	0.7	24.3	0.0	1.7	1.3	20.1	（6.0）	（31.3）	（0.0）	（1.3）	0.3	9.0	0.0	0.0	-	-	
R4年		4.5	100.0	5.4	40.0	1.4	30.0	0.0	0.0	0.7	10.0	0.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
R3年		4.4	100.0	3.2	40.0	0.7	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
R2年		3.0	60.0	9.8	100.0	0.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0			
R元年		4.2	100.0	2.8	20.0	1.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	63.6	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0			
H30年		4.6	80.0	4.0	40.0	1.7	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
H29年		0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	63.6	13.5	72.7	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0			
H28年		3.8	40.0	1.8	40.0	0.0	9.1	0.1	9.1	1.2	27.3	4.9	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
H27年		2.7	50.0	8.2	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	50.0	-	-	-	-	1.6	40.0	0.0	0.0			
H26年		4.5	66.7	0.2	20.0	0.3	16.7	0.1	8.3	0.4	8.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
H25年		0.8	20.0	0.0	0.0	1.5	41.7	0.0	0.0	4.9	41.7	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0			

\*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀、黒斑病及び黒星病の発病葉率（数字）は平均値の計算に含めていない。

\*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。