

※ 2016 年度から漁海況情報は年 5 回 (春夏秋冬および年報) の発行とさせていただきます。
春号は 4 月, 夏号は 7 月, 秋号は 10 月, 冬号は 1 月ごろ, 年報は 2 月ごろの発行を予定しています。

京都府漁海況情報


京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/
電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532

海の状況

【現況】

平成 28 年 7~9 月における京都府周辺の表層水温は、「平年よりはなはだ高め」~「平年並み」で推移していました。

京都府沖の表層水温 (0~50m 深平均)



| 京都沖水温の平年および前年との比較 | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | 7月 | 8月 | 9月 |
| 京都沖の表層水温 | 21.7 °C | 22.7 °C | 23.6 °C |
| 前年比 | +2.2 °C | +1.0 °C | -0.5 °C |
| 平年比 | +2.1 °C (はなはだ高め) | -0.3 °C (平年並み) | -0.5 °C (平年並み) |


| 夏 (7~9 月) の天気まとめ | |
|------------------|-----------|
| 京都北部周辺の平均気温 | 平年より高かった。 |
| 京都北部周辺の降水量 | 平年より多かった。 |

資料元：気象庁


京都府周辺の各層水温(2016年7~9月)

7月上旬



資料元：日本海区水産研究所



8月上旬



9月上旬



【今後の見込み】

資料元：気象庁


| 向こう1か月程度の予報 | |
|-------------|--------------------|
| 京都府周辺の表層水温 | 「平年よりやや高め」で推移する見込み |
| 対馬暖流の勢力 | 「平年より強い」で推移する見込み |

漁模様 2016年6～8月

《定置網漁業》【6月】

サワラが前年に引き続き好調、ウルメイワシも前年や平年に比べて好調でした。一方、マアジが平年の4割強（前年の5割強）と低調でした。全体では平年の8割強（前年の9割強）でした。

2016年6月の地域別漁獲量(上位5魚種)




| 6月漁獲量(トン) 京都府漁協集計 | | | | |
|-------------------|-------|-------------|--------------|---|
| 魚種 | 2016年 | 2015年(前年比) | 平年(平年比) | 備考 |
| サワラ | 167.9 | 224.3 (75%) | 57.3 (293%) | ＜サワラ＞ さごし銘柄(体重0.4kg以上1.0kg未満)がほぼ全てでした。 |
| マアジ | 141.3 | 276.6 (51%) | 317.5 (44%) | |
| カタクチイワシ(たれ) | 131.9 | 72.4 (182%) | 285.7 (46%) | ＜マアジ＞ 体長は2cm～22cm台でした。 |
| トビウオ類 | 109.5 | 122.7 (89%) | 98.6 (111%) | |
| ブリ | 85.7 | 74.3 (115%) | 87.5 (98%) | ＜カタクチイワシ＞ 体長は3cm～6cm台でした。 |
| イカ類 | 37.8 | 25.0 (151%) | 34.9 (108%) | |
| スズキ | 29.3 | 18.6 (158%) | 11.4 (257%) | ＜ブリ＞ つばす銘柄が6割弱、はまち銘柄が4割弱、ぶり銘柄、まるご銘柄は1割未満でした。 |
| ウルメイワシ | 27.2 | 0.0 — | 0.2 (15620%) | |
| アカカマス | 24.8 | 16.8 (147%) | 17.0 (146%) | ＜イカ類＞ ケンサキイカ(白いか)が9割でした。 |
| マルアジ(青あじ) | 21.7 | 15.3 (142%) | 19.7 (110%) | |
| その他 | 59.1 | 44.6 (133%) | 61.8 (96%) | |
| 合計 | 836.1 | 890.6 (94%) | 991.7 (84%) | |

平年は過去10年平均

【7月】

カタクチイワシが平年の1.5倍(前年の1.1倍), イカ類が平年の1.3倍(前年の2.2倍)と好調でした。一方, マアジ, サワラ, トビウオ類は前年や平年を下回り, 低調でした。全体では平年の1.1倍(前年の9割弱)でした。

2016年7月の地域別漁獲量(上位5魚種)




| 7月漁獲量(トン) 京都府漁協集計 | | | | |
|-------------------|-------|--------------|--------------|--|
| 魚種 | 2016年 | 2015年(前年比) | 平年(平年比) | 備考 |
| カタクチイワシ(たれ) | 537.9 | 489.4 (110%) | 361.0 (149%) | <カタクチイワシ> 体長は3cm~8cm台でした。 |
| マアジ | 103.3 | 149.7 (69%) | 139.0 (74%) | <マアジ> 体長は4cm~21cm台でした。 |
| サワラ | 89.7 | 141.9 (63%) | 109.3 (82%) | <サワラ> さごし銘柄(体重0.4kg以上1.0kg未満)が6割強, さわら銘柄(体重1.0kg以上3.0kg未満)が4割弱, さわら大銘柄(体重3.0kg以上), やなぎ銘柄(体重0.4kg未満)はごくわずかでした。 |
| ブリ | 67.5 | 152.0 (44%) | 69.4 (97%) | <ブリ> つばす銘柄が8割弱, はまち銘柄が2割, ぶり銘柄, まるご銘柄はごくわずかでした。 |
| トビウオ類 | 32.1 | 50.3 (64%) | 65.4 (49%) | |
| イカ類 | 28.0 | 12.7 (221%) | 21.2 (132%) | |
| サバ類 | 25.0 | 43.7 (57%) | 24.4 (103%) | |
| スズキ | 24.5 | 12.9 (190%) | 10.1 (242%) | |
| タイ類 | 9.2 | 4.6 (201%) | 7.5 (123%) | |
| アカカマス | 8.3 | 5.6 (147%) | 7.8 (105%) | |
| その他 | 33.7 | 62.6 (54%) | 54.5 (62%) | |
| 合計 | 959.2 | 1125.2 (85%) | 869.6 (110%) | |

平年は過去10年平均

【8月】

ブリが平年の2.3倍（前年の1.2倍）、シイラが平年の8.1倍（前年の13.4倍）と好調でした。一方、カタクチイワシは平年の4割弱（前年の2割強）、マアジは平年の8割強（前年の8割弱）と低調でした。全体では平年の1.2倍（前年の8割強）でした。

2016年8月の地域別漁獲量(上位5魚種)



| 8月漁獲量(トン) 京都府漁協集計 | | | | |
|-------------------|-------|--------------|--------------|---|
| 魚種 | 2016年 | 2015年(前年比) | 平年(平年比) | 備考 |
| ブリ | 289.0 | 245.7 (118%) | 126.2 (229%) | <カタクチイワシ> 体長は4cm~10cm台でした。 |
| サワラ | 121.4 | 136.2 (89%) | 98.7 (123%) | |
| シイラ | 100.9 | 7.6 (1335%) | 12.4 (815%) | <マアジ> 体長は3cm~22cm台でした。 |
| カタクチイワシ(たれ) | 86.6 | 392.3 (22%) | 228.7 (38%) | |
| マアジ | 66.8 | 80.6 (83%) | 84.7 (79%) | <ブリ> ぶり銘柄が6割弱、はまち銘柄が2割強、まるご銘柄は2割弱、つばす銘柄は1割未満でした。 |
| サバ類 | 20.4 | 34.7 (59%) | 12.8 (159%) | |
| イカ類 | 14.7 | 5.3 (280%) | 7.5 (196%) | |
| シロサバフグ(さんきゅう) | 13.3 | 0.3 (4615%) | 3.2 (412%) | <サワラ> さわら銘柄(体重1.0kg以上3.0kg未満)が6割強、やなぎ銘柄(体重0.4kg未満)が3割弱、さごし銘柄(体重0.4kg以上1.0kg未満)が1割弱、さわら大銘柄(体重3.0kg以上)はごくわずか(0.6%)でした。 |
| スズキ | 8.7 | 2.9 (301%) | 6.0 (145%) | |
| マルアジ(青あじ) | 7.3 | 6.6 (110%) | 9.5 (77%) | |
| その他 | 44.0 | 42.9 (102%) | 59.0 (75%) | |
| 合計 | 772.9 | 955.0 (81%) | 648.7 (119%) | |

平年は過去10年平均


《底曳網漁業》【6～8月】

資源保護のため6月から8月は休漁です。

《釣り・はえなわ漁業》【6月】

全体の水揚量は、平年の8割強（前年の1.0倍）でした。

2016年6月の漁獲量(上位5魚種)




| 6月漁獲量(トン) 京都府漁協集計 | | | | | |
|-------------------|-------|-------------|------------|---|--|
| 魚種 | 2016年 | 2015年(前年比) | 平年(平年比) | 備考 | |
| イカ類 | 9.9 | 9.6 (104%) | 10.7 (93%) | <イカ類> スルメイカが8割強, ケンサキイカ(白いか)が2割弱などでした。 <タイ類> マダイが7割強, キダイ(れんこ鯛)が2割強などでした。 <サワラ> さごし銘柄(体重 0.4kg 以上 1.0kg 未満)がほぼ全てでした。 <ブリ> ぶり銘柄が4割, まるご銘柄が3割強, はまち銘柄, つばす銘柄はそれぞれ1割強でした。 | |
| タイ類 | 3.9 | 3.4 (112%) | 3.8 (102%) | | |
| メバル類 | 2.7 | 1.5 (173%) | 2.1 (124%) | | |
| サワラ | 2.0 | 1.4 (144%) | 2.4 (83%) | | |
| ブリ | 1.6 | 2.4 (66%) | 3.1 (51%) | | |
| アカアマダイ(ぐじ) | 1.5 | 1.6 (90%) | 1.7 (87%) | | |
| スズキ | 0.3 | 0.3 (105%) | 0.3 (101%) | | |
| カレイ類 | 0.2 | 0.1 (162%) | 0.3 (89%) | | |
| カワハギ | 0.2 | 0.1 (250%) | 0.0 (362%) | | |
| タチウオ | 0.1 | 0.4 (41%) | 0.4 (37%) | | |
| その他 | 1.7 | 3.2 (51%) | 4.4 (38%) | | |
| 合計 | 24.1 | 24.1 (100%) | 29.3 (82%) | | |

平年は過去10年平均

【7月】

全体の水揚量は、平年の9割弱（前年の9割弱）でした。

2016年7月の漁獲量(上位5魚種)




| 7月漁獲量(トン) 京都府漁協集計 | | | | |
|-------------------|-------|------------|------------|---------------------------------------|
| 魚種 | 2016年 | 2015年(前年比) | 平年(平年比) | 備考 |
| タイ類 | 3.5 | 3.1 (112%) | 3.2 (108%) | <タイ類> マダイが6割強, キダイ(れんこ鯛)が3割強などでした。 |
| メバル類 | 3.1 | 1.7 (181%) | 2.3 (135%) | |
| イカ類 | 3.0 | 5.9 (51%) | 4.5 (66%) | |
| アカアマダイ(ぐじ) | 2.4 | 1.4 (171%) | 1.7 (144%) | |
| ウマヅラハギ(長はぎ) | 0.8 | 2.0 (39%) | 0.5 (158%) | |
| スズキ | 0.4 | 0.4 (96%) | 0.2 (177%) | <イカ類> ほぼ全てケンサキイカ(白いか)でした。 |
| アジ類 | 0.2 | 0.3 (88%) | 0.7 (33%) | |
| カレイ類 | 0.2 | 0.2 (116%) | 0.4 (54%) | |
| ヒラマサ | 0.1 | 0.0 (635%) | 0.0 (348%) | |
| カワハギ | 0.1 | 0.0 (197%) | 0.0 (187%) | |
| その他 | 1.8 | 3.0 (61%) | 4.0 (45%) | |
| 合計 | 15.5 | 18.0 (86%) | 17.6 (88%) | |

平年は過去10年平均

【8月】

全体の水揚量は、平年の2.2倍（前年の3.1倍）と好調でした。

2016年8月の漁獲量(上位5魚種)



| 8月漁獲量(トン) 京都府漁協集計 | | | | |
|-------------------|-------|-------------|-------------|---|
| 魚種 | 2016年 | 2015年(前年比) | 平年(平年比) | 備考 |
| ブリ | 9.4 | 3.4 (280%) | 3.8 (250%) | <ブリ> まるご銘柄が6割強、はまち銘柄が4割弱でした。 |
| イカ類 | 7.7 | 1.1 (689%) | 3.2 (243%) | |
| タイ類 | 5.2 | 1.7 (304%) | 2.2 (234%) | |
| サワラ | 4.7 | 1.9 (247%) | 1.6 (298%) | |
| アカアマダイ(ぐじ) | 2.2 | 0.5 (402%) | 1.2 (185%) | |
| メバル類 | 2.0 | 0.2 (1084%) | 0.5 (384%) | <イカ類> ソデイカ(たるいか)が8割強、ケンサキイカ(白いか)が2割弱などでした。 |
| ウマヅラハギ(長はぎ) | 0.4 | 0.3 (117%) | 0.3 (131%) | |
| スズキ | 0.2 | 0.2 (103%) | 0.2 (103%) | <タイ類> マダイが6割強、キダイ(れんこ鯛)が3割強などでした。 |
| タチウオ | 0.2 | 0.1 (328%) | 0.1 (184%) | |
| カワハギ | 0.1 | 0.0 | 0.0 (392%) | |
| その他 | 1.5 | 1.5 (105%) | 2.1 (74%) | |
| 合計 | 33.6 | 10.9 (309%) | 15.2 (222%) | |

平年は過去10年平均