

## R5シーズン養鶏農場で高病原性鳥インフルエンザ続発

◆11月25日佐賀県の採卵鶏農場での初発事例に引き続いて新たに11月27日に茨城県笠間市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。



◆農場に出入りする人、資機材、車両等の消毒など衛生対策、普段は目が届きにくい場所も含んだ野鳥や野生動物の侵入防止、毎日の健康観察と異常の早期発見及び早期通報の徹底をお願いします。

◆農林水産省が発行した発生予防のポイントと重点対策に関するリーフレット(別添)もご参考としてください。

# 発生予防のポイント

01

## 農場に入るまでの 人・車両・物品は衛生対策

生産者や労働者などを含め、農場管理区域と畜舎内に入る人は衛生対策を徹底。乗車も入場時の消毒・消毒を必ず実施。物品は高圧洗浄機を用い、中心を避けて汚染場所は消毒・消毒を怠らない。

**⚠** 農場にはウイルスが表面に付着。農場内・畜舎内には入れない。



02

## 農場管理区域・畜舎内ごとに 専用の靴を着用

農場に入るとも、畜舎内に入る時は必ず専用の靴を履く。農場内では専用の衣装を着用。

**⚠** 農場人・農場に入った直後、戻さないよう場所を明確に。



03

## ウイルスを媒介する 野生動物の侵入防止対策

畜舎内は定期的清掃し、鳥糞集りや糞尿の溜りなどはすぐに清掃。目の届きにくい屋根裏や入り口も注意が必要。

**⚠** 農場に必要とらない。農場内に入れず。消毒液・作業服の定期的な更新。



高層階の山水環境を確保し、  
低層階への日照確保により、  
採光を確保し採光不足を防ぐ。



高層は両面して採光確保の確保、  
低層は採光的、また採光不足  
対策を講ずる。

重点対策



高層は採光不足の確保に採光  
確保を講ずる、  
採光不足の確保に採光不足  
対策を講ずる。



高層階の採光確保  
確保の確保に採光  
確保の確保を講ずる、  
採光不足の確保に採光不足  
対策を講ずる。



高層階の採光確保、  
高層、また採光不足の  
対策を講ずる。



高層一階高層階の採光確保  
採光不足の確保に採光不足  
対策を講ずる。



高層一階高層階の採光確保  
採光不足の確保に採光不足  
対策を講ずる。