ブドウ

・べと病は久美浜町②で発生を認め、平年比やや少なかった。
・うどんこ病、さび病は発生を認めなかった(平年並)。
・褐斑病は山科区②で発生を認め、平年比多かった。
・ハダニ類は発生を認めなかった(平年並)。
・果房調査は久美浜町①のみで行い、病害虫の発生は認めなかった。
・その他の病害虫は、久美浜町①のほ場の周辺部においてマメコガネの発生を認めた。

発生程度別基準　　（%）

	べと病	さび病	褐斑病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	１～１０	１～１０	１～１０	１～１０
中	１１～３０	１１～３０	１１～３０	１１～２０
多	３１～５０	３１～７０	３１～７０	２１～４０
甚	５１以上	７１以上	７１以上	４１以上

ブドウ巡回調査結果（１００葉調査）　　調査日：令和２年７月１４、１６日

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類		備考
	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	発病葉率(%)	ほ場率(%)	寄生葉率(%)	ほ場率(%)	
京都市山科区　①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　②	0.0		0.0		0.0		2.0		0.0		
京丹後市久美浜町①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		ほ場の端にマメコガネを確認
〃　②	5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　③	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
〃　④	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
Ｒ２年	0.8	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0	
平年比	やや少	やや少	並	並	並	並	多	多	並	並	
平　年	6.8	53.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.3	
Ｒ元年	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ３０年	15.8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２９年	1.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	33.3	
Ｈ２８年	5.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２７年	6.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２６年	1.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２４年	4.2	60.0	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２３年	20.2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ｈ２２年	13.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	