

水稻

・病害虫の発生状況

(1) 葉いもち

山城では**平年比やや多く**、南丹及び中丹では**平年比多く**、丹後では平年並。全体では**平年比多い発生**。

いもち病発生予察システム (BLASTAM) では、7月1日、2日、6日から20日に広範囲で感染好適条件あるいは感染準好適条件を記録した。特に、1～2日には園部、6日には美山で感染好適条件を記録した。

(2) 紋枯病

発生を認めなかった (平年並)。

(3) 白葉枯病

発生を認めなかった。

(4) 縞葉枯病

発生を認めなかった。

(5) ばか苗病

発生を認めなかった。

(6) ツマグロヨコバイ

本田見取り調査では、山城、南丹及び中丹で平年比やや少なく、丹後で平年並の発生。

すくい取り調査では、山城及び中丹で平年比やや少なく、南丹及び丹後で平年比少ない発生。

全体では平年比少ない発生。

(7) セジロウンカ

本田見取り調査では、山城及び中丹で平年比やや少なく、南丹及び丹後で平年比少ない発生。

すくい取り調査では、山城で平年比少なく、南丹で平年並、中丹及び丹後で平年比やや多い発生。

全体では平年比やや少ないの発生。

(8) トビイロウンカ

巡回調査及び予察灯調査ともに発生を認めなかった (平年並)。

(9) ニカメイガ

巡回調査では発生を認めなかった。

(10) イネツトムシ (イチモンジセセリ)

丹後で幼虫の発生を認め、全体では平年並の発生であった。

(11) イネアオムシ (フタオビコヤガ)

巡回調査で幼虫の発生を認めた。

(12) コブノメイガ

巡回調査では発生を認めなかった (平年並) が、7月中旬に普及センターから被害報告があった。

(13) 斑点米カメムシ類

本田すくい取り調査では、山城及び中丹で平年並、南丹及び丹後で平年比やや多い発生。

全体では平年比やや多い発生。

畦畔すくい取り調査では、山城で平年並、南丹、中丹及び丹後で平年比やや少なく、全体では平年比やや少ない発生。

アサギカスミカメの予察灯 (60W) への誘殺数は、京田辺市及び京丹後市で平年並、亀岡市で平年比多い。

アヒガホミドリカスミカメの予察灯 (60W) への誘殺数は、京田辺市で平年比やや少なく、亀岡市で平年比多く、京丹後市で平年比少ない。

(14) ジャンボタニシ (スクミリンゴガイ)

山城及び南丹地域の一部で発生を認めた。

(15) その他

コバネイナゴの発生を広域で認めた。

発病・発生程度別基準

| | | 無 | 少 | 中 | 多 | 甚 |
|----------|-------------|---|-------|---------|----------|--------|
| 葉いもち | 発病度 | 0 | 1~20 | 21~40 | 41~70 | 71以上 |
| 紋枯病 | 発病度 | 0 | 1~20 | 21~40 | 41~70 | 71以上 |
| セジロウンカ | 25株当り虫数 | 0 | 1~250 | ~1250 | ~2500 | 2501以上 |
| | すくい取り虫数 | 0 | 1~100 | 101~300 | 301~700 | 701以上 |
| ツマグロヨコバイ | 25株当り虫数 | 0 | 1~125 | ~375 | ~750 | 751以上 |
| | すくい取り虫数 | 0 | 1~50 | 51~750 | 751~1500 | 1501以上 |
| 斑点米カメムシ類 | すくい取り虫数(本田) | 0 | 1~3 | 4~10 | 11~30 | 31以上 |
| ニカメイガ | 被害株率 | 0 | 1~30 | 31~60 | 61~90 | 91以上 |
| イネツトムシ | 25株当り幼虫数 | 0 | 1~10 | 11~20 | 21~40 | 41以上 |
| イネアオムシ | 25株当り幼虫数 | 0 | 1~25 | ~100 | ~250 | 251以上 |
| コブノメイガ | 被害葉率 | 0 | 1~5 | 6~15 | 16~45 | 46以上 |

表1 葉いもち調査結果（7月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

| 年度 | 山城 | | | 南丹 | | | 中丹 | | | 丹後 | | | 京都府 | | |
|-----|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|
| | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 |
| R5 | 50.0 | 9.3 | 2.3 | 88.9 | 32.9 | 8.2 | 66.7 | 25.3 | 8.0 | 11.1 | 1.3 | 0.3 | 50.0 | 17.2 | 4.6 |
| 平年比 | 多 | やや多 | やや多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 多 | 並 | 並 | 並 | 多 | 多 | 多 |
| | やや多 | | | 多 | | | 多 | | | 並 | | | 多 | | |
| 平年 | 23.3 | 4.3 | 1.7 | 23.3 | 11.0 | 3.1 | 20.0 | 4.5 | 1.2 | 8.9 | 2.0 | 0.5 | 18.0 | 5.7 | 1.7 |
| R4 | 33.3 | 6.0 | 1.5 | 44.4 | 14.7 | 3.7 | 33.3 | 10.7 | 2.7 | 22.2 | 10.7 | 2.7 | 33.3 | 10.9 | 2.7 |
| R3 | 33.3 | 2.7 | 0.7 | 55.6 | 24.9 | 6.2 | 16.7 | 7.3 | 1.8 | 11.1 | 3.6 | 0.9 | 30.0 | 10.5 | 2.6 |
| R2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.9 | 0.2 | 16.7 | 2.0 | 0.5 | 22.2 | 4.4 | 1.1 | 16.7 | 2.0 | 0.5 |
| R1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.7 | 0.2 | 11.1 | 0.4 | 0.1 | 6.7 | 0.4 | 0.1 |
| H30 | 33.3 | 2.0 | 0.5 | 22.2 | 5.8 | 1.4 | 50.0 | 2.0 | 0.5 | 11.1 | 0.4 | 0.1 | 26.7 | 2.7 | 0.7 |
| H29 | 50.0 | 10.7 | 2.7 | 11.1 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 3.9 | 1.0 |
| H28 | 33.3 | 20.0 | 10.7 | 22.2 | 12.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 7.7 | 3.2 |
| H27 | 16.7 | 0.7 | 0.2 | 11.1 | 7.1 | 1.8 | 50.0 | 16.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 5.6 | 1.6 |
| H26 | 16.7 | 1.3 | 0.3 | 33.3 | 28.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.4 | 0.1 | 16.7 | 8.8 | 3.1 |
| H25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 10.7 | 2.7 | 16.7 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 4.4 | 1.1 |

※詳細は表13参照。

表2 紋枯病調査結果（7月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

| 年度 | 山城 | | | 南丹 | | | 中丹 | | | 丹後 | | | 京都府 | | |
|-----|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|
| | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 | 確認 ほ場率 | 発病 株率 | 発病 度 |
| R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平年比 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 |
| | 並 | | | 並 | | | 並 | | | 並 | | | 並 | | |
| 平年 | 5.0 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.1 |
| R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R3 | 33.3 | 1.3 | 0.3 | 11.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.4 | 0.1 |
| R2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.5 | 0.1 |
| H29 | 16.7 | 1.3 | 0.3 | 11.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.4 | 0.2 |
| H28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.3 | 0.1 |
| H26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| H25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

※詳細は表13参照。

表3 ツマグロヨコバイ調査結果（7月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R5 | 33.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.2 |
| 平年比 | 並 | 少 | やや少 | やや少 | やや少 | 少 | 並 | 並 | 少 | 少 |
| | やや少 | | やや少 | | やや少 | | 並 | | 少 | |
| 平年 | 45.0 | 4.3 | 21.1 | 1.1 | 33.3 | 2.2 | 18.9 | 0.9 | 27.7 | 1.9 |
| R4 | 33.3 | 1.0 | 44.4 | 0.8 | 33.3 | 1.5 | 33.3 | 1.7 | 36.7 | 1.1 |
| R3 | 66.7 | 2.3 | 11.1 | 0.1 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 0.6 |
| R2 | 50.0 | 3.2 | 44.4 | 1.4 | 33.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1.2 |
| R1 | 66.7 | 2.5 | 11.1 | 0.1 | 66.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 2.3 |
| H30 | 33.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.5 |
| H29 | 50.0 | 2.3 | 11.1 | 0.2 | 33.3 | 0.3 | 22.2 | 0.2 | 26.7 | 0.7 |
| H28 | 66.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3.3 | 33.3 | 3.1 | 30.0 | 2.6 |
| H27 | 33.3 | 17.8 | 11.1 | 0.1 | 16.7 | 3.5 | 11.1 | 0.1 | 16.7 | 4.3 |
| H26 | 33.3 | 1.5 | 33.3 | 1.7 | 50.0 | 1.8 | 66.7 | 2.8 | 46.7 | 2.0 |
| H25 | 16.7 | 6.0 | 44.4 | 6.9 | 16.7 | 0.7 | 22.2 | 0.7 | 26.7 | 3.6 |

表4 ツマグロヨコバイ調査結果（7月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R5 | 16.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.1 |
| 平年比 | やや少 | 少 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 少 | 少 |
| | やや少 | | 並 | | 並 | | 並 | | 少 | |
| 平年 | 38.3 | 3.3 | 6.7 | 0.1 | 16.7 | 0.4 | 7.8 | 0.2 | 15.3 | 0.8 |
| R4 | 16.7 | 1.3 | 11.1 | 0.1 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.4 |
| R3 | 16.7 | 0.7 | 11.1 | 0.1 | 33.3 | 0.8 | 11.1 | 0.3 | 16.7 | 0.4 |
| R2 | 50.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.3 | 13.3 | 0.3 |
| R1 | 33.3 | 0.8 | 11.1 | 0.1 | 16.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.3 |
| H30 | 50.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.7 |
| H29 | 33.3 | 2.7 | 11.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.6 |
| H28 | 50.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.9 |
| H27 | 33.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.2 | 11.1 | 0.1 | 13.3 | 2.3 |
| H26 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.8 | 22.2 | 0.2 | 16.7 | 0.3 |
| H25 | 66.7 | 8.0 | 22.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 1.2 | 26.7 | 2.1 |

* 虫数は、1ほ場当たりの平均値。詳細は表16参照。

表5 セジロウカ調査結果（7月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R5 | 33.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.2 |
| 平年比 | 少 | 並 | 少 | 少 | やや少 | やや少 | 少 | 少 | 少 | 少 |
| | やや少 | | 少 | | やや少 | | 少 | | 少 | |
| 平年 | 80.0 | 13.3 | 44.4 | 1.8 | 58.3 | 2.8 | 43.3 | 2.5 | 54.0 | 4.5 |
| R4 | 50.0 | 2.2 | 11.1 | 0.1 | 16.7 | 0.2 | 11.1 | 1.3 | 20.0 | 0.9 |
| R3 | 50.0 | 5.7 | 11.1 | 0.1 | 66.7 | 2.2 | 11.1 | 0.3 | 30.0 | 1.7 |
| R2 | 100.0 | 23.5 | 55.6 | 2.1 | 83.3 | 2.2 | 66.7 | 6.0 | 73.3 | 7.6 |
| R1 | 100.0 | 16.3 | 11.1 | 0.7 | 66.7 | 4.7 | 55.6 | 0.9 | 53.3 | 4.7 |
| H30 | 50.0 | 4.2 | 33.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 |
| H29 | 83.3 | 8.5 | 66.7 | 1.8 | 50.0 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 56.7 | 2.8 |
| H28 | 100.0 | 28.0 | 77.8 | 4.6 | 83.3 | 2.8 | 100.0 | 9.4 | 90.0 | 10.4 |
| H27 | 100.0 | 34.0 | 44.4 | 1.8 | 66.7 | 2.7 | 33.3 | 1.3 | 56.7 | 8.3 |
| H26 | 83.3 | 4.7 | 33.3 | 1.6 | 83.3 | 4.3 | 44.4 | 1.4 | 56.7 | 2.7 |
| H25 | 83.3 | 6.0 | 100.0 | 4.1 | 66.7 | 7.0 | 77.8 | 3.0 | 83.3 | 4.7 |

* 虫数は、1ほ場当たりの平均値。詳細は表14参照。

表6 セジロウカ調査結果（7月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.5 | 11.1 | 0.6 | 10.0 | 0.5 |
| 平年比 | 少 | 少 | 並 | 並 | 並 | やや多 | 並 | やや多 | やや少 | 並 |
| | 少 | | 並 | | やや多 | | やや多 | | 並 | |
| 平年 | 53.3 | 2.3 | 18.9 | 0.4 | 26.7 | 0.7 | 18.9 | 0.3 | 27.3 | 0.8 |
| R 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R 3 | 33.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.0 | 22.2 | 0.3 | 20.0 | 0.6 |
| R 2 | 83.3 | 4.5 | 66.7 | 0.8 | 83.3 | 3.2 | 22.2 | 0.2 | 60.0 | 1.8 |
| R 1 | 16.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.1 | 6.7 | 0.1 |
| H30 | 50.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.2 |
| H29 | 66.7 | 1.7 | 11.1 | 0.1 | 16.7 | 0.2 | 22.2 | 0.2 | 26.7 | 0.5 |
| H28 | 83.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.7 | 11.1 | 0.3 | 30.0 | 0.8 |
| H27 | 66.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.3 | 22.2 | 0.3 | 23.3 | 1.3 |
| H26 | 50.0 | 1.3 | 33.3 | 0.3 | 33.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.5 |
| H25 | 83.3 | 4.3 | 77.8 | 2.9 | 33.3 | 0.8 | 77.8 | 2.0 | 70.0 | 2.5 |

* 虫数は、1ほ場当たりの平均値。詳細は表16参照。

表7 トビロウカ調査結果（7月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平年比 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 |
| | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | |
| 平年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

* 虫数は、1ほ場当たりの平均値。

表8 斑点米カメムシ類調査結果（7月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R 5 | 16.7 | 0.2 | 55.6 | 0.6 | 16.7 | 0.2 | 22.2 | 0.2 | 30.0 | 0.3 |
| 平年比 | 並 | 並 | 多 | やや多 | 並 | 並 | やや多 | 並 | やや多 | 並 |
| | 並 | | やや多 | | 並 | | やや多 | | やや多 | |
| 平年 | 25.0 | 0.8 | 16.7 | 0.4 | 10.0 | 0.2 | 13.3 | 0.4 | 16.0 | 0.4 |
| R 4 | 16.7 | 1.2 | 22.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.0 | 20.0 | 0.9 |
| R 3 | 50.0 | 1.8 | 33.3 | 0.6 | 16.7 | 0.3 | 11.1 | 0.1 | 26.7 | 0.6 |
| R 2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.0 | 16.7 | 0.2 | 22.2 | 0.6 | 20.0 | 0.5 |
| R 1 | 66.7 | 2.0 | 22.2 | 0.2 | 16.7 | 0.2 | 33.3 | 1.4 | 33.3 | 0.9 |
| H30 | 16.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.3 | 6.7 | 0.2 |
| H29 | 16.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.1 |
| H28 | 16.7 | 0.2 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.1 |
| H27 | 16.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.3 | 6.7 | 0.2 |
| H26 | 16.7 | 0.2 | 44.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.3 |
| H25 | 33.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.5 | 11.1 | 0.3 | 16.7 | 0.4 |

* 虫数は、1ほ場当たりの平均値。詳細は表17参照。

表9 斑点米カメムシ類調査結果（7月第3～4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R 5 | 83.3 | 12.5 | 44.4 | 1.1 | 33.3 | 0.5 | 22.2 | 1.3 | 43.3 | 3.3 |
| 平年比 | 並 | 並 | 並 | やや少 | やや少 | やや少 | やや少 | やや少 | やや少 | やや少 |
| | 並 | | やや少 | | やや少 | | やや少 | | やや少 | |
| 平年 | 76.7 | 31.0 | 50.0 | 2.8 | 60.0 | 2.3 | 42.2 | 5.1 | 55.0 | 9.0 |
| R 4 | 50.0 | 35.7 | 11.1 | 0.4 | 66.7 | 1.5 | 44.4 | 4.8 | 40.0 | 9.0 |
| R 3 | 83.3 | 33.8 | 55.6 | 1.6 | 16.7 | 1.3 | 66.7 | 1.6 | 56.7 | 8.0 |
| R 2 | 100.0 | 16.5 | 33.3 | 2.0 | 83.3 | 3.8 | 33.3 | 5.1 | 56.7 | 6.2 |
| R 1 | 83.3 | 12.2 | 88.9 | 5.4 | 66.7 | 2.7 | 33.3 | 1.3 | 66.7 | 5.0 |
| H30 | 83.3 | 99.7 | 44.4 | 2.9 | 83.3 | 2.5 | 55.6 | 16.2 | 63.3 | 26.2 |
| H29 | 83.3 | 50.8 | 66.7 | 5.4 | 66.7 | 1.0 | 44.4 | 14.4 | 63.3 | 16.3 |
| H28 | 50.0 | 7.2 | 44.4 | 2.7 | 16.7 | 0.2 | 22.2 | 1.7 | 33.3 | 2.8 |
| H27 | 83.3 | 11.2 | 33.3 | 1.7 | 66.7 | 0.7 | 11.1 | 0.1 | 43.3 | 2.9 |
| H26 | 50.0 | 6.8 | 77.8 | 1.2 | 66.7 | 8.3 | 44.4 | 1.4 | 60.0 | 3.8 |
| H25 | 100.0 | 35.8 | 44.4 | 4.2 | 66.7 | 1.2 | 66.7 | 4.7 | 66.7 | 10.1 |

* 虫数は、1ほ場当たりの平均値。詳細は表18参照。

表10 カスミカメ類（斑点米カメムシ）の予察灯誘殺結果（6月第1半旬～7月3半旬）

| 年度 | アカスジカスミカメ | | | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | |
|-----|-----------|------|-------|----------------|------|------|
| | 京田辺市 | 亀岡市 | 京丹後市 | 京田辺市 | 亀岡市 | 京丹後市 |
| R 5 | 5 | 138 | 48 | 7 | 99 | 10 |
| 平年比 | 並 | 多 | 並 | やや少 | 多 | 少 |
| | やや多 | | | 並 | | |
| 平年 | 6.0 | 61.5 | 104.8 | 23.2 | 30.1 | 53.8 |
| R 4 | 28 | 145 | 122 | 5 | 99 | 12 |
| R 3 | 0 | 71 | 31 | 10 | 25 | 24 |
| R 2 | 4 | 69 | 48 | 7 | 6 | 13 |
| R 1 | 1 | 97 | 184 | 17 | 22 | 34 |
| H30 | 8 | 79 | 102 | 27 | 16 | 32 |
| H29 | 13 | 44 | 110 | 42 | 24 | 58 |
| H28 | 0 | 4 | 47 | 18 | 1 | 80 |
| H27 | 1 | 34 | 24 | 6 | 15 | 46 |
| H26 | 0 | 23 | 117 | 67 | 35 | 60 |
| H25 | 5 | 49 | 263 | 33 | 58 | 179 |

※詳細は表20～21参照。

表11 コブノメイガ調査結果（7月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | 確認ほ場率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害葉率 | 確認ほ場率 | 被害葉率 |
| R 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平年比 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 |
| | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | |
| 平年 | 1.7 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 15.0 | 0.03 | 18.9 | 0.03 | 11.0 | 0.02 |
| R 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| R 2 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 66.7 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.1 |
| R 1 | 16.7 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 83.3 | 0.2 | 88.9 | 0.3 | 53.3 | 0.1 |
| H30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H29 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| H28 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| H27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

* 食害株率は、1ほ場当たりの平均値。詳細は表15参照。

表12 イネツトムシ調査結果（7月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

| 年度 | 山城 | | 南丹 | | 中丹 | | 丹後 | | 京都府 | |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 | 確認ほ場率 | 虫数 |
| R 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 平年比 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | やや少 | 並 | やや少 | 並 |
| | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 |
| 平年 | 3.3 | 0.00 | 4.4 | 0.03 | 5.0 | 0.02 | 12.2 | 0.08 | 6.0 | 0.04 |
| R 4 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| R 3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 6.7 | 0.00 |
| R 2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.1 | 16.7 | 0.2 | 11.1 | 0.1 | 10.0 | 0.10 |
| R 1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.1 | 6.7 | 0.07 |
| H30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| H29 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 6.7 | 0.00 |
| H28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.1 | 3.3 | 0.03 |
| H27 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 6.7 | 0.00 |
| H26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.2 | 6.7 | 0.10 |
| H25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 13.3 | 0.10 |

* 確認ほ場率：ツト・幼虫を認めたほ場率、虫数：1ほ場当たりの平均値。詳細は表15参照。

表13 水稻巡回調査結果①（7月第3～4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

| 地 点 | 葉いもち | | | | 紋枯病 | | | 白葉枯病 | | | 縞葉枯病 | | | その他 | |
|-------|------|------|-----|---------|--------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|--|
| | 発病株率 | 発病度 | 程度 | 周辺田発生状況 | 発病株率 | 発病度 | 程度 | 発病株率 | 発病度 | 程度 | 発病株率 | 発病度 | 程度 | | |
| 京都市1 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京都市2 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 久御山町 | 4.0 | 1 | 少 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 八幡市 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 精華町 | 20.0 | 5 | 少 | 2/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 木津川市 | 32.0 | 8 | 少 | 3/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 山城平均 | R5 | 9.3 | 2.3 | 少 | 5/24 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| | R4 | 6.0 | 1.5 | 少 | 5/24 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| 亀岡市1 | 84.0 | 21 | 中 | 4/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 亀岡市2 | 52.0 | 13 | 少 | 4/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京都市3 | 28.0 | 7 | 少 | 2/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 南丹市1 | 12.0 | 3 | 少 | 2/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 南丹市2 | 28.0 | 7 | 少 | 3/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 南丹市3 | 16.0 | 4 | 少 | 2/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹波町1 | 68.0 | 17 | 少 | 3/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹波町2 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹波町3 | 8.0 | 2 | 少 | 1/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 南丹平均 | R5 | 32.9 | 8.2 | 少 | 22/36 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| | R4 | 14.7 | 3.7 | 少 | 22/36 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| 綾部市1 | 12.0 | 3 | 少 | 3/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 福知山市1 | 48.0 | 12 | 少 | 2/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 福知山市2 | 0.0 | 0 | 無 | 3/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 番外で葉いもち | |
| 福知山市3 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 福知山市4 | 0.0 | 0 | 無 | 2/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 舞鶴市 | 92.0 | 33 | 中 | 4/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 中丹平均 | R5 | 25.3 | 8.0 | 少 | 14/24 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| | R4 | 10.7 | 2.7 | 少 | 9/23 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| 宮津市 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 与謝野町 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 伊根町 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹後市1 | 0.0 | 0 | 無 | 1/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹後市2 | 12.0 | 3 | 少 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹後市3 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹後市4 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹後市5 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 京丹後市6 | 0.0 | 0 | 無 | 0/4 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 無 | | |
| 丹後平均 | R5 | 1.3 | 0.3 | 少 | 1/36 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| | R4 | 10.7 | 2.7 | 少 | 7/36 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| 府平均 | R5 | 17.2 | 4.6 | 少 | 42/120 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |
| | R4 | 10.9 | 2.7 | 少 | 43/119 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 無 | |

表14 水稲巡回調査結果②（7月第3～4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

| 地 点 | ツマグロヨコバイ | | | | | ヒメトビウンカ | | | | | セジロウンカ | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|------|-----|-----|--------|---|
| | 寄生 株率 | 成虫 | 幼虫 | 計 | 程 度 | 寄生 株率 | 成虫 | 幼虫 | 計 | 程 度 | 寄生 株率 | 成虫 | 幼虫 | 計 | 程 度 | |
| 京都市1 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京都市2 | 16.0 | 0 | 4 | 4 | 少 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 少 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 久御山町 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 8.0 | 0 | 2 | 2 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 八幡市 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 68.0 | 1 | 34 | 35 | 少 | |
| 精華町 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 少 | |
| 木津川市 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 山城平均 | R5 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 少 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 少 | 12.0 | 0.3 | 5.7 | 6.0 | 少 |
| | R4 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 少 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 少 | 4.7 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 少 |
| 亀岡市1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 亀岡市2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京都市3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 南丹市1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 南丹市2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 南丹市3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹波町1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹波町2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹波町3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 南丹平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 |
| | R4 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 少 | 7.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 少 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 少 |
| 綾部市1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 16.0 | 0 | 5 | 5 | 少 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 福知山市1 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 少 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 少 | 8.0 | 0 | 2 | 2 | 少 | |
| 福知山市2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 少 | |
| 福知山市3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 福知山市4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 16.0 | 0 | 5 | 5 | 少 | 16.0 | 0 | 8 | 8 | 少 | |
| 舞鶴市 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 中丹平均 | R5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 少 | 6.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 少 | 4.7 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 少 |
| | R4 | 4.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 少 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 少 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 少 |
| 宮津市 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 与謝野町 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 伊根町 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹後市1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 8.0 | 0 | 2 | 2 | 少 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹後市2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹後市3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹後市4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 少 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹後市5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 少 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 京丹後市6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
| 丹後平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 |
| | R4 | 4.9 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 少 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 少 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 少 |
| 府平均 | R5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 少 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 少 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 少 |
| | R4 | 4.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 少 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 少 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 少 |

表15 水稲巡回調査結果③（7月第3～4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

| 地 点 | イネツトムシ*1 | | | | コメイガ* | | イネアオムシ*2 | | コブノメイガ | | | イネカサネ | | スクミリンゴガイ | | その他 | |
|-------|----------|-----|------|------|-------|-----|----------|-----|--------|-----|--------|-------|-----|----------|------|------|--|
| | 食害株率 | ツト数 | 幼虫数 | 程度 | 被害株率 | 程度 | 幼虫数 | 程度 | 被害率 | 程度 | 調査株外被害 | 虫数 | 程度 | 25株卵塊数 | 周辺卵塊 | | |
| 京都市1 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 2 | ○ | | |
| 京都市2 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | ○ | | |
| 久御山町 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 1 | ○ | | |
| 八幡市 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | ○ | | |
| 精華町 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 木津川市 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | ○ | | |
| 山城平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/6 | 0.0 | 無 | 0.5 | 5/6 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/6 | 0.0 | 無 | 0.3 | 4/6 | |
| 亀岡市1 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | ○ | | |
| 亀岡市2 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京都市3 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 南丹市1 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 南丹市2 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 南丹市3 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | ○ | | |
| 京丹波町1 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹波町2 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹波町3 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 南丹平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/9 | 0.0 | 無 | 0.0 | 2/9 | |
| | R4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 少 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/9 | 0.0 | 無 | 0.1 | 2/9 | |
| 綾部市1 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 福知山市1 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 福知山市2 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 福知山市3 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 福知山市4 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 舞鶴市 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 中丹平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/6 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0/6 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/6 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0/6 | |
| 宮津市 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 与謝野町 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 伊根町 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹後市1 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹後市2 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹後市3 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹後市4 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹後市5 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 京丹後市6 | 0.0 | 0 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | 0 | 無 | 0.0 | 無 | | 0 | 無 | 0 | | | |
| 丹後平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/9 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0/9 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.4 | 少 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/9 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0/9 | |
| 府平均 | R5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 無 | 0.0 | 少 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/30 | 0.0 | 無 | 0.1 | 7/30 | |
| | R4 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 少 | 0.1 | 少 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 | 0/30 | 0.0 | 無 | 0.1 | 6/30 | |

*1：虫名 イチモンジセセリ

*2：虫名 フタオビコヤガ

表16 水稲巡回調査結果④（7月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

| 地 点 | ツマグロヨコバイ | | | | ヒメトビウンカ | | | | セジロウンカ | | | | ヒヨウカ | | |
|-------|----------|-----|------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------|-----|---|
| | 成虫 | 幼虫 | 計 | 程度 | 成虫 | 幼虫 | 計 | 程度 | 成虫 | 幼虫 | 計 | 程度 | 虫数 | 程度 | |
| 京都市1 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京都市2 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 久御山町 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 八幡市 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 精華町 | 2 | 0 | 2 | 少 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 木津川市 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 山城平均 | R5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 |
| | R4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 |
| 亀岡市1 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 亀岡市2 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京都市3 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 南丹市1 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 南丹市2 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 南丹市3 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹波町1 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹波町2 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹波町3 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 南丹平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 |
| | R4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 |
| 綾部市1 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 福知山市1 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 1 | 2 | 3 | 少 | 0 | 無 | |
| 福知山市2 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 福知山市3 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 福知山市4 | 0 | 1 | 1 | 少 | 0 | 1 | 1 | 少 | 0 | 6 | 6 | 少 | 0 | 無 | |
| 舞鶴市 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 中丹平均 | R5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 少 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 少 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 少 | 0.0 | 無 |
| | R4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 少 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 |
| 宮津市 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 与謝野町 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 伊根町 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 1 | 4 | 5 | 少 | 0 | 無 | |
| 京丹後市1 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹後市2 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹後市3 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹後市4 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹後市5 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 京丹後市6 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 無 | |
| 丹後平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 少 | 0.0 | 無 |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 |
| 府平均 | R5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 少 | 0.0 | 無 |
| | R4 | 0.3 | 0.03 | 0.4 | 少 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 少 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | 0.0 | 無 |

表17 水稲巡回調査結果⑤（7月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

| 地 点 | イネツトムシ ^{*1} | | イネアオムシ ^{*1} | | 斑点米カメムシ類 | | | その他カメムシ類 | | コハネ イコ [*] | サ サ サ | そ の 他 |
|--------|----------------------|-----|----------------------|-----|---|-----|----|----------|-----|------------------------|-------------|-------------|
| | 幼虫 | 蛹 | 成虫 | 幼虫 | 種類 | 虫数 | 程度 | 種類 | 虫数 | | | |
| 京都市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 0 | 0 | |
| 京都市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 1 | 0 | |
| 久御山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 0 | 0 | |
| 八幡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 15 | 0 | |
| 精華町 | 0 | 0 | 0 | 0 | アカヒゲ [*] ホリド [*] リアスミカメ | 1 | 少 | | 0 | 0 | 0 | |
| 木津川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 2 | 0 | |
| 山城平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 少 | | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 少 | | 0.0 | 12.8 | 0.3 | |
| 亀岡市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホリハラカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 20 | 10 | |
| 亀岡市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 30 | 0 | |
| 京都市 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 無 | | 0 | 0 | 0 | |
| 南丹市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホリハラカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 14 | 0 | |
| 南丹市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホリハラカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 130 | 0 | |
| 南丹市 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 85 | 1 | |
| 京丹波町 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 0 | 1 | |
| 京丹波町 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | トゲシラホシカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 6 | 0 | |
| 京丹波町 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホリハラカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 13 | 5 | |
| 南丹平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 少 | | 0.0 | 33.1 | 1.9 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 少 | | 0.0 | 31.7 | 0.7 | |
| 綾部市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 0 | 0 | |
| 福知山市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 3 | 0 | |
| 福知山市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 3 | 0 | |
| 福知山市 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | トゲシラホシカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 11 | 0 | |
| 福知山市 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 5 | 0 | |
| 舞鶴市 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 21 | 0 | |
| 中丹平均 | R5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 少 | | 0.0 | 7.2 | 0.0 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無 | | 0.0 | 9.7 | 0.2 | |
| 宮津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 2 | 7 | イネツトムシA1 |
| 与謝野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | イネカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 9 | 0 | |
| 伊根町 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 無 | | 0 | 0 | 4 | |
| 京丹後市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 3 | 2 | |
| 京丹後市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ホリハラカメムシ | 1 | 少 | | 0 | 10 | 1 | |
| 京丹後市 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 13 | 2 | |
| 京丹後市 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 2 | 0 | |
| 京丹後市 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 3 | 0 | |
| 京丹後市 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 無 | | 0 | 8 | 0 | イネツトムシA1 |
| 丹後平均 | R5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 少 | | 0.0 | 5.6 | 1.8 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 少 | | 0.0 | 8.3 | 0.4 | |
| 府平均 | R5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 少 | | 0.0 | 13.6 | 1.1 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 少 | | 0.0 | 16.5 | 0.4 | |

*1：虫名 イチモンジセセリ

*2：虫名 フタオビコヤガ

表18 水稲巡回調査結果⑥（7月第3～4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

| 地 点 | 斑点米カメムシ類 | | | | | | | | | | その他 カメムシ類 | コハネ 付けコ | ササリ | その他 |
|--------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|------|------------------|------|--------------|------------|-----|---------------------------|
| | シラホシ カメムシ | トゲ シラホシ カメムシ | ホソハリ カメムシ | クモハリ カメムシ | アカゲ ホソミト カスミカメ | アカシ カスミカメ | その他 斑点米カメムシ類 | 計 | 確 認 ほ 率 | | | | | |
| 京都市 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | イカメシ | 5 | 10 | ○ | 0 | 0 | 5 | |
| 京都市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | |
| 久御山町 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | ○ | 0 | 0 | 0 | |
| 八幡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | 0 | 42 | ○ | 1 | 0 | 0 | |
| 精華町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 0 | 13 | ○ | 0 | 1 | 0 | |
| 木津川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | |
| 山城平均 | R5 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | | 0.8 | 12.5 | 83.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | |
| | R4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | | 0.2 | 35.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | |
| 亀岡市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | |
| 亀岡市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | |
| 京都市 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | ○ | 0 | 80 | 0 | |
| 南丹市 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ○ | 0 | 7 | 0 | |
| 南丹市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | |
| 南丹市 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ○ | 0 | 0 | 0 | |
| 京丹波町 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | |
| 京丹波町 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0 | |
| 京丹波町 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ○ | 1 | 0 | 1 | |
| 南丹平均 | R5 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 1.1 | 44.4 | 0.1 | 10.7 | 0.3 | |
| | R4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | 0.0 | 0.4 | 11.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| 綾部市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ショウリヨウハ [®] ツタ他 |
| 福知山市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | |
| 福知山市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | |
| 福知山市 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ○ | 0 | 5 | 1 | |
| 福知山市 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 舞鶴市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | ○ | 0 | 9 | 0 | |
| 中丹平均 | R5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | |
| | R4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | | 0.0 | 1.5 | 66.7 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | |
| 宮津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | |
| 与謝野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 7 | 0 | ショウリヨウハ [®] ツタL1 |
| 伊根町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | |
| 京丹後市 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 京丹後市 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | |
| 京丹後市 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | | 0 | 10 | ○ | 0 | 4 | 2 | |
| 京丹後市 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | |
| 京丹後市 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | |
| 京丹後市 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | |
| 丹後平均 | R5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | | 0.0 | 1.3 | 22.2 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |
| | R4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | | 0.0 | 4.8 | 44.4 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | |
| 府平均 | R5 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | | 0.17 | 3.3 | 43.3 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | |
| | R4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | | 0.03 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | |

表19 60W予察灯へのトビイロウンカ初飛来日

| 年度 | トビイロウンカ | | |
|-----|------------|------------|------------|
| | 京田辺市 | 亀岡市 | 京丹後市 |
| 本年 | 7月18日現在未飛来 | 7月18日現在未飛来 | 7月18日現在未飛来 |
| R 4 | 10月17日 | 未飛来 | 未飛来 |
| R 3 | 未飛来 | 未飛来 | 8月26日 |
| R 2 | 8月4日 | 8月6日 | 8月5日 |
| R 1 | 8月8日 | 9月13日 | 8月21日 |
| H30 | 未飛来 | 未飛来 | 8月29日 |
| H29 | 未飛来 | 未飛来 | 未飛来 |
| H28 | 未飛来 | 未飛来 | 未飛来 |
| H27 | 未飛来 | 未飛来 | 未飛来 |
| H26 | 9月1日 | 未飛来 | 7月14日 |
| H25 | 8月20日 | 8月21日 | 8月21日 |
| H24 | 未飛来 | 未飛来 | 9月10日 |
| H23 | 9月10日 | 8月16日 | 未飛来 |
| H22 | 9月13日 | 8月16日 | 9月11日 |
| H21 | 8月20日 | 9月17日 | 8月21日 |
| H20 | 未飛来 | 9月30日 | 8月23日 |
| H19 | 10月10日 | 9月22日 | 8月30日 |
| H18 | 7月16日 | 未飛来 | 9月5日 |
| H17 | 9月13日 | 9月13日 | 7月12日 |
| H16 | 未飛来 | 未飛来 | 7月30日 |
| H15 | 8月28日 | 8月28日 | 8月28日 |
| H14 | 未飛来 | 未飛来 | 未飛来 |
| H13 | 未飛来 | 未飛来 | 未飛来 |
| H12 | 未飛来 | 未飛来 | 未飛来 |
| H11 | 9月25日 | 9月17日 | 7月11日 |
| H10 | 7月3日 | 7月10日 | 6月28日 |
| H 9 | 7月12日 | 8月21日 | 9月13日 |
| H 8 | 9月5日 | 8月29日 | 未飛来 |
| H 7 | 8月1日 | 8月18日 | 8月6日 |
| H 6 | 未飛来 | 9月21日 | 9月6日 |
| H 5 | 8月7日 | 8月1日 | 8月9日 |
| H 4 | 7月27日 | 9月1日 | 7月11日 |
| H 3 | 7月4日 | 6月26日 | 7月1日 |

: 警報発表年
 : 注意報発表年 (H10は多発年)
 : 防除所ニュースor技術情報発表年

表20 予察灯調査結果 アカスジカスミカメ

アカスジカスミカメ（60W白熱灯） 京田辺市

| 月・半旬 | R5 | 平年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 |
|--------------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6・1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7・1 | 1 | 0.9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6・1～ 7・3計 | 5 | 6.0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 |

平年並

アカスジカスミカメ（60W白熱灯） 亀岡市

| 月・半旬 | R5 | 平年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 |
|--------------|-----|------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6・1 | 1 | 1.7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 17 | 2.9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4.3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 5 | 10 | 7.7 | 19 | 3 | 21 | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 26 | 21.2 | 59 | 26 | 21 | 49 | 33 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7・1 | 21 | 12.3 | 40 | 26 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | 23 | 6.7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | 32 | 3.6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | | 3.0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6・1～ 7・3計 | 138 | 62.0 | 154 | 71 | 69 | 97 | 79 | 44 | 4 | 34 | 23 | 49 |

平年比やや多い

アカスジカスミカメ（60W白熱灯） 京丹後市

| 月・半旬 | R5 | 平年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 |
|--------------|----|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6・1 | 3 | 4.1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 |
| 2 | 1 | 4.8 | 1 | 1 | 11 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | 6 | 3.3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | 0 | 6.9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 36 |
| 5 | 4 | 9.0 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 43 |
| 6 | 11 | 22.4 | 22 | 3 | 1 | 59 | 25 | 25 | 6 | 1 | 21 | 61 |
| 7・1 | 8 | 23.3 | 30 | 15 | 7 | 51 | 33 | 24 | 5 | 5 | 27 | 36 |
| 2 | 6 | 21.3 | 16 | 8 | 5 | 48 | 13 | 47 | 6 | 0 | 27 | 43 |
| 3 | 9 | 9.7 | 30 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 27 |
| 4 | | 9.6 | 60 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6・1～ 7・3計 | 48 | 104.8 | 182 | 31 | 48 | 184 | 102 | 110 | 47 | 24 | 117 | 263 |

平年並

表21 予察灯調査結果 アカヒゲホソミドリカスミカメ

アカヒゲホソミドリカスミカメ (60W白熱灯) 京田辺市

| 月・半旬 | R5 | 平年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 |
|--------------|----|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6・1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 |
| 3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 4 | 1 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| 5 | 1 | 1.9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7・1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 3.4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 4 | | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6・1～ 7・3計 | 7 | 23.2 | 5 | 10 | 7 | 17 | 27 | 42 | 18 | 6 | 67 | 33 |

平年比やや少ない

アカヒゲホソミドリカスミカメ (60W白熱灯) 亀岡市

| 月・半旬 | R5 | 平年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 |
|--------------|----|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6・1 | 9 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 2.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | 24 | 5.1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 |
| 4 | 13 | 4.0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | 12 | 3.3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | 13 | 5.0 | 16 | 6 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 7・1 | 7 | 4.3 | 25 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 3.5 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | | 2.1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6・1～ 7・3計 | 99 | 29.7 | 99 | 25 | 6 | 22 | 16 | 24 | 1 | 15 | 35 | 58 |

平年比多い

アカヒゲホソミドリカスミカメ (60W白熱灯) 京丹後市

| 月・半旬 | R5 | 平年 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 |
|--------------|----|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6・1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 10.5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 26 | 16 | 5 | 42 |
| 4 | 0 | 9.5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 17 | 6 | 33 |
| 5 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 13 | 6 | 11 | 22 |
| 6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21 | 4 | 1 | 7 | 20 |
| 7・1 | 1 | 4.7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | 2 | 5.6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 16 |
| 3 | 1 | 6.1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 28 |
| 4 | | 4.2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 0 | 6 | 8 |
| 6・1～ 7・3計 | 10 | 53.8 | 13 | 24 | 13 | 34 | 32 | 58 | 80 | 46 | 60 | 179 |

平年比少ない

