

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 平年比やや少なかった。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 白斑病 平年比やや多かった。
- 5 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 平年並の発生であった。
- 7 コナガ 発生を認めなかった（平年並）。
- 8 ハモグリバエ類 調査株では発生を認めなかった（平年比やや少）が、亀岡市2の調査外で発生を認めた。
- 9 その他病害虫 シロイチモジヨトウ幼虫(亀岡市2：1.2頭/10株、寄生株率12.0%)、オオタバコガ幼虫(右京区1：0.4頭/10株、寄生株率4.0%)
モンシロチョウ幼虫(右京区1:0.4頭/10株、寄生株率4.0%)、ウワバ類幼虫(右京区1:0.4頭/10株、寄生株率4.0%)、ヨトウガ幼虫(亀岡市2:0.4頭/10株、寄生株率4.0%)
調査外でカブラハバチ(亀岡市2)

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和2年10月14、15日

調査場所	べと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	
京都市右京区1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京都市右京区2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡市1	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	12.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡市2	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	1.2	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	2年	6.7	0.0	0.0	1.3	0.0	0.3	0.2	4.7	0.0	0.0	0.0
	平年比	少	並	並	やや多	並	やや多	並	並	並	並	やや少
	平年	34.3	0.0	0.0	4.2	0.6	0.2	1.6	4.2	0.1	1.0	3.2
	元年	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.6	6.3	0.0	0.0	3.4
	30年	38.4	0.0	0.0	42.4	0.0	0.2	0.3	4.8	0.1	0.8	4.8
	29年	35.2	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.7	1.6	1.0	8.8	2.4
	28年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	8.0	0.0	0.0	0.0
	27年	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	4.0	0.0	0.0	0.7
	26年	28.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.0
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	6.0	0.0	0.0	17.0
発生 ほ場率 (%)	2年	33.3	0.0	0.0	16.7	0.0	50.0		0.0		16.7	
	平年比	やや少	並	並	やや多	並	並	並	並	並	並	
	平年	41.2	0.0	0.0	6.0	3.7	39.4		6.0		26.8	
	元年	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6		0.0		42.9	
	30年	40.0	0.0	0.0	60.0	0.0	20.0		20.0		40.0	
	29年	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0		40.0		60.0	
	28年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0		0.0		0.0	
	27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3		0.0		16.7	
	26年	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7		0.0		33.3	
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0		0.0		50.0	
24年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0		0.0		0.0		
23年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		0.0		0.0		
22年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		25.0		