

カブ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 発生を認めなかった（平年比少）。
- 2 軟腐病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 黒斑病 平年比多かった。
- 4 白斑病 発生を認めなかった（平年並）。
- 5 白さび病 平年比多かった。
- 6 アブラムシ類 平年比やや少なかった。
- 7 コナガ 発生を認めなかった（平年並）。
- 8 ハモグリバエ類 平年並の発生であった。
- 9 その他病害虫 ハスモンヨトウ幼虫（京丹後市久美浜町：1.2頭/10株、寄生株率8.0%）、ハイマダラノメイガ幼虫（京丹後市久美浜町：4.4頭/10株、寄生株率16.0%）。

カブ調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和3年10月12日

調査場所	ベと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類	
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	
京都市右京区 ①	0.0	0.0	40.0	0.0	96.0	0.0	8.0	4.0	0.0	0.0	0.0	
京都市右京区 ②	0.0	0.0	12.0	0.0	84.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡市 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	
亀岡市 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	R3年	0.0	0.0	8.7	0.0	44.7	0.1	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0
	平年(例年)比	少	並	多	並	多	やや少	並	やや少	並	並	並
	平年(例年)	30.0	0.0	0.0	4.4	0.6	0.3	1.6	4.7	0.1	1.0	3.0
	R2年	6.7	0.0	0.0	1.3	0.0	0.3	0.2	4.7	0.0	0.0	0.0
	R元年	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.6	6.3	0.0	0.0	3.4
	H30年	38.4	0.0	0.0	42.4	0.0	0.2	0.3	4.8	0.1	0.8	4.8
	H29年	35.2	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	3.7	1.6	1.0	8.8	2.4
	H28年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	8.0	0.0	0.0	0.0
	H27年	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	4.0	0.0	0.0	0.7
	H26年	28.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.0
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	6.0	0.0	0.0	17.0	
H24年	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
H23年	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	9.0	0.0	0.0	0.0	
発生 ほ場率 (%)	R3年	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7		33.3		0.0		33.3
	平年(例年)比	少	並	多	並	多		並		並		並
	平年(例年)	39.5	0.0	0.0	7.7	3.7		44.4		6.0		26.0
	R2年	33.3	0.0	0.0	16.7	0.0		50.0		0.0		16.7
	R元年	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0		28.6		0.0		42.9
	H30年	40.0	0.0	0.0	60.0	0.0		20.0		20.0		40.0
	H29年	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0		20.0		40.0		60.0
	H28年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0		75.0		0.0		0.0
	H27年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0		33.3		0.0		16.7
	H26年	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7		16.7		0.0		33.3
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		50.0		0.0		50.0	
H24年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0		50.0		0.0		0.0	
H23年	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0		100.0		0.0		0.0	