カンキツ

・そうか病、かいよう病、黒点病は、発生を認めなかった（平年並）。
・ハダニ類の発生は平年並であった。
・ヤノネカイガラムシは発生を認めなかった（平年並）。
・ミカンハモグリガの発生は平年比やや多かった。
・アブラムシ類の発生は認めなかった。
・その他の病害虫は発生を認めなかった。

発生程度別基準

	そうか病 かいよう病	黒点病	ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ	アブラムシ類
	発病度	発病度	寄生葉率(%)	寄生葉率(%)	寄生果率(%)	寄生葉率(%)	寄生新梢率(%)
無	０	０	０	０	０	０	０
少	１～１１	１～１８	１～３０	１～３	１～５	１～９	１～５
中	１２～４５	１９～４５	３１～６０	４～１３	６～２０	１０～３０	６～１０
多	４６～９０	４６～７２	６１～８０	１４～３０	２１～５０	３１～５０	１１～３０
甚	９１以上	７３以上	８１以上	３１以上	５１以上	５１以上	３１以上

カンキツ巡回調査結果（１００葉、５０果、５０新梢調査）　　調査日:令和元年7月18日

調査結果	そうか病			かいよう病			黒点病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ			ミカンハモグリガ		アブラムシ類	
	発病度		発生ほ場率（%）	発病度		発生ほ場率（%）	発病度	発生ほ場率（%）	寄生葉率（%）	発生ほ場率（%）	寄生葉率（%）	寄生果率（%）	発生ほ場率（%）	被害葉率（%）	発生ほ場率（%）	寄生新梢率（%）	発生ほ場率（%）
	葉	果実		葉	果実		果実										
宮津市　１	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		2.0		0.0	0.0		6.0		0.0	
〃　２	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
〃　３	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		12.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	66.7	0.0	0.0	0.0	2.0	33.3	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	やや多	並	－	－
平　年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	63.3	0.0	0.2	3.3	0.5	26.7	－	－
３０年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	100.0	0.0	2.0	33.3	0.3	33.3	1.3	33.3
２９年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
２８年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	66.7	0.7	66.7
２７年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	－	－
２６年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
２５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	33.3	0.0	0.0	0.0	3.3	100.0	－	－
２４年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
２３年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	－	－
２２年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
２１年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－