

ムギ

- 1 二条大麦では、赤かび病及びうどんこ病は発生を認めなかった(例年並)。
- 2 小麦では、うどんこ病の発生を認めなかった(例年並)。
- 3 小麦で黄斑症状を70%のほ場で認めた。
- 4 その他の病害虫は、発生を認めなかった。

表1 二条大麦調査結果(令和4年4月12日)

	赤かび病		うどんこ病		
	発病穂率(%)	発病度	病斑面積率(%)	発病茎率(%)	
亀岡市 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ②	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ③	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ④	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	
" ⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0
	例年比	並	並	並	並
	平均	0.0	0.0	0.2	9.6
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.8	48.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	-	-	-	-
	H27年	-	-	-	-
確認ほ場率(%)	R4年		0.0		0.0
	例年比		並		並
	平均		0.0		13.3
	R3年		0.0		0.0
	R2年		0.0		66.7
	R元年		0.0		0.0
	H30年		0.0		0.0
	H29年		0.0		0.0
	H28年		-		-
	H27年		-		-

表2 小麦調査結果(令和4年4月11~13日)

	うどんこ病		黄斑症状		
	病斑面積率(%)	発病茎率(%)	斑点面積率(%)	被害茎率(%)	
福知山市 ①	0.0	0.0	0.00	0.0	
" ②	0.0	0.0	0.08	8.0	
" ③	0.0	0.0	0.08	8.0	
" ④	0.0	0.0	0.36	20.0	
" ⑤	0.0	0.0	1.60	64.0	
" ⑥	0.0	0.0	0.48	32.0	
綾部市 ①	0.0	0.0	0.04	4.0	
" ②	0.0	0.0	0.16	16.0	
南丹市 ①	0.0	0.0	0.00	0.0	
" ②	0.0	0.0	0.00	0.0	
平均	R4年	0.0	0.0	0.28	15.2
	例年比	並	並	-	-
	平均	0.0	0.0	0.36	22.8
	R3年	0.0	0.0	0.71	45.6
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R元年	0.0	0.0	-	-
	H30年	0.0	0.0	-	-
	H29年	0.0	0.0	-	-
	H28年	-	-	-	-
	H27年	-	-	-	-
確認ほ場率(%)	R4年		0.0		70.0
	例年比		並		-
	平均		0.0		45.0
	R3年		0.0		90.0
	R2年		0.0		0.0
	R元年		0.0		-
	H30年		0.0		-
	H29年		0.0		-
	H28年		-		-
	H27年		-		-

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
赤かび病 発病穂率(%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上	
うどんこ病 病斑面積率(%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上	