ナ　ス

病害虫発生状況

1　うどんこ病 ・・・・・・・・・・　平年比やや少なかった。
2　褐色円星病 ・・・・・・・・・・　平年並の発生であった。
3　すすかび病 ・・・・・・・・・・　発生を認めなかった（平年並）。
4　灰色かび病 ・・・・・・・・・・　発生を認めなかった（平年並、発病株率は例年並）
5　褐色腐敗病 ・・・・・・・・・・　平年比やや多かった。
6　アブラムシ類 ・・・・・・・・・　発生を認めなかった（平年並）。
7　ハダニ類 ・・・・・・・・・・・　平年比多かった。種類はカンザワハダニ。
8　ハモグリバエ類 ・・・・・・・・　発生を認めなかった（平年比やや少ない）。
9　アザミウマ類 ・・・・・・・・・　葉では平年並、花では例年並の発生であった。
10　コナジラミ類 ・・・・・・・・・　平年並の発生であった。種類はタバココナジラミ。
11　その他病害虫 ・・・・・・・・・　各地でカスミカメ類の被害を認めた。京田辺市②でテントウムシダマシの被害を認めた。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
すすかび病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
灰色かび病	発病株率(%)	0	1～2	3～5	6～20	21以上
	発病果率(%)	0	1～5	6～10	11～20	21以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
アザミウマ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
	寄生花率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
コナジラミ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
	成虫寄生葉率(%)	0	1～30	31～50	51～80	81以上

ナス巡回調査結果（２０株（５葉・５果・３花）調査）

調査日：令和５年７月１３、１４、１９日

調査場所		うどんこ病		褐色円星病		すすかび病		灰色かび病		褐色腐敗病	アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類				コナジラミ類	
		発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	被害葉率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(/花)	寄生花率(%)	成虫数(/葉)	寄生葉率(%)
京都市西京区		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	1.01	7.0	0.0	0.0	0.31	13.0	0.49	23.2	0.01	1.0
久御山町	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	16.19	77.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.12	8.8	0.00	0.0
〃	②	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	1.12	5.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.03	2.7	0.01	1.0
八幡市	①	0.0	0.0	3.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.40	15.0	0.00	0.0
〃	②	3.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.000	0.0	4.21	58.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.06	5.9	0.00	0.0
京田辺市	①	0.0	0.0	2.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.42	3.0	0.0	0.0	0.01	1.0	1.12	33.3	0.00	0.0
〃	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.20	13.3	0.00	0.0
平　均	Ｒ５年	0.4	2.1	0.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.000	0.0	3.28	21.4	0.0	0.0	0.05	2.0	0.35	14.6	0.003	0.3
	平年（例年）比	やや少	並	並	並	並	並	並	（並）	多	並	並	多	多	並	やや少	やや多	並	（並）	（並）	並	並
	平年（例年）	1.3	5.5	1.8	7.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.001	0.1	0.70	4.8	1.4	4.3	0.04	2.3	0.49	22.6	0.005	0.4
	Ｒ４年	0.7	5.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.75	9.1	0.3	1.4	0.02	1.1	0.18	12.0	0.006	0.6
	Ｒ３年	0.4	1.4	9.3	23.6	2.0	5.6	0.0	0.0	0.3	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	1.4	0.01	0.7	0.22	13.1	0.014	1.3
	Ｒ２年	7.4	16.4	2.4	10.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.15	2.0	1.4	12.1	0.01	1.7	0.16	13.2	0.009	0.9
	Ｒ元年	1.3	12.9	1.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.3	1.30	10.3	0.0	0.7	0.03	1.7	0.37	19.6	0.003	0.3
	Ｈ３０年	0.6	7.9	2.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.16	1.4	0.0	0.0	0.01	0.6	0.70	25.2	0.000	0.0
	Ｈ２９年	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	4.19	14.0	0.1	2.1	0.02	1.7	0.76	29.8	0.001	0.1
	Ｈ２８年	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.1	0.6	0.02	1.4	0.52	31.8	0.003	0.3
	Ｈ２７年	0.5	1.5	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.010	0.4	0.04	2.1	0.0	0.0	0.09	3.9	0.41	21.4	0.010	0.5
	Ｈ２６年	0.5	1.3	2.3	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.01	0.3	0.3	2.5	0.11	7.8	1.09	36.9	0.003	0.0
	Ｈ２５年	1.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.000	0.0	0.41	9.0	11.3	22.5	0.06	2.3	－	－	0.003	0.3

		うどんこ病	褐色円星病	すすかび病	灰色かび病	褐色腐敗病	アブラムシ類	ハダニ類	ハモグリバエ類	アザミウマ類		コナジラミ類
発生ほ場率（%）	Ｒ５年	14.3	42.9	0.0	0.0	14.3	0.0	71.4	0.0	28.6	100.0	28.6
	平年（例年）比	並	並	並	並	並	並	多	やや少	少	（並）	並
	平年（例年）	19.6	44.0	4.3	0.0	8.9	14.1	35.3	19.5	53.9	96.8	20.7
	Ｒ４年	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	28.6	57.1	100.0	28.6
	Ｒ３年	14.3	85.7	42.9	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6	42.9	100.0	57.1
	Ｒ２年	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	28.6	42.9	14.3	57.1	100.0	14.3
	Ｒ元年	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	28.6	42.9	14.3	57.1	100.0	14.3
	Ｈ３０年	28.6	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	42.9	85.7	0.0
	Ｈ２９年	14.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	28.6	42.9	57.1	85.7	14.3
	Ｈ２８年	0.0	12.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	12.5	50.0	100.0	12.5
	Ｈ２７年	12.5	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0	62.5	0.0	37.5	100.0	37.5
	Ｈ２６年	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	37.5	100.0	0.0
	Ｈ２５年	57.1	77.8	0.0	0.0	0.0	33.3	77.8	28.6	100.0	－	28.6