

トマト(施設)

病害虫の発生状況

- 1 疫病、灰色かび病、モザイク病、葉かび病、うどんこ病は、発生を認めなかった(平年並)。
- 2 アブラムシ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- 3 花及び果実でのアザミウマ類、ハスモンヨトウは発生を認めなかった(例年並)。
- 4 その他の病害虫は、伏見区で葉に寄生するアザミウマ類を、久御山町①でハダニ類を、それぞれ調査外で発生を認めた。

巡回調査結果(令和2年4月16日)

25株・2複葉・4果調査(単位:%、頭/葉)

		疫病	灰色かび病	モザイク病	葉かび病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類		コナジラミ類		ハモグリバエ類		ハスモンヨトウ	
		発病程度	発病程度	発病株率	発病程度	発病程度	寄生株率	寄生花率	白ぶくれ症果率	寄生虫数	寄生葉率	被害葉率	被害株率	寄生株率	被害株率
伏見区		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町③		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
亀岡市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平均	2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年(例年)比	並	並	並	並	並	並	-	(並)	並	並	並	並	(並)	(並)
	平年(例年)値	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	0.7	0.0	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	27年	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	-	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-
23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-	
22年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-	-	
ほ場率	2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年(例年)比	並	並	並	並	並	並	(並)	並	並	並	(並)	(並)	(並)	
	平年(例年)値	0.0	0.0	0.0	5.0	2.5	7.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	31年	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	28年	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	27年	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-		
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-		
23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-			
22年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-			

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
疫病	発病度	0	1~25	26~50	51~75	76以上
灰色かび病	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
葉かび病、うどんこ病	発病度	0	1~20	21~40	41~60	61以上
アブラムシ類	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
コナジラミ類	寄生成虫数(頭/葉)	0	0.01~9	10~29	30~59	60以上
	寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	被害株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
アザミウマ類	寄生花率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	白ぶくれ症果率(%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上