

平成 17 年一番茶実収報告

京都府立茶業研究所

1. 摘採日

| 仕立て法 | 本年 | 前年 | 前5か年 | 平年 |
|-------|------|------|------|------|
| 自然仕立て | 5月7日 | 5月2日 | 5月5日 | 5月6日 |
| 弧状仕立て | 5月6日 | 5月3日 | 5月5日 | 5月6日 |

注) 平年は、平成6年～平成16年までの11年間の値

2. 生葉収量(kg/10a)

| 仕立て法 | 本年 | | 前年 | | 前5か年平均 | |
|-------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | 収量 | 指数 | 収量 | 指数 | 収量 | 指数 |
| 自然仕立て | 465.3 ± 68.1 | 81 | 558.4 ± 74.1 | 97 | 574.4 ± 89.7 | 100 |
| 弧状仕立て | 407.9 ± 61.5 | 115 | 364.8 ± 60.7 | 103 | 354.1 ± 63.1 | 100 |

3. 百芽重(g)

| 仕立て法 | 本年 | | 前年 | | 前5か年平均 | |
|-------|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|
| | 重量 | 指数 | 重量 | 指数 | 重量 | 指数 |
| 自然仕立て | 54.2 ± 7.5 | 112 | 42.3 ± 5.7 | 87 | 48.4 ± 5.6 | 100 |
| 弧状仕立て | 47.7 ± 9.7 | 85 | 79.5 ± 15.1 | 142 | 55.8 ± 8.0 | 100 |

4. 新芽数(本/m²)

| 仕立て法 | 本年 | | 前年 | | 前5か年平均 | |
|-------|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| | 新芽数 | 指数 | 新芽数 | 指数 | 新芽数 | 指数 |
| 自然仕立て | 359.4 ± 37.8 | 77 | 531.8 ± 74.7 | 113 | 469.0 ± 66.8 | 100 |
| 弧状仕立て | 1951.9 ± 471.5 | 153 | 971.7 ± 170.0 | 76 | 1271.7 ± 260.9 | 100 |

注) 自然仕立ての数値は、20cm幅帯摘みの新芽数

5. 出開き度(%)

| 仕立て法 | 本年 | 前年 | 前5か年平均 |
|-------|------|------|--------|
| 自然仕立て | 41.3 | 46.1 | 46.5 |
| 弧状仕立て | 47.3 | 41.0 | 46.1 |

6.概要

(1)摘採期

本年の一番茶摘採日は、自然仕立て園が5月7日、弧状仕立て園が5月6日となり、前年と比べ3～5日遅く、前5か年平均並みであった。

(2)生葉収量

10a当たりの生葉収量は、自然仕立て園が465kg(前5か年比やや少ない)、弧状仕立て園が408kg(前5か年比やや多い)であった。収量構成は、自然仕立て園で芽重型、弧状仕立て園で芽数型の傾向となった。

(3)病害虫の発生状況

一番茶新芽への病害虫の発生はチャノホソガ、コミカンアブラムシがやや目立った以外は比較的少なく、実害はなかった。

(4)周辺茶園の状況

各地とも茶芽の生育は平年並み～やや遅めの状況であったが、その後はやや持ち直し、摘採開始期は、平年並み程度となった。

収量性については、全般的に前年比並み～やや少ない傾向となっている。

病害虫に関しては、全体的に発生は少なかった。