


沖縄県の養豚場でCSF(豚コレラ)の発生が相次いで確認されています！

発生状況(国内1~55例目)

- ◆沖縄県1例目(国内52例目)
1月8日 1,127頭
- ◆沖縄県2例目(国内53例目)
1月8日 3,187頭
- ◆沖縄県3例目(国内54例目)
1月10日 3,012頭
- ◆沖縄県4例目(国内55例目)
1月15日 1,825頭



- これまでの発生地域から遠く離れた場所での発生です。
- 野生いのしし以外の要因で感染した可能性があります。

野生いのしし対策は勿論のこと、畜舎の消毒や立入制限を確実に行うとともに、給与飼料には十分に注意してください。

- ① 柵などを設置し、**野生いのしし等の野生動物との接触を防ぐとともに、飼養場所周囲への消石灰の散布を念入りに行ってください。**
- ② **必要のない人を衛生管理区域（畜舎や飼料保管場所）に立ち入りさせない**で下さい。
- ③ **飼養場所に立ち入る時は、専用の服や長靴を着用し、念入りに消毒**を行ってください。
- ④ **飼料に生肉を含む又は含む可能性がある場合は、十分に加熱処理**してから与えて下さい。(70℃・30分以上又は80℃・3分以上)