

# 渡り鳥飛来シーズン前に早めの 高病原性鳥インフルエンザ対策を！

昨年度、高病原性鳥インフルエンザは、香川県の家きん農場で1件(9.1万羽)発生し、野鳥では3都府県46件確認されました。

家きん舎内へは、防鳥ネットや鶏舎の破損部等から小型野生鳥獣が侵入しウイルスを持ち込んだ可能性が指摘されています。

国内にウイルスを持ち込む渡り鳥の本格的な飛来シーズンに備え、発生予防対策を徹底して下さい。

## 11月までに対策を完了し、 渡り鳥の飛来シーズンに備えましょう！



<p><b>防鳥対策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 網目2cm角以下の防鳥ネットやビニールシートで野鳥侵入を防止、破損箇所の点検、補修！</li> </ul>		<p><b>飲用水対策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水道水以外の飲み水は消毒を徹底！</li> </ul>	
<p><b>人・車両対策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出入り口でウイルス遮断！消毒徹底！</li> <li>・ 鶏舎入出時の手指の消毒</li> <li>・ 鶏舎専用の作業靴、作業着の着用！</li> </ul>	<p><b>野生動物侵入防止対策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 侵入経路がないか、</li> <li>・ 鶏舎やタンク周辺に餌になりそうな物がないか再確認！</li> </ul>		



金網を嚙り侵入するネズミ



高病原性鳥インフルエンザ発生時の症状



～家きんに異常を認めたら直ちに当所に連絡願います～

- ◆ 同一畜舎内における1日の死亡率が過去3週間の平均値の2倍以上になった場合
- ◆ 同一ケージ内や近い範囲で密集して急死している場合 等。