

アズキ

病害虫等発生状況

- モザイク病・・・・・・・・・・・・・平年比少なかった。
- 炭疽病・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
- さび病・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
- ハダニ類・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
- アブラムシ類・・・・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- ハスモンヨトウ・・・・・・・・・・・・・平年並であった。
- サヤムシガ類・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 食葉性チョウ目幼虫・・・・・・・・・例年比やや多かった。
- その他の病害虫・・・・・・・・・・・・・ゾウムシ類を認めた。調査外でスズメガを認めた。

(参考)ダイズにおける発生程度基準

程度別基準						
病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
べと病、葉焼病	発病度	0	1～25	26～50	50～75	76以上
ハダニ類	25小葉当たり虫数	0	1～80	81～330	331～1000	1001以上
吸害性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1～5	6～25	26～50	51以上
ハスモンヨトウ	食害度	0	1～10	11～25	26～50	51以上
	白変葉か所数(1a)	0	1～2	3～5	6～7	8以上

* 発病度＝ $((4A+3B+2C+D) \div (4 \times N)) \times 100$

A: 病斑面積76%以上、B: 同面積51～75%、C: 同面積26～50%、D: 1～25%

N: 調査株数

* 食害度＝ $((4A+3B+2C+D) \div (4 \times N)) \times 100$

A: 食害面積51%以上、B: 同面積26～50%、C: 同面積11～25%、D: 1～10%

N: 調査株数

令和7年8月12、14日

調査結果		モザイク病	炭疽病	さび病	ハダニ類		アブラムシ類		ハスモンヨトウ			サヤムシガ類				食葉性チョウ目幼虫		備 考 (調査外株で発生を確認)
		発病株率	発病株率	発病株率	寄生株率	虫数	寄生株率	虫数	寄生株率	虫数	白変葉	寄生株率	虫数	被害株率	被害数	寄生株率	虫数	
		%	%	%	%	頭/25小葉	%	頭/25小葉	%	頭/25株	箇所/10a	%	頭/25株	%	箇所/25株	%	頭/25株	
舞鶴市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	ハスモンヨトウ若齢多、ゾウムシ類
〃	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
福知山市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
〃	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	4.0	1	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
綾部市	1	1.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	ゾウムシ類
〃	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	ゾウムシ類
南丹市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
〃	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
亀岡市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5	0.0	0	0.0	0	4.0	1	スズメガ、オオタバコガ
〃	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3	0.0	0	0.0	0	20.0	5	
〃	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	番外スズメガ
〃	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0	4.0	1	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
平均	R7年	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	
	平年比(例年比)	少	並	並	並	並	やや多	やや多	並	並	並	並	並	並	並	(やや多)	(やや多)	
	平年値(例年値)	1.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	0.1	1.5	0.2	0.0	0.4	0.1	(1.4)	(0.4)	
	R6年	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	
	R5年	0.4	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	
	R4年	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R3年	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	1.7	0.4	
	R2年	2.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.2	0.3	0.1	
	R元年	0.5	0.0	0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H30年	2.0	0.7	0.0	2.5	3.9	0.4	0.1	0.4	0.1	7.5	0.0	0.0	0.4	0.1	1.5	0.4	
	H29年	0.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.9	0.1	0.6	0.1	0.9	0.0	0.0	0.9	0.2	3.4	0.9	
	H28年	0.6	0.0	0.4	1.1	0.5	5.5	2.5	0.4	0.1	0.4	0.4	0.1	1.1	0.3	2.5	0.6	
	H27年	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	1.1	0.3	1.5	0.4	—	—	
発生 ほ場率	R7年	8.3	0.0	0.0	0.0		8.3		8.3		33.3	0.0		0.0		16.7		
	平年比(例年比)	少	並	並	並		並		並		並	並		並		(やや少)		
	平年値(例年値)	36.9	2.7	3.2	9.9		9.7		5.4		36.8	2.7		7.7		(29.0)		
	R6年	60.0	0.0	0.0	0.0		10.0		0.0		50.0	0.0		0.0		40.0		
	R5年	10.0	0.0	0.0	10.0		10.0		10.0		30.0	0.0		0.0		40.0		
	R4年	36.4	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		25.0	0.0		0.0		25.0		
	R3年	33.3	0.0	0.0	0.0		8.0		0.0		25.0	0.1		0.0		25.0		
	R2年	41.7	8.3	0.0	16.7		0.0		0.0		25.0	0.0		8.3		8.3		
	R元年	25.0	0.0	8.3	8.3		0.0		9.1		33.3	0.0		0.0		0.0		
	H30年	63.6	9.1	0.0	45.5		9.1		9.1		90.9	0.0		9.1		36.4		
	H29年	35.7	0.0	14.3	0.0		14.2		7.1		42.9	0.0		14.3		50.0		
	H28年	36.4	0.0	9.1	18.2		45.6		9.1		18.2	9.1		18.2		36.4		
	H27年	27.3	9.1	0.0	0.0		0.0		9.1		27.3	18.2		27.3		—		