

アズキ

病害虫等発生状況

- 1 モザイク病・・・・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 2 炭疽病・・・・・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 3 さび病・・・・・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 4 ハダニ類・・・・・・・・・・・・・・・・・平年並であった。
- 5 アブラムシ類・・・・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 6 ハスモンヨトウ・・・・・・・・・・・・・平年並であった。
- 7 サヤムシガ類・・・・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 8 食葉性チョウ目幼虫・・・・・平年比多かった。調査外でスズメガ類、シャクガ類、オオタバコガ、シロイチモジヨトウの発生を認めた。
- 9 その他の病害虫・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった。

(参考)ダイズにおける発生程度基準

程度別基準						
病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
べと病、葉焼病	発病度	0	1～25	26～50	50～75	76以上
ハダニ類	25小葉当たり虫数	0	1～80	81～330	331～1000	1001以上
吸害性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1～5	6～25	26～50	51以上
ハスモンヨトウ	食害度	0	1～10	11～25	26～50	51以上
	白変葉か所数(1a)	0	1～2	3～5	6～7	8以上

* 発病度＝ $((4A+3B+2C+D) \div (4 \times N)) \times 100$
A: 病斑面積76%以上、B: 同面積51～75%、C: 同面積26～50%、D: 1～25%
N: 調査株数
* 食害度＝ $((4A+3B+2C+D) \div (4 \times N)) \times 100$
A: 食害面積51%以上、B: 同面積26～50%、C: 同面積11～25%、D: 1～10%
N: 調査株数

令和8年8月12、13日

調査結果		サビ病	炭疽病	さび病	ハダニ類		アブラムシ類		ハスモンヨトウ			サヤムシガ類				食葉性チョウ目幼虫		備 考 (調査外株で発生を確認)
		発病株率	発病株率	発病株率	寄生株率	虫数	寄生株率	虫数	寄生株率	虫数	白変葉 箇所/10a	寄生株率	虫数	被害株率	被害数	寄生株率	虫数	
		%	%	%	%	頭/25小葉	%	頭/25小葉	%	頭/25株	箇所/10a	%	頭/25株	%	箇所/25株	%	頭/25株	
舞 鶴 市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	スズメガ類
"	2	19.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	スズメガ類、シャクガ類、サヤムシガ類
福知山市	1	32.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	4.0	1	4.0	1	0.0	0	
"	2	12.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
綾 部 市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
"	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
南 丹 市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	オオタバコガ
"	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	シロイチモジヨトウ
亀 岡 市	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	12.0	3	
"	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	8.0	2	アブラムシ類、ハダニ類
"	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	12.0	3	アブラムシ類
"	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0	8.0	9	12.0	4	0	0.0	0	0.0	0	12.0	3	
平均	R 8 年	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	1.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.3	0.1	3.7	0.9	
	平年比	多	並	並	並	並	並	やや多	多	多	少	やや多	やや多	並	並	多	多	
	平年値	1.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.9	0.3	0.2	0.1	1.5	0.1	0.0	0.3	0.1	1.5	0.4	
	R 7 年	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	
	R 6 年	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	
	R 5 年	0.4	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	
	R 4 年	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	R 3 年	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	1.7	0.4	
	R 2 年	2.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.2	0.3	0.1	
	R 元 年	0.5	0.0	0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H 3 0 年	2.0	0.7	0.0	2.5	3.9	0.4	0.1	0.4	0.1	7.5	0.0	0.0	0.4	0.1	1.5	0.4	
	H 2 9 年	0.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.9	0.1	0.6	0.1	0.9	0.0	0.0	0.9	0.2	3.4	0.9	
	H 2 8 年	0.6	0.0	0.4	1.1	0.5	5.5	2.5	0.4	0.1	0.4	0.4	0.1	1.1	0.3	2.5	0.6	
発 生 ほ 場 率	R 8 年	25.0	0.0	0.0	8.3		25.0		8.3		0.0	8.3		8.3		66.7		
	平年比	やや少	並	並	並		やや多		並		少	多		並		多		
	平年値	35.0	1.7	3.2	9.9		10.5		5.3		37.4	0.9		5.0		27.8		
	R 7 年	8.3	0.0	0.0	0.0		8.3		8.3		33.3	0.0		0.0		16.7		
	R 6 年	60.0	0.0	0.0	0.0		10.0		0.0		50.0	0.0		0.0		40.0		
	R 5 年	10.0	0.0	0.0	10.0		10.0		10.0		30.0	0.0		0.0		40.0		
	R 4 年	36.4	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		25.0	0.0		0.0		25.0		
	R 3 年	33.3	0.0	0.0	0.0		8.0		0.0		25.0	0.1		0.0		25.0		
	R 2 年	41.7	8.3	0.0	16.7		0.0		0.0		25.0	0.0		8.3		8.3		
	R 元 年	25.0	0.0	8.3	8.3		0.0		9.1		33.3	0.0		0.0		0.0		
	H 3 0 年	63.6	9.1	0.0	45.5		9.1		9.1		90.9	0.0		9.1		36.4		
	H 2 9 年	35.7	0.0	14.3	0.0		14.2		7.1		42.9	0.0		14.3		50.0		
	H 2 8 年	36.4	0.0	9.1	18.2		45.6		9.1		18.2	9.1		18.2		36.4		