

アズキ

- 1 チョウ目害虫による莢被害は平年比少なかった。
- 2 亀岡①、②においてハスモンヨトウ幼虫、河原林2においてオオタバコガ幼虫の発生を認めた。

アズキ巡回調査結果(25株200莢調査)

調査日:令和3年10月13、14日

調査結果		チョウ目害虫 食害莢率	備 考
		%	
舞 鶴③		3.5	
" ④		1.5	
福知山①		4.5	
" ②		5.5	
綾 部①		12.0	
" ②		11.0	
園 部①		4.0	
" ②		7.0	
亀 岡①		8.5	ハスモンヨトウ確認
" ②		5.0	ハスモンヨトウ、オオタバコガ確認
" ③		9.5	
" ④		10.5	
平均	R3年	6.9	
	平年比	少	
	平年値	14.1	
	R2年	15.8	
	R元年	16.5	
	H30年	7.5	
	H29年	7.6	
	H28年	16.7	
	H27年	8.6	
	H26年	15.3	
	H25年	14.6	
発 生 ほ場率	R3年	100.0	
	平年比	並	
	平年値	100.0	
	R2年	100.0	
	R元年	100.0	
	H30年	100.0	
	H29年	100.0	
	H28年	100.0	
	H27年	100.0	
	H26年	100.0	
	H25年	100.0	
H24年	100.0		
H23年	100.0		