

ブドウ

病害虫発生状況

- 1 ベと病・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 2 うどんこ病・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 灰色かび病・・・・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 4 ハダニ類・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 その他の病害虫・・発生を認めなかった。

ブドウ巡回調査結果（１００葉、５０花穂調査）

令和７年５月１３日、１５日（％）

調査結果	ベと病			うどんこ病			灰色かび病		ハダニ類	
	発病葉率	発病花穂率	ほ場率	発病葉率	発病花穂率	ほ場率	発病花穂率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京都市山科区 ①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町 ①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
〃 ③	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
〃 ④	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比（例年比）	並	（並）	並	並	（並）	並	（並）	（並）	並	並
平年（例年）	0.02	(0.0)	1.8	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	(0.0)	0.02	1.7
R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 3 年	0.2	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	16.7
H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 7 年	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0

発生程度別基準

(%)

	ベと病		うどんこ病	灰色かび病	ハダニ類
	発病葉率	発病花穂率	発病花穂率	発病花穂率	寄生葉率
無	0	0	0	0	0
少	1～10	1～10	1～5	1～10	1～10
中	11～30	11～30	6～15	11～30	11～20
多	31～50	31～50	16～30	31～50	21～40
甚	51以上	51以上	31以上	51以上	41以上