

ブドウ

- 1 べと病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 2 うどんこ病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 灰色かび病・・・・・・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 4 さび病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 褐斑病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 ハダニ類・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 7 チャノキイロアザミウマ・発生を認めなかった(例年並)。
- 8 その他の病害虫・・・・・・発生を認めなかった。

ブドウ巡回調査結果（１００葉、５０果穂調査）調査日：令和7年6月17日（％）

調査結果	べと病			うどんこ病			灰色かび病		さび病		褐斑病		ハダニ類		チャノキイロアザミウマ	
	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	被害果穂率	ほ場率
京都市山科区 ①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
" ②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町 ①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
" ②	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
" ③	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
" ④	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比(例年比)	並	(並)	並	並	(並)	並	(並)	(並)	並	並	並	並	並	並	(並)	(並)
平年(例年)	0.5	(0.0)	13.3	0.02	(0.0)	1.7	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.0	(0.1)	(1.9)
R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 5 年	1.2	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0
R 3 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 元年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 9 年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	33.3	0.7	16.7
H 2 8 年	0.8	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 7 年	2.8	-	33.3	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

発生程度別基準	(％)							
	べと病		うどんこ病	灰色かび病	さび病	褐斑病	ハダニ類	チャノキイロアザミウマ
	発病葉率	発病花穂率	発病花穂率	発病花穂率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	被害果穂率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1～10	1～10	1～5	1～10	1～10	1～10	1～10	1～10
中	11～30	11～30	6～15	11～30	11～30	11～30	11～20	11～30
多	31～50	31～50	16～30	31～50	31～70	31～70	21～40	31～50
甚	51以上	51以上	31以上	51以上	71以上	71以上	41以上	51以上