

ブドウ

- 1 べと病・・・・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 2 うどんこ病・・・・・・・・・・・・・平年比多かった。
- 3 さび病・・・・・・・・・・・・・平年並であった。
- 4 褐斑病・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ハダニ類・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 その他の病害虫・・・・・・・・・・・・・発生を認めなかった。

ブドウ巡回調査結果（１００葉調査）調査日:令和８年８月１４日(%)

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類	
	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京都市山科区 ①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町①	19.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0		2.0		1.0		0.0		0.0	
〃 ③	6.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ④	5.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R 8 年	5.0	50.0	0.3	16.7	0.2	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	やや多	並	多	多	並	並	並	並	並	並
	やや多		多		並		並		並	
平 年	3.0	53.3	0.03	1.7	1.0	18.3	1.8	18.3	0.9	3.3
R 7 年	1.3	50.0	0.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	16.7
R 6 年	2.2	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 5 年	3.5	50.0	0.0	0.0	2.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年	0.3	16.7	0.0	0.0	0.2	16.7	1.3	33.3	0.0	0.0
R 3 年	5.7	83.3	0.0	0.0	0.2	16.7	3.0	33.3	0.0	0.0
R 2 年	1.2	33.3	0.0	0.0	1.7	33.3	9.2	83.3	5.8	16.7
R 元年	4.8	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	33.3	0.0	0.0
H 3 0 年	4.0	83.3	0.0	0.0	5.8	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 9 年	4.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 8 年	3.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発生程度別基準	(%)				
	べと病 発病葉率	さび病 発病葉率	褐斑病 発病葉率	ハダニ類 寄生葉率	アザミウマ類 被害果穂率
無	0	0	0	0	0
少	1～10	1～10	1～10	1～10	1～10
中	11～30	11～30	11～30	11～20	11～20
多	31～50	31～70	31～70	21～40	21～40
甚	51以上	71以上	71以上	41以上	41以上