

チャ

病虫害発生状況

1 病気の平年比較

	炭疽病	輪斑病	灰色かび病	新梢枯死症	もち病	網もち病
山城	やや少	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	やや多	並 (発生を認めず)
丹波	並	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	多	並 (発生を認めず)
丹後	並	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)

2 害虫（No. 1）の平年比較

	カンザワハダニ	チャノホソガ			チャノコカクモンハマキ		
		調査	フェロモントラップ		調査	フェロモントラップ	
			誘殺数	誘殺時期		誘殺数	誘殺時期
山城	少	並	並	やや遅	並 (発生を認めず)	やや少	並
丹波	やや多	(並)	やや少	やや早	少 (発生を認めず)	多	やや遅
丹後	やや少	(並) (発生を認めず)	並	並	並	やや多	やや遅

3 害虫（No. 2）の平年比較

	チャノキイロ アザミウマ	チャノミドリ ヒメヨコバイ	コミカン アブラムシ	ツマグロ アオカスミカメ	クワシロ カイガラムシ	チャトゲ コナジラミ
山城	やや少	やや多	並	やや多	少	(少)
丹波	(やや多)	(並)	(並) (発生を認めず)	(やや多)	並	(少) (発生を認めず)
丹後	-	-	-	やや少	やや少	(少) (発生を認めず)

4 その他

病虫害名	調査項目	程度				
		無	少	中	多	甚
炭疽病	病葉数/m ²		0 ≤ 50	≤ 200	≤ 500	500 <
輪斑病	病葉数/m ²		0 ≤ 50	≤ 200	≤ 500	500 <
もち病	病葉数/m ²		0 ≤ 50	≤ 300	≤ 1000	1000 <
網もち病	病葉数/m ²		0 ≤ 50	≤ 300	≤ 1000	1000 <
カンザワハダニ	寄生葉率(%)		0 ≤ 10	≤ 30	≤ 70	70 <
チャノホソガ	巻葉数/m ²		0 ≤ 30	≤ 100	≤ 250	250 <
チャノコカクモンハマキ	幼虫数/m ²		0 ≤ 5	≤ 15	≤ 35	35 <
チャノミドリヒメヨコバイ	被害芽率(%)		0 ≤ 5	≤ 15	≤ 30	30 <
ツマグロアオカスミカメ	被害芽数/m ²		0 ≤ 25	≤ 80	≤ 160	160 <
クワシロカイガラムシ	寄生株率(%)		0 ≤ 20	≤ 25	≤ 70	70 <

チャ病害虫発生状況平年比較（害虫N○1）

カンザワハダニ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
山城	少	寄生葉率 (%)	少	3.3	10.2	2.9	5.7	18.0	7.5	15.7	10.1	12.5	9.7	10.9	8.5
		成虫数	やや少	6.5	26.6	3.7	8.1	49.1	8.6	65.4	28.2	25.2	24.5	27.6	25.4
		幼虫数	やや少	14.1	33.5	2.1	30.3	84.0	30.4	14.3	33.0	45.5	43.6	24.8	27.2
		合計	少	20.6	60.1	5.8	38.4	133.0	39.0	79.6	61.2	70.7	68.1	52.4	52.6
		発生ほ場率 (%)	少	31.8	65.2	54.5	47.6	95.2	59.1	50.0	66.7	75.0	72.7	63.2	68.2
丹波	やや多	寄生葉率 (%)	やや多	11.7	5.5	0.3	2.3	10.7	13.7	1.0	1.0	0.0	10.0	5.7	10.3
		成虫数	並	18.8	15.5	0.3	0.3	27.3	64.0	1.0	1.3	0.0	16.3	9.3	34.7
		幼虫数	並	18.0	19.6	0.0	5.2	35.0	66.0	0.0	0.0	0.0	24.7	22.3	42.3
		合計	並	36.8	35.0	0.3	5.5	62.3	130.0	1.0	1.3	0.0	41.0	31.6	77.0
		発生ほ場率 (%)	多	83.3	43.3	16.7	50.0	66.7	66.7	33.3	16.7	0.0	66.7	66.7	50.0
丹後	やや少	寄生葉率 (%)	並	2.5	6.8	1.5	0.5	2.5	5.5	0.5	7.0	12.5	26.0	8.5	3.0
		成虫数	やや少	2.5	20.6	4.5	0.5	6.0	38.0	0.5	19.5	25.5	86.5	19.5	5.0
		幼虫数	やや少	0.0	11.9	0.0	2.0	21.0	1.0	0.0	22.5	45.5	12.5	12.0	2.0
		合計	やや少	2.5	32.4	4.5	2.5	27.0	39.0	0.5	42.0	71.0	99.0	31.5	7.0
		発生ほ場率 (%)	並	75.0	60.0	25.0	25.0	100.0	75.0	25.0	50.0	75.0	75.0	50.0	100.0

チャノホソガ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	
山城	並	寄生芽率 (%)	並	1.3	3.0	4.0	2.5	0.4	0.6	5.0	0.0	3.1	4.0	0.3	10.6	
		卵数	並	0.7	2.0	0.0	0.7	0.2	0.0	8.5	0.0	2.0	1.4	0.0	7.1	
		潜行数	やや多	1.3	1.4	4.6	0.5	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	0.0	5.4
		葉縁数	並	0.2	0.9	0.9	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.3	0.0
		合計	並	2.2	4.3	5.5	7.5	0.4	0.8	8.5	0.0	3.4	3.9	0.3	12.6	
		巻葉数	やや多	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		発生ほ場率 (%)	並	18.8	21.0	41.2	30.0	8.3	4.5	10.5	0.0	63.6	10.0	10.5	31.8	
丹波	(並)	寄生芽率 (%)	(並)	16.0	31.9	2.7	26.7	2.0	68.0	—	47.5	—	34.0	0.0	74.0	
		卵数	(並)	18.7	48.6	0.0	14.0	4.0	192.0	—	102.5	—	10.0	0.0	66.0	
		潜行数	(並)	57.3	34.7	0.0	12.7	0.0	78.0	—	73.0	—	48.0	0.0	66.0	
		葉縁数	(並)	5.3	8.2	2.7	9.3	0.0	42.0	—	10.5	—	1.0	0.0	0.0	
		合計	(並)	81.3	91.5	2.7	36.0	4.0	312.0	—	186.0	—	59.0	0.0	132.0	
		巻葉数	並	0.7	0.4	0.5	1.8	0.0	0.2	0.2	0.2	1.2	0.3	0.0	0.0	
		発生ほ場率 (%)	多	100.0	35.8	75.0	33.3	100.0	16.7	16.7	50.0	16.7	33.3	0.0	16.7	
丹後	(並)	寄生芽率 (%)	—	—	21.7	13.3	—	4.0	44.0	—	24.0	19.0	26.0	—	—	
		卵数	—	—	24.1	4.7	—	0.0	75.3	—	43.5	5.0	16.0	—	—	
		潜行数	—	—	27.0	8.0	—	2.0	78.0	—	30.0	24.0	20.0	—	—	
		葉縁数	—	—	5.2	0.7	—	2.0	13.3	—	15.0	0.0	0.0	—	—	
		合計	—	—	56.3	13.3	—	4.0	166.7	—	88.5	29.0	36.0	—	—	
		巻葉数	(並)	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	
		発生ほ場率 (%)	(並)	0.0	42.5	75.0	0.0	100.0	75.0	0.0	100.0	50.0	25.0	0.0	0.0	

チャノコカクモンハマキ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	
山城	並	綴葉数	やや少	0.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	1.8	1.7	0.4	
		幼虫数	並	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0
		蛹数	並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
		合計	並	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
		発生ほ場率 (%)	やや少	0.0	10.4	5.9	10.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	11.8	25.0	26.3	9.1
丹波	少	綴葉数	少	0.0	9.2	3.3	3.0	1.5	61.7	3.0	7.8	2.2	2.8	5.0	1.5	
		幼虫数	少	0.0	1.6	3.3	2.8	0.5	6.3	1.0	0.3	0.7	0.2	0.3	0.3	
		蛹数	並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		合計	少	0.0	1.6	3.3	2.8	0.5	6.6	1.0	0.3	0.7	0.2	0.3	0.3	
		発生ほ場率 (%)	少	0.0	47.5	75.0	33.3	33.3	66.7	50.0	83.3	16.7	33.3	50.0	33.3	
丹後	並	綴葉数	並	0.3	0.7	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	
		幼虫数	並	0.0	0.2	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
		蛹数	並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		合計	並	0.0	0.2	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
		発生ほ場率 (%)	並	25.0	15.8	50.0	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0

チャ病害虫発生状況平年比較（害虫N○2）

チャノキイロアザミウマ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
山城	やや少	寄生・被害芽率 (%)	並	5.6	13.1	7.7	11.5	4.3	4.3	3.0	1.1	14.2	45.7	23.0	16.6
		虫数	やや少	1.1	5.0	5.5	9.1	1.3	1.0	0.0	0.6	5.5	8.9	2.8	15.1
		発生ほ場率 (%)	やや少	55.6	75.2	76.9	100.0	66.7	18.2	100.0	15.4	91.7	100.0	100.0	83.3
丹波	(やや多)	寄生・被害芽率 (%)	(多)	24.7	9.7	8.0	2.7	8.0	6.0	—	11.0	—	12.0	8.0	22.0
		虫数	(多)	61.3	5.7	2.0	4.0	2.0	2.0	—	13.0	—	6.0	8.4	8.0
		発生ほ場率 (%)	(やや少)	66.7	85.4	100.0	66.7	100.0	16.7	—	100.0	—	100.0	100.0	100.0
丹後	—	寄生・被害芽率 (%)	—	—	29.7	9.3	—	98.0	18.0	—	12.0	21.0	20.0	—	—
		虫数	—	—	11.9	0.7	—	0.0	15.0	—	26.0	20.0	10.0	—	—
		発生ほ場率 (%)	—	—	91.7	100.0	—	100.0	50.0	—	100.0	100.0	100.0	—	—

チャノミドリヒメコバイ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
山城	やや多	寄生・被害芽率 (%)	並	1.8	2.4	0.5	1.8	1.7	8.0	5.0	0.6	3.0	2.0	0.0	1.4
		虫数	並	6.2	5.7	16.9	10.7	3.0	14.3	5.0	0.8	3.0	2.0	0.0	1.7
		発生ほ場率 (%)	多	90.9	37.0	61.5	72.7	66.7	13.6	50.0	15.4	33.3	14.3	0.0	42.9
丹波	(並)	寄生・被害芽率 (%)	(並)	6.7	7.2	12.7	26.7	4.0	0.0	—	1.0	—	6.0	5.6	2.0
		虫数	(並)	9.3	27.3	65.3	12.0	66.0	0.0	—	62.0	—	5.0	6.4	2.0
		発生ほ場率 (%)	(やや少)	66.7	87.5	100.0	100.0	100.0	0.0	—	100.0	—	100.0	100.0	100.0
丹後	—	寄生・被害芽率 (%)	—	—	1.1	1.3	—	0.0	1.0	—	4.0	0.0	0.0	—	—
		虫数	—	—	15.9	3.3	—	88.0	2.0	—	2.0	0.0	0.0	—	—
		発生ほ場率 (%)	—	—	48.6	66.7	—	100.0	25.0	—	100.0	0.0	0.0	—	—

コミカンアブラムシ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
山城	並	寄生芽率 (%)	並	0.2	0.5	0.5	0.0	0.0	2.3	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	1.4
		虫数	並	1.1	1.7	1.5	0.0	0.0	8.0	0.0	2.0	2.7	0.0	0.0	2.9
		発生ほ場率 (%)	並	11.1	12.6	15.4	0.0	16.7	9.1	0.0	23.1	33.3	0.0	0.0	28.6
丹波	(並)	寄生芽率 (%)	(並)	0.0	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	—	1.0	—	1.0	1.2	0.0
		虫数	(並)	0.0	2.2	1.3	0.0	0.0	0.0	—	14.0	—	1.0	1.2	0.0
		発生ほ場率 (%)	(並)	0.0	23.3	66.7	0.0	0.0	0.0	—	50.0	—	50.0	20.0	0.0
丹後	—	寄生芽率 (%)	—	—	3.6	12.7	—	0.0	3.0	—	2.0	2.0	2.0	—	—
		虫数	—	—	26.1	26.7	—	0.0	105.0	—	10.0	13.0	2.0	—	—
		発生ほ場率 (%)	—	—	62.5	100.0	—	0.0	25.0	—	100.0	50.0	100.0	—	—

ツマグロアオカスカメ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
山城	やや多	被害芽率 (%)	やや少	0.2	1.1	2.0	1.3	3.3	0.9	0.0	0.0	1.3	0.3	1.8	0.3
		被害葉数	並	1.1	1.4	1.9	3.8	5.1	0.9	0.0	0.0	0.4	0.9	1.2	0.0
		発生ほ場率 (%)	多	66.7	30.1	58.8	57.9	83.3	16.7	0.0	0.0	17.6	25.0	36.8	4.5
丹波	(やや多)	被害芽率 (%)	(やや多)	4.7	2.9	2.0	5.3	2.0	4.0	—	1.0	—	6.0	3.2	0.0
		被害葉数	やや多	3.3	1.8	0.0	5.2	3.5	0.0	0.2	2.0	1.0	1.3	2.0	3.2
		発生ほ場率 (%)	やや多	100.0	48.3	50.0	100.0	100.0	16.7	16.7	50.0	33.3	50.0	33.3	33.3
丹後	やや少	被害芽率 (%)	—	—	10.3	8.7	—	0.0	9.0	—	2.0	16.0	26.0	—	—
		被害葉数	やや少	9.0	13.8	3.8	3.0	4.7	1.8	17.8	14.5	14.0	41.8	23.5	13.5
		発生ほ場率 (%)	—	—	85.0	100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	75.0	75.0	100.0	100.0	100.0

クワシロカイガラムシ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
山城	少	寄生株率 (%)	少	7.6	18.5	16.6	11.9	12.1	13.0	20.9	14.8	22.5	19.0	38.2	16.1
		発生ほ場率 (%)	少	38.1	62.8	63.6	66.7	42.9	59.0	63.6	76.2	68.2	50.0	73.7	63.6
丹波	並	寄生株率 (%)	並	33.3	32.8	67.5	54.2	5.0	5.8	2.3	44.5	50.0	14.2	78.3	6.7
		発生ほ場率 (%)	やや多	100.0	73.3	100.0	83.3	66.7	50.0	33.3	100.0	83.3	66.7	100.0	50.0
丹後	やや少	寄生株率 (%)	やや少	7.5	30.0	22.5	13.8	2.5	8.8	18.8	67.5	66.3	42.5	57.5	0.0
		発生ほ場率 (%)	やや少	50.0	70.0	100.0	75.0	25.0	75.0	75.0	100.0	100.0	50.0	100.0	0.0

チャトゲコナジラミ

6月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R04	平年	R03	R02	R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
山城	(少)	寄生葉率 (%)	(少)	7.9	20.7	18.4	31.0	13.6	10.6	17.2	33.4	31.5	28.4		34.5
		発生量指数	(少)	4.5	12.4	10.5	19.3	7.8	5.6	9.7	21.4	21.4	11.6	30.5	14.4
		発生ほ場率 (%)	(少)	31.8	79.8	86.4	85.7	71.4	72.7	72.7	90.0	80.0	68.4	94.7	77.3
丹波	(少)	寄生葉率 (%)	(少)	0.0	6.2	3.3	13.7	6.0	5.0	2.7	6.7	24.0	62.5	13.3	14.2
		発生量指数	(少)	0.0	3.2	1.7	7.7	3.5	1.8	1.3	3.3	14.7	40.6	5.0	4.7
		発生ほ場率 (%)	(少)	0.0	69.5	66.7	83.3	50.0	66.7	66.7	83.3	100.0	83.3	50.0	50.0
丹後	(少)	寄生葉率 (%)	(少)	0.0	21.7	17.5	58.7	6.5	2.0	1.0	44.5	73.0	95.0	95.0	52.5
		発生量指数	(少)	0.0	13.9	11.3	33.0	3.8	0.3	0.8	34.3	53.8	77.1	67.1	25.8
		発生ほ場率 (%)	(少)	0.0	66.7	75.0	100.0	75.0	50.0	25.0	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※ H26年以前は参考値

※ () 内の評価は例年比

令和4年 チャの病害発生状況 (㎡当たり)

山城地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (病葉数・枝数)	もち病 (病葉数・枝数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日	6/13、6/16							
宇治市1		3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治市2		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治市3		-	-	-	-	-	-	摘採直後のため調査せず
宇治市4		-	-	-	-	-	-	摘採直後のため調査せず
宇治市5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治市6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
城陽市1		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
城陽市2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治田原町1		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治田原町2		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治田原町3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治田原町4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京田辺市1		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京田辺市2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
木津川市1		0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	
木津川市2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町1		4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町3		-	-	-	-	-	-	摘採直後のため調査せず
和束町4		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町5		-	-	-	-	-	-	寒冷紗直掛けのため調査せず
和束町6		-	-	-	-	-	-	摘採直後のため調査せず
平均値		0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	
前年値		1.4	1.1	0.0	0.0	4.7	0.0	
平年値		4.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	
発生ほ場率	本年値 (%)	47.1	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	
	前年値 (%)	35.3	17.6	0.0	0.0	23.5	0.0	
	平年値 (%)	54.8	4.4	0.0	0.0	3.3	0.0	

丹波地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (病葉数・枝数)	もち病 (病葉数・枝数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日	6/13、6/15							
福知山市1		-	-	-	-	-	-	摘採直後のため調査せず
福知山市2		5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
綾部市1		-	-	-	-	-	-	摘採直後のため調査せず
綾部市2		5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
舞鶴市1		-	-	-	-	-	-	摘採直後のため調査せず
舞鶴市2		8.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
平均値		6.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	
前年値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値		7.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生ほ場率	本年値 (%)	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	
	前年値 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値 (%)	65.0	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	

丹後地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝数)	新梢枯死症 (病葉数・枝数)	もち病 (病葉数・枝数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日	6/14							
京丹後市1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市4		2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均値		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値		4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値		1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生ほ場率	本年値 (%)	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前年値 (%)	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値 (%)	36.7	5.0	2.5	0.0	0.0	0.0	

令和4年 チャの虫害発生状況（No1）

山城地域	カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
	寄生葉率 (%)	成虫数 100葉当たり	幼虫数 100葉当たり	合計 100葉当たり	寄生芽率 (%)	卵数 100芽当たり	潜行数 100芽当たり	葉縁数 100芽当たり	合計 100芽当たり	巻葉数 ㎡当たり	綴葉数 ㎡当たり	幼虫数 ㎡当たり	蛹数 ㎡当たり	合計 ㎡当たり	
調査日	6/13、6/16														
宇治市1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治市2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治市3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宇治市4	4.0	6.0	2.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宇治市5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宇治市6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
城陽市1	38.0	84.0	216.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
城陽市2	4.0	0.0	46.0	46.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治田原町1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治田原町2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ヒサカキワタキコナジミ確認
宇治田原町3	10.0	34.0	42.0	76.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇治田原町4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京田辺市1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京田辺市2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
木津川市1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	6.0	0.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
木津川市2	2.0	2.0	0.0	2.0	8.0	0.0	6.0	2.0	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ヨコバイ幼虫確認
和束町4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和束町5	10.0	12.0	4.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ヨコバイ幼虫、被害確認
和束町6	4.0	6.0	0.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査外でチャトゲコナジミ
平均値	3.3	6.5	14.1	20.6	1.3	0.7	1.3	0.2	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値	2.9	3.7	2.1	5.8	4.0	0.0	4.6	0.9	5.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	
平年値	10.2	26.6	33.5	60.1	3.0	2.0	1.4	0.9	4.3	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	
発生ほ場率	本年値 (%)	31.8			18.8					0.0					
	前年値 (%)	54.5			41.2					5.9					
	平年値 (%)	65.2			21.0					10.4					

丹波地域	カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
	寄生葉率 (%)	成虫数 100葉当たり	幼虫数 100葉当たり	合計 100葉当たり	寄生芽率 (%)	卵数 100芽当たり	潜行数 100芽当たり	葉縁数 100芽当たり	合計 100芽当たり	巻葉数 ㎡当たり	綴葉数 ㎡当たり	幼虫数 ㎡当たり	蛹数 ㎡当たり	合計 ㎡当たり	
調査日	6/13、6/15														
福知山市1	24.0	34.0	26.0	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福知山市2	32.0	60.0	82.0	142.0	4.0	0.0	4.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
綾部市1	6.0	6.0	0.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
綾部市2	6.0	10.0	0.0	10.0	42.0	56.0	168.0	12.0	236.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
舞鶴市1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	髪の毛病あり
舞鶴市2	2.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均値	11.7	18.8	18.0	36.8	16.0	18.7	57.3	5.3	81.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値	0.3	0.3	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	2.7	2.7	0.5	3.3	3.3	0.0	3.3	
平年値	5.5	15.5	19.6	35.0	31.9	48.6	34.7	8.2	91.5	0.4	9.2	1.6	0.0	1.6	
発生ほ場率	本年値 (%)	83.3			100.0					0.0					
	前年値 (%)	16.7			75.0					75.0					
	平年値 (%)	43.3			35.8					47.5					

丹後地域	カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
	寄生葉率 (%)	成虫数 100葉当たり	幼虫数 100葉当たり	合計 100葉当たり	寄生芽率 (%)	卵数 100芽当たり	潜行数 100芽当たり	葉縁数 100芽当たり	合計 100芽当たり	巻葉数 ㎡当たり	綴葉数 ㎡当たり	幼虫数 ㎡当たり	蛹数 ㎡当たり	合計 ㎡当たり	
調査日	6/14														
京丹後市1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市2	6.0	6.0	0.0	6.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市3	2.0	2.0	0.0	2.0	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市4	2.0	2.0	0.0	2.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均値	2.5	2.5	0.0	2.5	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
前年値	1.5	4.5	0.0	4.5	13.3	4.7	8.0	0.7	13.3	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	
平年値	6.8	20.6	11.9	32.4	21.7	24.1	27.0	5.2	56.3	0.4	0.7	0.2	0.0	0.2	
発生ほ場率	本年値 (%)	75.0			0.0					25.0					
	前年値 (%)	25.0			75.0					50.0					
	平年値 (%)	60.0			42.5					15.8					

令和4年 チャの虫害発生状況（No2）

山城地域	チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロカイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
	被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 ㎡当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数			発生量指数
											0	1	2	
調査日	6/13、6/16													
宇治市1	4.0	4.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
宇治市2	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
宇治市3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
宇治市4	-	-	-	-	-	-	-	-	65.0	70.0	15.0	31.0	4.0	39.0
宇治市5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
宇治市6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
城陽市1	4.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
城陽市2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
宇治田原町1	0.0	0.0	4.0	4.0	2.0	10.0	0.0	9.0	5.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
宇治田原町2	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.0	24.0	38.0	12.0	0.0	12.0
宇治田原町3	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	48.0	26.0	17.0	7.0	31.0
宇治田原町4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	8.0	46.0	4.0	0.0	4.0
京田辺市1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	8.0	46.0	4.0	0.0	4.0
京田辺市2	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
木津川市1	2.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	16.0	42.0	8.0	0.0	8.0
木津川市2	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	35.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
和東町1	34.0	2.0	8.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
和東町2	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	35.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
和東町3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
和東町4	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
和東町5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
和東町6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
平均値	5.6	1.1	1.8	6.2	0.2	1.1	0.2	1.1	7.6	7.9				4.5
前年値	7.7	5.5	0.5	16.9	0.5	1.5	2.0	1.9	16.6	18.4				10.5
平年値	13.1	5.0	2.4	5.7	0.5	1.7	1.1	1.4	18.5	20.7				12.4
発生ほ場率	本年値 (%)	55.6	90.9	11.1	66.7	38.1	31.8							
	前年値 (%)	76.9	61.5	15.4	58.8	63.6	86.4							
	平年値 (%)	75.2	37.0	12.6	30.1	62.8	79.8							

丹波地域	チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロカイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
	被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 ㎡当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数			発生量指数
											0.0	1.0	2.0	
調査日	6/13、6/15													
福知山市1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
福知山市2	70.0	178.0	0.0	2.0	0.0	0.0	8.0	6.0	60.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
綾部市1	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
綾部市2	4.0	6.0	20.0	26.0	0.0	0.0	2.0	1.0	5.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
舞鶴市1	-	-	-	-	-	-	-	-	45.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
舞鶴市2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	60.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
平均値	24.7	61.3	6.7	9.3	0.0	0.0	4.7	3.3	33.3	0.0				0.0
前年値	8.0	2.0	12.7	65.3	1.3	1.3	2.0	0.0	67.5	3.3				1.7
平年値	9.7	5.7	7.2	27.3	0.6	2.2	2.9	1.8	32.8	6.2				3.2
発生ほ場率	本年値 (%)	66.7	66.7	0.0	100.0	100.0	0.0							
	前年値 (%)	100.0	100.0	66.7	50.0	100.0	66.7							
	平年値 (%)	85.4	87.5	23.3	48.3	73.3	69.5							

丹後地域	チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロカイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
	被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	虫数 100芽当たり	寄生芽率 (%)	虫数 100芽当たり	被害芽率 (%)	被害葉数 ㎡当たり	寄生株率 (%)	寄生葉率 (%)	発生程度別葉数			発生量指数
											0	1	2	
調査日	6/14													
京丹後市1	-	-	-	-	-	-	-	24.0	10.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市2	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市3	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市4	-	-	-	-	-	-	-	2.0	20.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
平均値	-	-	-	-	-	-	-	9.0	7.5	0.0				0.0
前年値	9.3	0.7	1.3	3.3	12.7	26.7	8.7	3.8	22.5	17.5				11.3
平年値	29.7	11.9	1.1	15.9	3.6	26.1	10.3	13.8	30.0	21.7				13.9
発生ほ場率	本年値 (%)	-	-	-	-	-	-	-	50.0	0.0				
	前年値 (%)	100.0	66.7	100.0	100.0	100.0	75.0							
	例年値 (%)	91.7	48.6	62.5	85.0	70.0	66.7							

※ チャトゲコナジラミの発生程度 0：寄生がみられない 1：1~9匹/葉 2：10匹以上/葉
発生量指数 = (N1 + 2 × N2) / 100 × 100

チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所:宇治市(茶業研究所)

誘殺数:平年比やや少

誘殺盛期:平年並(未確定)

月・半旬	R04	平年	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
4・1	0.0	9.0	69.0	0.0	0.0	1.0	0.0	17.0	0.0	0.0	3.0	0.0
2	7.0	16.1	93.5	6.0	0.0	3.0	44.3	1.0	0.0	0.0	10.0	0.0
3	47.0	44.9	300.5	10.5	1.0	14.6	4.0	97.8	2.0	0.0	18.0	1.0
4	57.7	85.1	328.0	26.5	19.7	68.4	32.0	245.0	3.0	3.0	124.0	1.0
5	161.6	179.5	604.0	20.7	98.3	287.5	92.0	512.0	19.7	1.0	158.0	2.0
6	158.8	214.9	418.4	83.3	67.0	433.8	177.0	301.0	150.3	38.0	460.0	20.0
5・1	112.3	342.8	357.3	228.5	173.0	660.9	366.0	412.5	327.0	118.0	720.0	65.0
2	58.1	437.6	492.4	75.8	215.3	742.2	642.7	384.5	279.0	306.0	1143.0	95.0
3	80.7	448.9	472.0	47.8	370.8	740.6	519.9	112.5	185.0	532.0	1410.0	98.0
4	49.0	241.5	57.3	34.0	199.5	241.0	237.4	39.7	105.0	44.0	1370.0	87.0
5	24.3	101.7	11.7	6.0	37.5	68.0	90.0	8.8	37.0	51.0	521.0	186.0
6	5.7	30.8	1.5	5.0	22.0	18.8	9.0	0.0	7.7	32.0	112.0	100.0
6・1	0.0	4.5	8.5	0.0	2.0	2.1	0.0	3.3	0.3	0.0	14.0	15.0
2	0.0	5.7	43.3	3.0	0.0	0.2	1.0	3.7	3.0	0.0	1.0	2.0
3		34.9	127.7	53.2	0.0	52.0	20.3	40.0	22.0	8.0	24.0	2.0
4		59.5	126.0	91.1	28.7	73.0	42.8	33.0	50.3	5.0	127.0	18.0
5		56.8	59.0	71.5	19.5	71.4	100.2	47.2	41.7	21.0	81.0	55.0
6		64.6	36.3	95.2	27.2	169.3	104.8	10.8	63.0	41.0	58.0	40.0
7・1		110.3	38.7	47.0	50.3	197.1	92.0	12.0	92.7	48.0	498.0	27.0
2		65.5	31.8	28.0	31.0	68.1	27.4	7.0	19.3	71.0	300.0	71.0
3		29.5	9.0	4.5	38.4	15.2	5.9	4.0	10.0	46.0	124.0	38.0
4		10.5	15.2	4.8	17.9	2.0	0.8	5.0	3.8	11.0	30.0	14.0
5		11.4	40.0	15.6	14.7	1.5	0.0	10.0	7.3	5.0	17.0	3.0
6		37.3	93.8	4.2	15.0	6.9	21.3	13.3	66.0	0.0	144.0	8.0
8・1		52.0	65.9	56.0	16.0	3.2	31.4	5.7	65.0	16.0	232.0	29.0
2		36.8	25.7	68.8	12.7	10.4	33.3	2.0	45.0	26.0	130.0	14.0
3		25.7	7.2	33.5	9.3	1.3	24.0	0.0	12.7	50.0	103.0	16.0
4		8.9	3.8	0.8	7.0	8.7	5.2	0.0	1.3	23.0	27.0	12.0
5		4.4	4.7	1.0	2.5	3.0	2.8	1.0	1.5	14.0	5.0	8.0
6		5.3	16.0	4.0	6.2	3.0	1.0	3.0	11.5	2.0	1.0	5.0
9・1		11.0	15.8	28.3	3.3	4.0	1.0	9.0	37.3	4.0	5.0	2.0
2		14.9	18.8	39.2	7.0	9.0	9.8	14.2	33.7	2.0	13.0	2.0
3		30.1	14.9	111.5	12.5	9.5	54.3	14.8	26.0	6.0	28.0	23.0
4		61.7	75.7	219.2	19.5	10.8	73.3	42.6	110.3	7.0	37.0	22.0
5		64.4	51.5	241.8	11.0	4.9	64.5	28.0	150.7	9.0	47.0	36.0
6		56.9	40.6	92.3	19.0	21.6	37.2	6.4	226.0	15.0	96.0	15.0
10・1		55.1	23.7	119.7	24.3	13.2	10.2	3.0	137.0	89.0	118.0	13.0
2		47.9	14.0	31.8	7.7	31.0	61.8	6.7	72.0	43.0	111.0	100.0
3		32.6	12.0	28.2	56.0	23.2	46.3	7.3	63.0	25.0	48.0	17.0
4		13.0	9.3	3.0	22.7	7.5	17.3	10.0	20.0	9.0	11.0	20.0
5		11.7	2.2	18.0	26.3	5.3	5.1	5.3	3.0	21.0	13.0	18.0
6		12.8	2.5	11.0	56.0	4.3	1.3	0.8	11.3	4.0	6.0	31.0
5月3半旬~6月2半旬計	159.7	833.1	594.3	95.8	631.8	1070.7	857.3	168.0	338.0	659.0	3428.0	488.0
4~10月計	762.2	3188.2	4239.2	2070.3	1767.8	4112.5	3069.3	2524.2	2523.4	1746.0	8498.0	1331.0

チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:綾部市(京都府立農業大学校)

誘殺数:平年比多

誘殺盛期:平年比やや遅い(未確定)

月・半旬	R04	平年	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
4・1	0.1	2.4	8.8	-	0.6	-	-	-	0.0	-	-	0.0
2	0.7	3.0	6.6	11.1	0.4	2.9	-	-	0.3	-	0.0	0.0
3	9.3	16.4	26.2	24.9	0.0	14.4	6.0	78.4	0.7	0.6	12.9	0.0
4	34.3	37.1	52.0	45.0	27.9	86.3	15.0	88.3	30.0	2.9	23.6	0.0
5	68.6	77.3	135.0	123.6	69.4	203.6	22.1	38.5	73.3	47.0	40.3	19.7
6	115.7	97.0	112.7	172.1	100.2	241.4	12.7	38.5	84.0	80.5	78.6	49.3
5・1	171.9	121.3	106.0	204.4	112.5	389.6	34.7	64.1	11.7	86.1	116.3	87.1
2	192.6	152.7	104.3	138.0	105.5	238.0	147.9	81.3	7.3	385.0	125.1	194.3
3	125.7	137.6	62.9	21.3	74.8	157.3	213.0	55.0	0.7	423.5	124.3	242.7
4	27.4	74.8	32.4	14.8	35.7	37.9	143.6	26.7	1.0	301.0	4.3	150.7
5	145.7	20.0	10.6	5.0	5.7	11.6	15.0	6.6	7.5	78.8	4.3	54.7
6	360.4	8.2	5.1	0.0	3.4	4.0	6.0	1.7	9.0	26.5	5.1	21.0
6・1	2.1	4.3	0.7	0.0	0.9	1.9	0.3	15.0	10.5	6.0	4.3	3.6
2	2.7	18.2	40.1	84.6	0.0	9.3	1.4	15.0	15.0	14.1	1.4	0.7
3		75.5	61.6	211.4	17.1	52.7	1.4	14.7	267.9	59.3	62.2	6.4
4		61.1	42.1	91.4	50.0	63.6	24.3	13.6	109.3	19.9	102.7	94.1
5		85.1	43.9	125.3	71.9	63.6	84.7	3.9	123.1	8.6	102.7	223.6
6		138.6	38.3	137.0	123.3	63.6	108.7	0.9	601.4	6.4	88.8	217.9
7・1		100.0	29.3	93.6	115.5	52.9	43.6	0.0	312.3	141.4	79.6	131.5
2		60.4	45.7	43.3	81.9	36.6	15.6	2.1	154.6	71.1	79.6	73.9
3		26.1	46.6	-	34.3	0.7	5.4	4.7	26.4	20.4	22.1	73.9
4		11.9	43.9	-	5.7	7.0	0.7	7.4	6.4	5.0	8.9	22.2
5		19.9	30.7	80.7	22.8	13.4	7.1	11.4	15.4	1.6	5.7	9.9
6		45.7	30.4	141.4	47.5	24.9	37.1	60.4	44.9	23.6	34.3	12.3
8・1		44.4	50.9	118.4	45.0	20.7	42.9	53.5	69.3	31.9	3.1	7.9
2		34.4	57.0	91.3	21.3	43.6	42.9	39.0	32.9	5.0	8.2	2.7
3		25.0	10.7	45.6	18.8	33.6	31.4	8.6	16.6	67.3	15.7	1.7
4		19.1	10.7	19.7	12.9	10.0	16.4	8.6	5.7	82.9	22.1	2.1
5		17.2	14.4	12.9	4.4	7.9	6.9	10.2	5.7	82.9	10.6	15.7
6		47.8	28.1	29.1	5.1	8.3	10.3	15.2	16.1	324.9	3.3	37.1
9・1		58.1	40.7	85.7	27.4	31.9	11.7	12.7	48.9	251.9	19.3	50.3
2		92.8	172.7	101.4	49.8	70.0	54.8	56.6	83.3	185.0	86.4	67.9
3		118.9	146.9	111.9	77.5	57.3	121.1	92.6	130.7	91.9	240.7	118.1
4		140.0	58.6	160.0	119.3	36.8	342.9	102.9	138.7	141.0	177.3	122.5
5		148.3	235.0	135.2	119.8	82.5	300.6	86.4	129.1	257.2	24.3	113.0
6		117.5	136.9	101.9	10.4	59.7	252.9	60.7	111.7	377.7	14.4	48.6
10・1		128.5	68.9	107.9	10.4	21.8	197.1	45.3	110.7	582.9	18.1	121.7
2		94.5	58.6	76.4	22.5	12.0	114.3	52.1	109.6	351.4	23.6	124.6
3		74.7	43.7	54.6	30.6	5.0	110.0	37.9	94.3	209.9	60.0	101.4
4		33.1	25.7	21.6	12.5	3.6	88.0	24.0	34.3	84.3	29.1	7.9
5		13.4	4.3	21.8	7.1	2.7	11.4	8.6	41.1	7.9	13.7	15.6
6		15.9	24.9	54.6	5.3	1.7	4.5	0.0	29.6	5.4	-	17.1
5月3半旬~6月2半旬計	664.0	263.0	151.8	125.7	120.5	222.0	379.3	120.0	43.7	849.9	143.7	473.4
4~10月計	1257.2	2617.8	2304.6	3118.9	1707.1	2286.3	2706.4	1343.1	3121.0	4950.7	1897.0	2665.4

チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値




調査場所:京丹後市大宮町(口大野団地)

誘殺数:例年比やや多

誘殺盛期:例年比やや遅い(未確定)

月・半旬	R04	例年	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25参考値	H24参考値
4・1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0
2	0.0	0.4	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	-	0.0	0.6
3	0.0	0.6	2.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	1.3
4	0.0	1.9	3.6	8.3	0.9	0.0	0.0	1.4	0.6	0.0	1.4	-
5	5.0	2.5	6.4	8.0	1.1	0.0	0.0	1.4	1.9	1.1	1.4	-
6	2.6	2.7	9.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	2.9	6.4	-
5・1	2.7	4.1	2.5	17.9	4.6	0.4	1.3	1.5	2.9	1.4	9.4	7.8
2	8.0	3.5	5.1	10.6	6.0	0.7	2.4	0.5	1.6	1.4	13.1	11.4
3	5.2	2.7	4.6	4.6	6.4	0.7	3.1	0.0	0.7	1.1	20.0	14.3
4	2.6	1.0	2.1	2.9	0.0	0.1	2.1	0.1	0.7	0.0	10.3	9.7
5	0.0	0.6	0.7	2.1	0.0	0.3	1.1	0.6	0.1	0.0	6.4	6.3
6	0.0	0.4	0.0	1.4	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.4	4.9	2.6
6・1	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.9	0.3
2	0.0	0.2	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
3		2.8	2.9	17.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	1.1	1.7	0.1
4		4.9	5.7	22.3	3.0	1.4	0.6	0.6	2.0	3.4	4.3	0.7
5		6.8	12.1	24.7	4.9	0.0	1.0	2.1	3.0	6.4	14.3	6.4
6		6.7	13.6	20.7	4.3	0.0	1.4	4.3	3.6	5.7	12.6	12.4
7・1		4.0	2.1	13.9	1.4	0.0	2.9	4.3	2.7	4.9	14.4	19.3
2		2.4	2.1	7.3	0.4	0.0	2.4	1.7	1.4	3.9	26.4	14.3
3		0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.6	1.8	32.5	12.1
4		0.6	1.6	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.7	18.9	9.1
5		1.6	9.0	2.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	10.7	2.9
6		2.8	7.7	6.0	6.0	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	26.3	27.7
8・1		2.1	1.9	7.9	3.3	0.0	0.3	0.0	0.7	2.9	24.3	34.9
2		1.8	0.7	6.4	1.7	0.0	3.0	0.7	0.1	2.0	23.1	35.7
3		1.2	1.9	5.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.0	21.4	18.6
4		1.0	1.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	17.1	14.0
5		0.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	17.1	10.0
6		0.7	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	18.3	7.7
9・1		1.1	0.7	3.6	0.8	0.0	0.7	1.1	0.0	1.9	11.4	10.0
2		3.0	1.1	4.4	13.4	0.0	0.3	0.9	0.0	3.6	23.6	13.4
3		5.5	5.0	12.1	18.7	0.0	0.0	0.3	0.0	7.9	54.4	25.7
4		6.3	8.0	14.3	22.1	0.0	0.0	1.4	0.0	4.9	82.6	42.9
5		4.9	11.3	14.0	5.0	0.0	2.3	2.6	0.1	3.6	112.9	45.7
6		4.3	11.0	7.1	4.0	0.0	3.1	2.4	0.7	6.4	84.9	48.7
10・1		4.1	6.4	7.1	2.9	0.0	3.6	2.0	0.7	10.4	55.9	44.9
2		4.8	10.4	6.3	2.1	0.0	6.4	2.8	0.8	9.4	22.9	21.4
3		3.4	8.5	5.0	2.1	0.0	3.0	1.5	0.7	6.4	10.7	18.6
4		0.7	3.3	0.0	0.9	0.0	0.6	0.3	0.0	0.7	33.9	15.0
5		0.4	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	1.1	40.0	10.7
6		0.6	0.0	0.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	21.4
5月3半旬～6月2半旬計	7.8	5.0	8.5	12.4	6.4	1.8	6.3	1.0	1.5	2.1	45.1	33.2
4～10月計	33.9	100.2	175.8	277.8	120.0	4.9	46.0	37.9	32.1	106.9	897.9	598.6

注:平成26年からフェロモントラップの設置場所を変更(丹後農研→口大野団地、色ぬり部分は参考値)



チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所:宇治市(茶業研究所)

誘殺数: 平年並

誘殺盛期: 平年比やや遅(未確定)

月・半旬	R04	平年	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
4・1	30.3	143.1	165.8	254.3	6.7	59.3	2.0	84.0	335.8	46.0	456.0	21.0
2	261.5	113.1	59.8	110.0	73.0	33.0	160.0	50.3	132.0	57.0	339.0	117.0
3	226.5	124.3	73.8	3.5	43.0	26.4	134.7	50.8	38.0	8.0	214.0	651.0
4	42.7	188.8	41.8	115.5	101.0	21.6	207.1	32.0	82.0	88.0	339.0	860.0
5	57.8	149.9	11.2	22.0	59.0	11.0	75.3	54.0	84.7	93.0	65.0	1024.0
6	35.5	58.5	11.1	22.0	13.0	8.7	62.0	17.0	27.3	95.0	50.0	279.0
5・1	14.8	45.1	10.5	72.5	11.3	8.5	34.0	11.3	2.0	35.0	35.0	231.0
2	6.3	24.7	9.9	17.3	1.5	5.0	28.0	5.8	2.0	27.0	34.0	116.0
3	3.0	11.4	10.4	2.3	3.3	2.8	8.6	2.0	0.0	22.0	36.0	27.0
4	2.2	8.8	57.5	0.0	0.0	4.0	1.4	11.4	2.0	0.0	7.0	5.0
5	11.8	58.9	207.5	73.0	4.7	52.0	3.8	125.6	111.0	0.0	0.0	11.0
6	139.0	263.6	308.3	327.7	89.3	208.5	183.3	205.5	234.0	112.0	521.0	446.0
6・1	245.0	783.6	350.3	743.3	255.0	162.3	366.8	224.8	152.0	706.0	1680.0	3195.0
2	443.0	898.3	345.5	400.0	245.0	124.4	326.5	242.7	97.0	408.0	1232.0	5562.0
3		868.4	154.3	272.6	181.8	77.7	224.9	173.0	21.0	218.0	886.0	6475.0
4		371.1	95.3	138.7	192.7	59.8	134.8	79.0	25.7	127.0	239.0	2619.0
5		123.7	92.5	66.3	27.0	26.9	111.2	41.7	3.3	92.0	72.0	704.0
6		85.5	207.7	48.4	26.0	45.7	36.8	93.3	57.0	44.0	48.0	248.0
7・1		188.4	635.3	132.0	30.0	123.7	57.3	365.0	418.0	34.0	31.0	58.0
2		300.7	592.6	116.0	181.0	140.6	85.1	373.3	424.0	60.0	118.0	916.0
3		529.8	456.0	374.5	135.0	68.4	148.6	540.7	1090.0	133.0	89.0	2263.0
4		729.5	314.5	511.0	146.7	38.0	107.7	491.7	999.5	251.0	298.0	4137.0
5		312.3	260.7	321.5	52.3	17.5	263.3	311.3	360.8	100.0	246.0	1190.0
6		190.1	321.4	369.0	53.0	19.5	71.5	157.7	138.7	41.0	30.0	699.0
8・1		158.7	289.4	424.0	45.0	28.0	148.5	171.3	213.0	25.0	28.0	215.0
2		143.2	177.3	220.5	67.3	10.0	105.0	206.0	239.0	99.0	34.0	274.0
3		169.7	85.5	209.8	75.7	6.7	71.5	353.0	116.3	85.0	41.0	652.0
4		130.9	38.8	175.3	79.0	6.7	79.0	153.0	50.7	35.0	53.0	638.0
5		151.7	8.7	37.0	38.5	2.8	105.7	143.0	37.5	27.0	28.0	1089.0
6		110.3	60.0	62.5	39.5	3.8	128.8	58.3	28.5	33.0	40.0	649.0
9・1		58.6	120.0	45.3	22.0	0.0	80.8	79.7	29.0	89.0	16.0	104.0
2		90.2	290.0	36.2	23.0	4.0	57.3	50.4	90.0	183.0	40.0	128.0
3		131.2	59.5	22.5	168.5	13.3	75.6	64.6	203.0	133.0	36.0	536.0
4		164.7	372.3	15.8	250.5	15.4	142.3	49.4	51.0	119.0	96.0	535.0
5		164.7	132.5	32.2	96.0	6.9	70.1	46.4	48.0	120.0	136.0	959.0
6		162.9	99.0	49.0	141.0	4.6	13.6	25.2	32.0	140.0	206.0	919.0
10・1		83.5	98.7	103.0	102.7	7.8	17.2	9.5	11.0	92.0	195.0	198.0
2		61.4	60.5	106.6	87.3	3.0	55.0	19.1	7.5	110.0	98.0	67.0
3		42.8	27.5	123.4	50.0	5.2	54.1	29.0	2.5	83.0	30.0	23.0
4		19.0	17.0	14.0	30.0	0.8	28.1	28.4	1.0	53.0	4.0	14.0
5		21.0	6.0	62.3	32.0	2.3	12.3	24.0	6.7	48.0	6.0	10.0
6		11.8	19.5	20.7	7.0	1.6	12.8	13.0	2.7	21.0	18.0	2.0
5月3半旬~6月2半旬計	844.0	2024.6	1279.5	1546.3	597.3	554.0	890.4	812.0	596.0	1248.0	3476.0	9246.0
4~10月計	1519.4	8447.9	6755.9	6273.5	3286.3	1468.2	4092.4	5267.2	6007.2	4292.0	8170.0	38866.0

チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:綾部市(京都府立農業大学校)

誘殺数: 平年比やや少

誘殺盛期: 平年比やや早

月・半旬	R04	平年	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24
4・1	85.3	21.7	16.3	-	16.6	-	-	-	53.9	-	-	0.0
2	112.1	211.8	11.3	526.6	31.1	296.8	-	-	395.2	-	172.9	48.7
3	145.9	431.1	9.5	371.6	54.3	358.9	660.7	1321.4	907.1	282.4	101.4	243.6
4	185.7	490.0	8.2	387.9	100.7	227.3	962.9	1113.2	627.9	774.3	57.3	640.1
5	232.9	248.1	3.6	80.7	57.4	25.0	460.0	0.4	453.9	802.9	22.9	573.9
6	8.6	116.1	6.4	38.7	22.9	5.0	238.4	0.4	336.5	184.2	2.9	325.7
5・1	17.6	48.7	5.1	10.6	0.0	8.3	73.0	3.2	331.1	27.8	1.7	26.4
2	23.4	40.3	2.1	6.0	0.0	3.7	2.1	5.0	365.5	1.4	1.1	15.7
3	22.9	44.2	10.7	0.0	0.0	1.4	1.0	3.6	417.1	0.6	0.7	6.9
4	26.3	13.0	5.6	0.6	0.0	7.1	0.7	2.3	110.0	0.0	3.3	0.0
5	-	62.2	5.0	1.4	0.0	31.4	0.6	233.0	347.1	0.0	3.3	0.0
6	-	275.2	19.7	0.0	0.0	471.3	429.7	1391.1	416.6	0.0	4.0	19.3
6・1	204.3	323.5	226.4	8.6	30.6	1113.0	529.5	434.3	486.6	164.6	3.3	238.4
2	54.6	484.8	261.6	204.7	76.4	1151.4	500.0	434.3	695.7	263.4	196.4	1063.6
3		517.2	290.9	495.7	562.1	539.6	500.0	471.9	961.4	220.0	153.4	976.7
4		563.8	314.3	827.9	272.9	386.7	859.3	622.1	1060.0	176.6	124.7	993.6
5		483.0	110.3	590.9	80.0	386.7	1115.1	240.4	1007.4	123.4	124.7	1051.4
6		281.0	66.1	348.1	9.2	386.7	1065.3	111.3	534.3	60.0	93.3	135.7
7・1		214.7	76.4	9.3	36.7	687.0	183.6	60.7	341.1	362.1	72.3	318.1
2		383.3	307.9	569.3	85.6	709.7	278.4	633.6	545.7	191.1	72.3	439.6
3		361.6	370.9	-	148.6	139.3	242.4	783.1	925.0	63.6	142.1	439.6
4		387.6	402.7	-	150.7	495.3	152.9	729.3	1077.9	9.3	56.9	413.6
5		276.2	362.1	700.7	109.8	359.4	75.7	115.0	684.0	35.0	19.1	301.1
6		171.5	143.1	559.1	49.5	26.6	45.1	114.3	375.4	137.1	114.9	149.9
8・1		100.4	269.6	286.1	0.0	22.1	18.9	77.1	95.7	182.6	13.1	38.6
2		89.7	327.6	192.5	0.0	6.7	19.3	54.4	77.1	164.3	8.7	46.0
3		44.7	29.3	123.8	0.0	6.6	38.6	48.6	124.9	36.6	2.1	36.4
4		76.2	72.1	262.5	3.0	12.1	50.6	154.9	156.8	4.6	26.4	19.3
5		78.8	66.6	302.1	15.0	15.7	56.7	129.9	156.8	4.6	16.6	24.3
6		77.4	51.4	54.0	27.3	10.9	59.1	63.2	276.4	18.9	15.3	197.1
9・1		68.2	46.4	34.3	15.0	8.5	132.5	52.7	193.6	6.6	22.8	170.0
2		50.7	44.7	42.2	12.7	12.7	70.5	33.6	173.3	2.8	40.7	73.6
3		63.1	63.4	47.5	35.0	13.4	67.6	44.5	229.3	0.6	61.9	68.1
4		123.2	92.1	16.3	139.1	15.8	117.9	80.0	619.6	32.8	71.1	47.5
5		144.0	190.7	13.4	169.2	15.0	108.1	115.0	705.2	28.8	77.1	17.2
6		116.7	151.7	8.8	11.9	11.8	83.4	108.6	687.2	28.9	55.0	19.3
10・1		80.2	115.7	8.6	11.9	5.7	50.0	92.9	351.1	61.4	67.9	37.0
2		61.5	75.7	7.9	21.6	3.8	122.1	47.1	125.4	81.4	87.1	43.1
3		48.6	44.3	3.1	28.1	1.7	117.0	35.7	107.3	82.1	20.8	45.7
4		36.3	30.4	9.6	18.3	1.4	98.3	24.0	39.3	75.7	47.0	18.6
5		23.6	21.4	4.8	6.5	0.6	37.1	10.7	65.0	35.0	32.7	22.0
6		22.2	42.0	15.6	2.9	0.0	36.3	1.7	49.3	32.9	-	19.4
5月3半旬~6月2半旬計	308.1	1202.8	529.0	215.3	107.0	2775.6	1461.5	2498.6	2473.1	428.6	211.0	1328.2
4~10月計	1119.6	7756.0	4771.3	7171.5	2412.6	7982.1	9660.4	9998.5	17689.7	4760.4	2211.2	9364.8

チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:京丹後市大宮町(口大野団地)

誘殺数:例年並

誘殺盛期:例年並(未確定)

月・半旬	R04	例年	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28	H27	H26	H25参考値	H24参考値
4・1	9.3	70.1	18.6	131.0	1.4	110.0	20.0	151.0	58.6	-	1.3	0.0
2	109.3	50.6	1.4	0.7	3.6	50.0	100.0	165.0	33.7	-	0.0	0.0
3	141.1	96.8	7.0	3.6	5.0	84.9	444.6	119.0	110.0	0.0	0.0	0.0
4	151.4	62.1	8.7	9.3	16.6	66.4	126.4	155.0	111.1	3.4	0.3	0.0
5	327.9	47.2	0.7	7.6	24.4	25.7	102.9	107.9	104.6	3.7	0.7	0.0
6	131.1	32.8	8.1	2.9	25.0	1.4	81.3	46.7	94.3	2.9	0.0	0.0
5・1	1.5	12.5	2.5	29.3	10.1	1.9	49.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2	4.5	6.6	0.5	12.2	5.3	1.7	29.7	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0
3	4.4	0.9	0.8	1.4	3.6	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0
4	2.6	1.0	1.2	2.1	0.7	1.7	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	3.2	0.0	0.0	0.7	3.3	1.9	10.6	8.7	0.0	0.0	0.0
6	54.9	101.5	3.4	0.6	8.6	68.0	11.1	66.9	642.6	10.7	0.0	0.0
6・1	224.6	170.1	11.4	44.1	20.0	158.9	135.0	236.2	732.7	22.1	0.0	0.7
2	281.9	329.5	47.0	109.3	166.4	253.9	1043.6	341.7	635.0	39.3	0.0	1.2
3		394.8	97.1	324.3	181.8	429.9	1227.9	342.9	522.9	31.9	0.0	1.1
4		255.2	19.3	296.4	202.4	479.3	549.0	213.1	256.7	25.1	0.0	0.0
5		141.1	21.0	242.4	179.9	98.6	380.1	122.7	66.1	17.9	0.0	0.0
6		83.9	21.4	100.7	62.1	54.4	381.4	35.7	13.6	2.1	0.0	0.0
7・1		44.1	18.6	33.3	40.4	41.6	25.0	145.0	22.0	27.0	0.0	0.0
2		78.0	90.0	99.9	46.3	107.9	45.1	169.0	19.1	46.4	0.0	0.0
3		187.5	182.7	225.0	497.2	104.4	55.7	162.0	57.1	216.2	0.0	0.0
4		300.1	359.8	794.3	610.6	77.6	43.3	70.0	283.4	161.5	0.0	0.0
5		217.8	231.2	468.1	617.9	38.6	40.7	45.3	218.6	82.3	0.0	0.0
6		149.1	171.9	268.9	545.1	6.9	28.1	49.0	102.6	20.6	0.8	1.4
8・1		66.8	74.7	170.7	135.4	4.0	17.0	80.7	20.0	32.1	0.2	0.6
2		85.9	7.9	78.7	61.1	2.4	25.0	447.9	12.6	51.4	0.0	0.0
3		87.0	24.4	126.5	60.3	0.6	17.9	394.1	12.1	60.4	0.0	0.0
4		93.2	42.1	363.1	22.6	0.1	26.9	231.3	14.3	45.0	0.0	0.0
5		100.7	56.5	611.4	12.9	0.0	33.6	40.7	12.9	37.7	0.0	0.0
6		52.6	45.5	244.3	29.7	0.1	43.7	14.6	23.1	19.5	0.0	0.1
9・1		28.8	65.0	24.3	31.9	0.7	55.7	17.3	24.5	11.0	0.0	0.7
2		35.6	138.0	24.7	28.1	1.3	32.6	24.1	18.2	17.9	0.0	0.1
3		48.8	178.6	10.0	44.7	0.9	23.3	32.6	22.7	77.9	0.0	0.0
4		61.0	200.4	13.4	72.1	0.0	47.9	32.9	32.5	88.6	0.0	0.0
5		89.2	181.6	16.1	194.3	2.9	97.6	92.9	38.4	89.9	0.0	0.0
6		82.5	144.4	17.9	218.7	4.6	78.3	83.0	46.4	66.4	0.0	0.4
10・1		51.2	85.0	13.3	180.4	4.6	30.7	38.7	18.4	38.4	0.0	0.6
2		28.8	17.0	10.4	98.6	0.0	55.7	5.0	19.5	24.3	0.0	0.0
3		19.9	0.0	7.9	68.6	5.1	36.0	1.0	26.9	13.6	0.0	0.0
4		9.9	0.7	2.1	36.4	5.6	20.9	1.7	7.9	3.6	0.0	0.0
5		6.3	3.6	2.6	13.3	4.3	12.9	4.3	7.3	2.3	0.0	0.0
6		3.8	-	4.3	7.7	1.7	6.9	0.0	4.9	1.1	0.0	0.0
5月3半旬～6月2半旬計	568.4	606.1	63.8	157.5	200.0	485.8	1191.6	658.4	2019.6	72.1	0.0	1.9
4～10月計	1444.5	3788.4	2589.7	4949.1	4591.9	2305.9	5584.5	4310.0	4457.0	1394.2	3.3	6.9

注:平成26年からフェロモントラップの設置場所を変更(丹後農研一口大野団地、色ぬり部分は参考値)

