チャ

カンザワハダニ

【山城地域】

- いずれのほ場でも発生を認めず、発生量は平年比やや少であった。
- 成虫は発生を認めず平年比やや少であった。
- 幼若虫および卵は認めず、平年並であった。

【丹波地域】

- 1ほ場で発生を確認し(発生ほ場率16.7%)、発生量は平年並であった。
- 成虫数は平年比やや多であった。
- 成虫濃赤色化率は0.0%で、平年並であった。
- 幼若虫および卵は認めず、平年並であった。

【丹後地域】

- いずれのほ場でも発生を認めず、発生量は平年並であった。
- 成虫、幼若虫及び卵は認めず、平年並であった。

チャトゲコナジラミ

【山城地域】寄生葉率6.5%、発生量指数3.5で、発生ほ場率は47.6%であった。発生量は例年比少であった。

【丹波地域】寄生葉率2.3%、発生量指数1.3で、発生ほ場率は66.7%であった。発生量は例年並であった。

【丹後地域】寄生葉率4.7%、発生量指数2.7で、発生ほ場率は50.0%であった。発生量は例年並であった。

その他の病害虫

城陽市1と宇治田原町1でアブラムシの発生を確認。

令和6年 チャ害虫調査(カンザワハダニ:100葉調査、チャトゲコナジラミ:50葉調査)

山城:2月21日・25日、丹波:2月21日、丹後:2月21日 調査

調査場所	カンザワハダニ										チャトゲコナジラミ						
	寄生葉率(%)	全成虫数(頭)	濃赤色化率(%)	濃赤色化率(%)	幼若虫数(頭)	産卵率(%)	産卵数(個)	着色卵数(個)	卵着色率(%)	発生ほ場率(%)	寄生葉率(%)	発生程度別葉数			発生量指数	発生ほ場率(%)	
												0	1	2			
(山城地域)																	
宇治市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
宇治市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
宇治市3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
宇治市4	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		8.0	46	4	0	4		
宇治市5	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
宇治市6	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
城陽市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
城陽市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
宇治田原町1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		12.0	44	6	0	6		
宇治田原町2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		28.0	36	14	0	14		
宇治田原町3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
宇治田原町4	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
京田辺市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		6.0	47	3	0	3		
木津川市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		10.0	45	4	1	6		
木津川市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		8.0	46	4	0	4		
和東町1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		8.0	46	4	0	4		
和東町2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		30.0	35	10	5	20		
和東町3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
和東町4	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		4.0	48	2	0	2		
和東町5	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
和東町6	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		22.0	39	11	0	11		
平均値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	6.5	46.8	3.0	0.3	3.5		47.6
平年(例年)比	やや少	やや少	—	—	並	並	並	—	—	やや少	(並)	—	—	—	(並)		(少)
前年値	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	4.5	4.5				2.2		40.9
平年(例年)値	0.3	0.3		10.2	0.4	0.1	0.3		33.7	12.5	11.3				7.6		65.6
(丹波地域)																	
福知山市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		2.0	49	1	0	1		
福知山市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		10.0	45	4	1	6		
綾部市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		2.0	49	1	0	1		
綾部市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
舞鶴市1	1.0	2	0	0.0	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
舞鶴市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
平均値	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	16.7	2.3	48.8	1.0	0.2	1.3		50.0
平年(例年)比	並	やや多	—	(並)	並	並	並	—	—	並	(並)	—	—	—	(並)		(並)
前年値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	2.0				1.0		50.0
平年(例年)値	0.2	0.2		20.0	0.0	0.0	0.0		—	10.0	3.5				2.4		52.4
(丹後地域)																	
京丹後市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		0.0	50	0	0	0		
京丹後市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		4.0	48	2	0	2		
京丹後市3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	0	—		10.0	45	4	1	6		
平均値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	4.7	47.7	2.0	0.3	2.7		66.7
平年(例年)比	並	並	—	—	並	並	並	—	—	並	(少)	—	—	—	(少)		(やや少)
前年値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	20.5				11.5		75.0
平年(例年)値	0.4	0.5		38.9	0.1	0.0	0.0		—	25.0	20.9				18.9		85.7

※ チャトゲコナジラミの発生程度 0:発生が見られない、1:1~9匹/葉、2:10匹以上/葉 発生量指数 = (N1 + N2 × 2) / (2 × 50) × 100 “N:葉数”

カンザワハダニ(2月第5半旬)

地域	平年 (例年)比	項目 \ 年次	R7	平年 (例年)比	平年 (例年)	R6	R5	R4	R3	R2	H31	H30	H29	H28	H27	
山城	やや少	寄生葉率(%)	0.00	やや少	0.27	0.09	0.09	0.18	0.00	0.27	0.00	0.05	0.14	0.95	0.90	
		成虫数(頭/100葉)	0.00	やや少	0.33	0.09	0.14	0.23	0.00	0.41	0.00	0.09	0.14	1.18	1.00	
		幼若虫数(＼)	0.00	並	0.39	0.00	0.00	2.09	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	1.00	0.48	
		合計(＼)	0.00	やや少	0.72	0.09	0.14	2.32	0.00	0.77	0.00	0.09	0.14	2.18	1.48	
		成虫濃赤色化率(%)	—	—	(10.24)	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	67.12	0.00
		産卵葉率(%)	0.00	並	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.57
		卵数(頭/100葉)	0.00	並	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2.57
		卵着色率(%)	—	—	(33.69)	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	100.00	1.06
		発生ほ場率(%)	0.00	やや少	12.46	4.55	9.09	9.09	0.00	13.60	0.00	4.55	9.09	31.80	42.86	
丹波	並	寄生葉率(%)	0.17	並	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00	0.83		
		成虫数(頭/100葉)	0.33	やや多	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00	0.83		
		幼若虫数(＼)	0.00	並	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
		合計(＼)	0.33	やや多	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00	1.00		
		成虫濃赤色化率(%)	0.00	(並)	(20.00)	—	—	—	—	—	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		産卵葉率(%)	0.00	並	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	
		卵数(頭/100葉)	0.00	並	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	
		卵着色率(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		発生ほ場率(%)	16.67	並	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.67	0.00	50.00	
丹後	並	寄生葉率(%)	0.00	並	0.35	0.00	0.75	0.00	0.75	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	
		成虫数(頭/100葉)	0.00	並	0.53	0.00	0.75	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	
		幼若虫数(＼)	0.00	並	0.05	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合計(＼)	0.00	並	0.58	0.00	1.00	0.00	1.25	0.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	
		成虫濃赤色化率(%)	—	—	(38.89)	—	—	—	83.33	100.00	0.00	0.00	—	50.00	0.00	
		産卵葉率(%)	0.00	並	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		卵数(頭/100葉)	0.00	並	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		卵着色率(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		発生ほ場率(%)	0.00	並	25.00	0.00	50.00	0.00	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	

※本表は、小数点以下2ケタまで記載している。

チャトゲコナジラミ(2月第5半旬)

地域	平年 (例年)比	項目 \ 年次	R7	平年 (例年)比	平年 (例年)	R6	R5	R4	R3	R2	H31	H30	H29	H28	H27
山城	(やや少)	寄生葉率(%)	6.48	(並)	11.27	4.45	4.64	6.73	12.55	29.82	14.36	6.36	—	—	—
		発生量指数	3.52	(並)	7.56	2.23	2.41	3.50	6.82	18.23	16.09	3.66	—	—	—
		発生ほ場率(%)	47.62	(少)	65.59	40.91	59.10	54.55	59.09	90.90	86.40	68.20	—	—	—
丹波	(並)	寄生葉率(%)	2.33	(並)	3.45	2.00	0.33	1.33	2.00	4.00	10.00	4.50	—	—	—
		発生量指数	1.33	(並)	2.44	1.00	0.17	0.67	1.00	2.00	10.00	2.25	—	—	—
		発生ほ場率(%)	50.00	(並)	52.39	50.00	16.67	33.33	50.00	100.00	66.70	50.00	—	—	—
丹後	(少)	寄生葉率(%)	4.67	(少)	20.86	20.50	6.50	6.00	22.00	24.00	59.50	7.50	—	—	—
		発生量指数	2.67	(少)	18.86	11.50	4.00	3.00	11.25	12.00	86.50	3.75	—	—	—
		発生ほ場率(%)	66.67	(やや少)	85.71	75.00	100.00	50.00	75.00	100.00	100.00	100.00	—	—	—

※本表は、小数点以下2ケタまで記載している。