

チャ

カンザワハダニ

【山城地域】

- 2ほ場で発生を確認し(発生ほ場率9. 1%)、発生量は平年比やや多であった。
- 成虫の発生量は平年比やや多であった。
- 幼若虫の発生は認めず、平年並であった。
- 産卵葉率及び卵数は平年比多であった。

【丹波地域】

- いずれのほ場でも発生を認めず、発生量は平年並であった。
- 成虫、幼若虫及び卵は認めず、平年並であった。

【丹後地域】

- いずれのほ場でも発生を認めず、発生量は平年並であった。
- 成虫、幼若虫及び卵は認めず、平年並であった。

チャトゲコナジラミ

【山城地域】寄生葉率5. 6%、発生量指数3. 0で、発生ほ場率は50. 0%であった。発生量は例年並であった。

【丹波地域】寄生葉率0. 7%、発生量指数0. 3で、発生ほ場率は16. 7%であった。発生量は例年比やや少であった。

【丹後地域】寄生葉率19. 5%、発生量指数9. 8で、発生ほ場率は100. 0%であった。発生量は例年並であった。

その他の病害虫

チュウゴクアミガサハゴロモの産卵痕を確認した地点:五ヶ庄1・五ヶ庄2・白川1・禪定寺1・禪定寺2・南1・飯岡2・例幣2

令和8年 チャ害虫調査(カンザワハダニ:100葉調査、チャトゲコナジラミ:50葉調査) 山城:2月24日・25日、丹波:2月24日、丹後:2月24日 調査

調査場所	カンザワハダニ										チャトゲコナジラミ					
	寄生 葉率 (%)	全成虫数 (頭)	濃赤色化 成虫数 (頭)	濃赤色 化率(%)	幼若虫数 (頭)	産卵葉率 (%)	産卵数 (個)	着色卵数 (個)	卵着色率 (%)	発生ほ場 率(%)	寄生 葉率 (%)	発生程度別葉数			発生量 指数	発生ほ 場率 (%)
												0	1	2		
(山城地域)																
宇治市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
宇治市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
宇治市3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
宇治市4	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		2.0	49	1	0	1	
宇治市5	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
宇治市6	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
城陽市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		14.0	43	7	0	7	
城陽市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
宇治田原町1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		2.0	49	1	0	1	
宇治田原町2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		6.0	47	2	1	4	
宇治田原町3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		4.0	48	2	0	2	
宇治田原町4	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
京田辺市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
京田辺市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
木津川市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		2.0	49	1	0	1	
木津川市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		24.0	38	12	0	12	
和東町1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		20.0	40	6	4	14	
和東町2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		2.0	49	1	0	1	
和東町3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
和東町4	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		40.0	30	19	1	21	
和東町5	2.0	4	4	100.0	0	2.0	30	20	66.7		6.0	47	3	0	3	
和東町6	2.0	4	4	100.0	0	2.0	16	10	62.5		0.0	50	0	0	0	
平均値	0.2	0.4	0.4	100.0	0.0	0.2	2.1	15.0	—	9.1	5.5	47.2	2.5	0.3	3.0	50.0
平年(例年)比	やや多	やや多	—	(多)	並	多	多	—	—	並	—	—	—	—	—	—
前年値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0						
平年(例年)値	0.2	0.2		11.5	0.3	0.0	0.0		50.0	8.2						
(丹波地域)																
福知山市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
福知山市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
綾部市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
綾部市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
舞鶴市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		0.0	50	0	0	0	
舞鶴市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		4.0	48	2	0	2	
平均値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—		0.7	49.7	0.3	0.0	0.3	16.7
平年(例年)比	並	並	—	(並)	並	並	並	—	—	並	—	—	—	—	—	—
前年値	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	16.7						
平年(例年)値	0.1	0.1		20.0	0.0	0.0	0.0		—	6.7						
(丹後地域)																
京丹後市1	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		32.0	34	16	0	16	
京丹後市2	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		24.0	38	12	0	12	
京丹後市3	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		12.0	44	6	0	6	
京丹後市4	0.0	0	0	—	0	0.0	0	—	—		10.0	45	5	0	5	
平均値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	19.5	40.3	9.8	0.0	9.8	100.0
平年(例年)比	並	並	—	—	並	並	並	—	—	並	—	—	—	—	—	—
前年値	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0						
平年(例年)値	0.3	0.4		46.7	0.1	0.0	0.0		—	22.5						

※ チャトゲコナジラミの発生程度 0: 発生が見られない、1: 1〜9匹／葉、2: 10匹以上／葉

発生量指数 = (N1 + N2 × 2) / (2 × 50) × 100 “N: 葉数”

カンザワハダニ(2月第5半旬)

地 域	平 年 (例年)比	項目 \ 年次	R8	平 年 (例年)比	平 年 (例年)	R7	R6	R5	R4	R3	R2	H31	H30	H29	H28
山 城	やや多	寄生葉率(%)	0.18	やや多	0.18	0.00	0.09	0.09	0.18	0.00	0.27	0.00	0.05	0.14	0.95
		成虫数(頭／100葉)	0.36	やや多	0.23	0.00	0.09	0.14	0.23	0.00	0.41	0.00	0.09	0.14	1.18
		幼若虫数(〃)	0.00	並	0.35	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	1.00
		合計(〃)	0.36	並	0.57	0.00	0.09	0.14	2.32	0.00	0.77	0.00	0.09	0.14	2.18
		成虫濃赤色化率(%)	100.00	(多)	(11.52)	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	25.00	67.12
		産卵葉率(%)	0.18	多	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.05
		卵数(頭／100葉)	2.09	多	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.09
		卵着色率(%)	64.58	—	(50.00)	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	100.00
		発生ほ場率(%)	9.09	並	8.18	0.00	4.55	9.09	9.09	0.00	13.60	0.00	4.55	9.09	31.80
丹 波	並	寄生葉率(%)	0.00	並	0.10	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00
		成虫数(頭／100葉)	0.00	並	0.12	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00
		幼若虫数(〃)	0.00	並	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計(〃)	0.00	並	0.12	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00
		成虫濃赤色化率(%)	—	(並)	(20.00)	0.00	—	—	—	—	—	100.00	0.00	0.00	0.00
		産卵葉率(%)	0.00	並	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
		卵数(頭／100葉)	0.00	並	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
		卵着色率(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		発生ほ場率(%)	0.00	並	6.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	16.67	0.00
丹 後	並	寄生葉率(%)	0.00	並	0.25	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
		成虫数(頭／100葉)	0.00	並	0.38	0.00	0.00	0.75	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.50
		幼若虫数(〃)	0.00	並	0.05	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計(〃)	0.00	並	0.43	0.00	0.00	1.00	0.00	1.25	0.50	0.00	0.00	0.00	1.50
		成虫濃赤色化率(%)	—	—	(46.67)	—	—	—	—	83.33	100.00	0.00	0.00	—	50.00
		産卵葉率(%)	0.00	並	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卵数(頭／100葉)	0.00	並	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卵着色率(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		発生ほ場率(%)	0.00	並	22.50	0.00	0.00	50.00	0.00	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

※本表は、小数点以下2ケタまで記載している。

チャトゲコナジラミ(2月第5半旬)

地 域	平 年 (例年)比	項目 \ 年次	R8	平 年 (例年)比	平 年 (例年)	R7	R6	R5	R4	R3	R2	H31	H30	H29	H28
山城	(並)	寄生葉率(%)	5.55	(並)	10.67	6.48	4.45	4.64	6.73	12.55	29.82	14.36	6.36	—	—
		発生量指数	3.05	(並)	7.06	3.52	2.23	2.41	3.50	6.82	18.23	16.09	3.66	—	—
		発生ほ場率(%)	50.00	(並)	63.35	47.62	40.91	59.10	54.55	59.09	90.90	86.40	68.20	—	—
丹波	(やや少)	寄生葉率(%)	0.67	(やや少)	3.31	2.33	2.00	0.33	1.33	2.00	4.00	10.00	4.50	—	—
		発生量指数	0.33	(やや少)	2.30	1.33	1.00	0.17	0.67	1.00	2.00	10.00	2.25	—	—
		発生ほ場率(%)	16.67	(少)	52.09	50.00	50.00	16.67	33.33	50.00	100.00	66.70	50.00	—	—
丹後	(並)	寄生葉率(%)	19.50	(並)	18.83	4.67	20.50	6.50	6.00	22.00	24.00	59.50	7.50	—	—
		発生量指数	9.75	(並)	16.83	2.67	11.50	4.00	3.00	11.25	12.00	86.50	3.75	—	—
		発生ほ場率(%)	100.00	(並)	83.33	66.67	75.00	100.00	50.00	75.00	100.00	100.00	100.00	—	—

※本表は、小数点以下2ケタまで記載している。