

チャ

病虫害発生状況

1 病害の平年（例年）比較

	炭疽病	輪斑病	灰色かび病	新梢枯死症	もち病	網もち病
山城	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)
丹波	並	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)
丹後	やや少	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)	並 (発生を認めず)

2 害虫（No. 1）の平年（例年）比較

	カンザワハダニ	チャノホソガ			チャノコカクモンハマキ		
		調査	フェロモントラップ		調査	フェロモントラップ	
			誘殺数	誘殺盛期		誘殺数	誘殺盛期
山城	やや多	並	並	並	並	並	-
丹波	並	並 (発生を認めず)	(少)	(やや遅い)	やや多	(やや少ない)	(やや早い)
丹後	やや多	並 (発生を認めず)	少	遅い	並 (発生を認めず)	やや少ない	-

3 害虫（No. 2）の平年（例年）比較

	チャノキイロ アザミウマ	チャノミドリヒメ ヨコバイ	コミカン アブラムシ	ツマグロ アオカスミカメ	クワシロ カイガラムシ	チャトゲ コナジラミ
山城	並	やや少	少 (発生を認めず)	やや少	やや少	並
丹波	少	並	並 (発生を認めず)	やや少	少 (発生を認めず)	少 (発生を認めず)
丹後	並	やや少	並 (発生を認めず)	やや多	やや少	並

4 発生程度別基準

病虫害名	程度					
	調査項目	無	少	中	多	甚
炭疽病	病葉数／㎡	0	≦50	≦200	≦ 500	500 <
輪斑病	病葉数／㎡	0	≦50	≦200	≦ 500	500 <
もち病	病葉数／㎡	0	≦50	≦300	≦1000	1000 <
網もち病	病葉数／㎡	0	≦50	≦300	≦1000	1000 <
カンザワハダニ	寄生葉率（％）	0	≦10	≦ 30	≦ 70	70 <
チャノホソガ	巻葉数／㎡	0	≦30	≦100	≦ 250	250 <
チャノコカクモンハマキ	幼虫数／㎡	0	≦ 5	≦ 15	≦ 35	35 <
チャノミドリヒメヨコバイ	被害芽率（％）	0	≦ 5	≦ 15	≦ 30	30 <
ツマグロアオカスミカメ	被害芽数／㎡	0	≦25	≦ 80	≦ 160	160 <
クワシロカイガラムシ	寄生株率（％）	0	≦20	≦ 25	≦ 70	70 <

5 その他 見られた病虫害

1. チュウゴクアミガサハゴロモ 2. アオバハゴロモ

チャ病害虫発生状況平年比較（病害）

炭疽病 8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	並	病葉数	並	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	3.3	0.6	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	13.1	0.0	0.0	25.0	28.6	13.6	54.5	0.0	0.0	9.1	0.0
丹波	並	病葉数	やや少	1.0	6.1	1.5	15.3	2.0	0.4	0.7	1.2	3.5	22.0	3.8	10.5
		発生ほ場率(%)	並	50.0	57.3	66.7	83.3	66.7	40.0	33.3	33.3	66.7	50.0	83.3	50.0
丹後	やや少	病葉数	やや少	0.8	15.7	53.0	55.3	0.8	0.0	1.3	6.5	1.3	16.8	21.3	1.0
		発生ほ場率(%)	やや少	25.0	67.5	100.0	100.0	50.0	0.0	25.0	75.0	50.0	100.0	100.0	75.0

輪斑病	8 月
-----	-----

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	並	病葉数	並	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	1.6	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	5.2	0.0	0.0	15.0	9.5	13.6	4.5	4.5	0.0	4.5	0.0
丹波	並	病葉数	並	0.0	0.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	1.7	2.3	0.0	0.5	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	21.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	83.3	16.7	16.7	0.0
丹後	並	病葉数	並	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3
		発生ほ場率(%)	並	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	25.0

灰色かび病 8月

[illegible]

新梢枯死症 8月

[illegible]

もち病 8月

[illegible]

網もち病 8月

[illegible]

チャ病害虫発生状況平年比較（害虫N o. 1）

カンザワハダニ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	やや多	寄生葉率(%)	多	8.2	4.0	4.5	3.6	6.6	3.5	5.8	0.6	4.7	6.1	0.3	4.6
		成虫数	多	46.8	11.2	12.3	5.2	26.7	10.8	14.7	2.1	7.5	17.0	0.3	15.1
		幼虫数	やや多	10.8	5.0	5.5	1.0	11.5	11.0	0.7	0.0	6.7	0.3	0.5	13.0
		合計	多	57.6	16.2	17.7	6.2	38.2	21.7	15.5	2.1	14.3	17.3	0.8	28.1
		発生ほ場率(%)	並	40.9	35.1	31.8	45.5	45.0	33.3	36.4	22.7	40.9	50.0	9.1	36.4
丹波	並	寄生葉率(%)	並	11.3	10.6	20.7	0.3	17.3	1.0	10.3	4.7	7.3	30.0	0.0	14.0
		成虫数	並	34.3	35.2	86.0	0.7	55.3	1.3	41.7	5.7	22.0	105.7	0.0	33.7
		幼虫数	並	19.3	57.1	183.7	2.7	38.7	0.0	57.0	6.3	17.0	258.0	0.0	8.0
		合計	並	53.7	92.3	269.7	3.3	94.0	1.3	98.7	12.0	39.0	363.7	0.0	41.7
		発生ほ場率(%)	並	50.0	51.7	33.3	16.7	100.0	16.7	50.0	66.7	83.3	66.7	0.0	83.3
丹後	やや多	寄生葉率(%)	多	19.0	4.6	9.0	4.0	2.0	0.0	0.0	8.0	16.0	3.0	2.0	1.5
		成虫数	多	32.5	8.2	3.5	9.5	6.0	0.0	0.0	8.0	33.0	7.5	14.0	0.5
		幼虫数	多	74.5	12.1	9.5	1.0	4.0	0.0	0.0	1.0	90.0	10.0	0.5	5.0
		合計	多	107.0	20.3	13.0	10.5	10.0	0.0	0.0	9.0	123.0	17.5	14.5	5.5
		発生ほ場率(%)	並	75.0	60.0	100.0	50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	50.0	100.0	50.0	50.0

チャノホソガ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	並	寄生芽率(%)	並	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2
		卵数	並	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		潜行数	やや多	0.1	0.02	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		葉縁数	並	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	並	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2
		巻葉数	やや少	0.05	0.1	0.0	0.00	0.1	0.19	0.14	0.14	0.1	0.23	0.1	0.1
		発生ほ場率(%)	並	13.6	12.5	4.5	0.0	10.0	19.0	18.2	40.9	4.5	9.1	4.5	14.3
丹波	並	寄生芽率(%)	並	0.0	2.0	0.0	0.3	0.7	0.0	4.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.7
		卵数	並	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.3
		潜行数	並	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.3
		葉縁数	並	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	並	0.0	4.5	0.0	0.3	0.7	0.0	4.0	39.5	0.0	0.0	0.0	0.7
		巻葉数	並	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	16.7	0.0	16.7	33.3	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3
丹後	並	寄生芽率(%)	並	0.0	6.3	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	60.0
		卵数	並	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.0
		潜行数	並	0.0	17.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.0
		葉縁数	並	0.0	3.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	29.5
		合計	並	0.0	56.4	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	560.5
		巻葉数	並	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	0.0	0.3	20.3
		発生ほ場率(%)	並	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	0.0	25.0	100.0

チャノコカクモンハマキ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	並	綴葉数	やや少	0.2	0.9	0.2	0.7	0.9	1.2	0.0	0.6	0.1	0.3	0.2	4.6
		幼虫数	並	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
		蛹数	並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	並	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
		発生ほ場率(%)	並	18.2	15.0	18.2	14.3	35.0	23.8	0.0	22.7	4.5	9.1	9.1	13.6
丹波	やや多	綴葉数	やや多	5.7	2.7	0.0	1.8	1.8	0.0	0.7	19.0	0.2	0.2	0.0	3.7
		幼虫数	やや多	1.3	0.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.7	3.8	0.0	0.2	0.0	2.2
		蛹数	並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	やや多	1.3	0.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.7	3.8	0.0	0.2	0.0	2.2
		発生ほ場率(%)	やや多	50.0	21.7	0.0	33.3	33.3	0.0	16.7	50.0	16.7	16.7	0.0	50.0
丹後	並	綴葉数	並	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		幼虫数	並	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		蛹数	並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	並	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	5.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0

チャ病害虫発生状況平年比較（害虫No. 2）

チャノキイロアザミウマ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	並	寄生・被害芽率(%)	並	9.3	15.0	11.3	8.0	13.9	9.8	19.6	4.4	5.7	27.8	22.3	27.2
		虫数	並	2.3	4.2	4.1	0.7	1.7	1.0	7.6	1.9	2.6	2.9	6.4	13.2
		発生ほ場率(%)	並	77.3	79.6	90.0	76.2	90.0	71.4	86.4	59.1	50.0	81.8	95.5	95.2
丹波	少	寄生・被害芽率(%)	少	1.7	7.0	7.0	2.7	5.0	2.8	4.0	9.0	11.2	5.3	11.3	12.0
		虫数	少	0.0	11.0	0.3	2.3	0.0	0.8	0.7	49.5	2.4	39.3	6.0	8.3
		発生ほ場率(%)	少	33.3	77.7	83.3	83.3	83.3	80.0	83.3	50.0	80.0	66.7	100.0	66.7
丹後	並	寄生・被害芽率(%)	並	3.0	12.0	30.0	1.5	5.0	2.7	2.7	0.5	0.0	10.0	14.0	54.0
		虫数	やや少	0.0	12.9	12.0	0.5	3.0	0.0	0.0	1.5	0.0	9.0	8.0	95.0
		発生ほ場率(%)	並	100.0	73.3	100.0	75.0	100.0	66.7	66.7	25.0	0.0	100.0	100.0	100.0

チャノミドリヒメヨコバイ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	やや少	寄生・被害芽率(%)	やや少	0.5	3.9	0.5	0.3	0.8	0.1	10.2	7.4	1.3	0.7	7.5	10.4
		虫数	少	0.4	4.0	0.7	2.9	0.8	6.1	20.2	1.4	0.5	2.0	3.4	2.0
		発生ほ場率(%)	やや少	18.2	39.5	15.0	47.6	20.0	38.1	59.1	86.4	27.3	18.2	50.0	33.3
丹波	並	寄生・被害芽率(%)	並	2.0	3.8	0.0	0.3	2.3	4.8	21.0	0.0	1.2	0.5	6.7	0.7
		虫数	やや少	0.0	5.7	0.0	2.0	0.0	2.8	36.7	7.0	0.4	0.0	7.3	1.0
		発生ほ場率(%)	並	66.7	51.5	0.0	66.7	83.3	100.0	100.0	0.0	40.0	25.0	66.7	33.3
丹後	やや少	寄生・被害芽率(%)	やや少	1.0	3.7	8.5	5.5	2.0	0.0	2.0	6.5	0.0	7.0	2.0	3.5
		虫数	少	0.0	3.8	7.5	3.0	2.0	11.3	1.3	1.5	0.0	1.0	2.0	8.0
		発生ほ場率(%)	やや少	50.0	75.8	100.0	75.0	50.0	66.7	66.7	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0

コミカンアブラムシ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	少	寄生芽率(%)	少	0.0	0.8	0.3	0.6	1.0	1.0	2.2	0.0	0.1	0.5	0.5	2.0
		虫数	少	0.0	5.7	0.6	2.2	2.7	8.5	19.1	0.0	0.1	4.5	4.2	15.6
		発生ほ場率(%)	少	0.0	12.6	5.0	14.3	10.0	4.8	36.4	0.0	4.5	13.6	22.7	14.3
丹波	並	寄生芽率(%)	並	0.0	0.4	0.3	0.7	0.0	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0
		虫数	並	0.0	1.2	0.3	3.7	0.0	0.0	6.0	0.5	0.0	0.0	1.3	0.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	15.8	16.7	33.3	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	33.3	0.0
丹後	並	寄生芽率(%)	並	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.5
		虫数	並	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	40.0	83.0
		発生ほ場率(%)	並	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	100.0	75.0

ツマグロアオカスミカメ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	やや少	被害芽率(%)	並	1.8	3.7	2.1	1.3	2.1	0.0	0.7	15.4	3.7	3.9	5.6	2.0
		被害葉数	並	3.0	8.1	3.3	6.3	0.1	5.8	3.3	54.6	4.4	0.5	2.2	0.6
		発生ほ場率(%)	少	31.8	56.0	54.5	61.9	40.0	28.6	45.5	95.5	68.2	40.9	68.2	57.1
丹波	やや少	被害芽率(%)	並	5.3	9.9	3.0	17.3	11.7	3.6	12.0	0.5	30.8	1.3	14.7	4.3
		被害葉数	やや少	6.2	12.7	8.0	28.0	5.5	9.4	1.5	9.3	26.2	14.7	19.2	4.7
		発生ほ場率(%)	やや少	50.0	75.8	100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	25.0	100.0	66.7	83.3	83.3
丹後	やや多	被害芽率(%)	やや多	9.0	4.6	4.0	2.5	4.0	0.0	14.7	1.0	0.0	0.0	14.0	5.5
		被害葉数	並	3.0	7.3	23.3	4.8	1.3	3.3	9.0	7.8	14.0	0.0	1.5	8.0
		発生ほ場率(%)	やや多	100.0	60.8	75.0	75.0	75.0	33.3	100.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0

クワシロカイガラムシ

8月

地域	平年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R01	H30	H29	H28
山城	やや少	寄生株率(%)	やや少	1.8	11.1	1.4	6.8	4.5	8.3	7.0	3.4	16.4	2.0	12.5	49.0
		発生ほ場率(%)	やや少	22.7	43.8	22.7	36.4	50.0	42.9	68.2	22.7	45.5	27.3	50.0	72.7
丹波	少	寄生株率(%)	少	0.0	19.5	9.2	6.7	25.0	32.5	24.2	50.0	10.8	1.7	4.2	30.8
		発生ほ場率(%)	少	0.0	63.3	33.3	83.3	50.0	83.3	66.7	83.3	66.7	33.3	50.0	83.3
丹後	やや少	寄生株率(%)	やや少	13.8	32.4	10.0	17.5	12.5	65.0	18.8	18.5	2.5	56.3	76.3	46.3
		発生ほ場率(%)	やや少	50.0	82.5	75.0	75.0	50.0	100.0	75.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0

地域	例年比	項目 \ 年次	平年比	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	R02	H30	H29	H28
山城	並	寄生葉率 (%)	やや少	5.1	15.5	15.0	4.4	5.3	1.5	22.0	26.9	20.1	11.2	6.1	42.8
		発生量指数	やや少	3.0	8.7	8.4	2.3	3.2	0.8	16.4	18.2	11.4	6.8	3.6	15.6
		発生ほ場率 (%)	並	63.6	63.9	63.6	50.0	60.0	38.1	68.2	95.5	77.3	59.1	50.0	77.3
丹波	少	寄生葉率 (%)	少	0.0	4.6	2.0	3.0	2.0	1.7	0.3	1.7	8.0	12.7	8.0	6.3
		発生量指数	少	0.0	4.1	1.0	1.7	1.2	0.8	0.2	0.8	4.2	6.0	4.0	21.0
		発生ほ場率 (%)	少	0.0	51.7	66.7	33.3	50.0	33.3	16.7	50.0	83.3	66.7	50.0	66.7
丹後	並	寄生葉率 (%)	並	13.5	24.8	20.0	23.5	4.5	8.5	6.5	42.5	37.5	67.0	7.5	30.5
		発生量指数	並	7.5	15.7	10.5	13.3	2.3	4.5	2.5	24.0	29.0	45.8	4.5	20.8
		発生ほ場率 (%)	やや少	75.0	90.0	100.0	100.0	75.0	50.0	100.0	100.0	75.0	100.0	100.0	100.0

令和8年 チャの病害発生状況（㎡当たり）

山城地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝 数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備 考
調査日 8/14								
宇治市 1		0	0	0	0	0	0	
宇治市 2		0	0	0	0	0	0	
宇治市 3		0	0	0	0	0	0	
宇治市 4		0	0	0	0	0	0	
宇治市 5		0	0	0	0	0	0	
宇治市 6		0	0	0	0	0	0	
城陽市 1		0	0	0	0	0	0	
城陽市 2		0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 1		0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 2		0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 3		0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 4		0	0	0	0	0	0	
京田辺市 1		0	0	0	0	0	0	
京田辺市 2		0	0	0	0	0	0	
木津川市 1		0	0	0	0	0	0	
木津川市 2		0	0	0	0	0	0	
和束町 1		0	0	0	0	0	0	
和束町 2		0	0	0	0	0	0	
和束町 3		0	0	0	0	0	0	
和束町 4		0	0	0	0	0	0	
和束町 5		0	0	0	0	0	0	
和束町 6		0	0	0	0	0	0	
平均値		0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
前年値		0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
平年値		0.6	0.3	0.0	0.06	0.0	0.0	
発生ほ場率	本年値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前年値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値（％）	13.1	5.2	0.0	3.2	0.0	0.0	

丹波地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝 数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日 8/12,13								
福知山市 1		0	0	0	0	0	0	
福知山市 2		0	0	0	0	0	0	
綾部市 1		4	0	0	0	0	0	
綾部市 2		1	0	0	0	0	0	
舞鶴市 1		0	0	0	0	0	0	
舞鶴市 2		1	0	0	0	0	0	
平均値		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値		1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値		6.1	0.5	0.0	0.08	0.0	0.0	
発生ほ場率	本年値（％）	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前年値（％）	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値（％）	57.3	21.7	0.0	8.3	0.0	0.0	

丹後地域		炭疽病 (病葉数)	輪斑病 (病葉数)	灰色かび病 (病葉数・枝 数)	新梢枯死症 (枯死枝数)	もち病 (病葉数)	網もち病 (病葉数)	備考
調査日 8/14								
京丹後市 1		0	0	0	0	0	0	
京丹後市 2		3	0	0	0	0	0	
京丹後市 3		0	0	0	0	0	0	
京丹後市 4		0	0	0	0	0	0	
平均値		0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値		53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値		15.7	0.2	0.0	0.00	0.0	0.0	
発生ほ場率	本年値（％）	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前年値（％）	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値（％）	67.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	

令和8年 チャの虫害発生状況（N o 1）

山城地域		カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
		寄生葉率	成虫数	幼虫数	合計	寄生芽率	卵数	潜行数	葉縁数	合計	巻葉数	綴葉数	幼虫数	蛹数	合計	
調査日	8/14	(%)	100葉当たり	100葉当たり	100葉当たり	(%)	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	
宇治市 1		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治市 2		10.0	14	0	14	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治市 3		0.0	0	0	0	2.0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
宇治市 4		4.0	2	4	6	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
宇治市 5		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治市 6		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城陽市 1		8.0	24	2	26	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城陽市 2		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 1		42.0	62	10	72	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 2		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 3		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇治田原町 4		2.0	2	0	2	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
京田辺市 1		100.0	894	212	1106	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
京田辺市 2		4.0	6	0	6	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
木津川市 1		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
木津川市 2		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
和束町 1		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
和束町 2		0.0	0	0	0	0.0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
和束町 3		2.0	2	0	2	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
和束町 4		8.0	24	10	34	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
和束町 5		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
和束町 6		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平均値		8.2	46.8	10.8	57.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.05	0.2	0.0	0.0	0.0	
前年値		4.5	12.3	5.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.2	0.0	0.0	0.0	
平年値		4.0	11.2	5.0	16.2	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.9	0.5	0.0	0.5	
発生ほ場率	本年値 (%)	40.9				13.6					18.2					
	前年値 (%)	31.8				4.5					18.2					
	平年値 (%)	35.1				12.5					15.0					

丹波地域		カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
		寄生葉率	成虫数	幼虫数	合計	寄生芽率	卵数	潜行数	葉縁数	合計	巻葉数	綴葉数	幼虫数	蛹数	合計	
調査日	8/12,13	(%)	100葉当たり	100葉当たり	100葉当たり	(%)	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	
福知山市 1		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	
福知山市 2		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾部市 1		2.0	2	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾部市 2		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
舞鶴市 1		52.0	160	86	246	0.0	0	0	0	0	0	15	4	0	4	
舞鶴市 2		14.0	44	30	74	0.0	0	0	0	0	0	15	3	0	3	チュウゴクアミガサハゴロモの産卵痕と幼虫を確認
平均値		11.3	34.3	19.3	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.3	0.0	1.3	
前年値		20.7	86.0	183.7	269.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値		10.6	35.2	57.1	92.3	2.0	3.4	0.6	0.5	4.5	4.5	2.7	0.9	0.0	0.9	
発生ほ場率	本年値 (%)	50.0				0.0					50.0					
	前年値 (%)	33.3				0.0					0.0					
	平年値 (%)	51.7				16.7					21.7					

丹後地域		カンザワハダニ				チャノホソガ					チャノコカクモンハマキ					備考
		寄生葉率	成虫数	幼虫数	合計	寄生芽率	卵数	潜行数	葉縁数	合計	巻葉数	綴葉数	幼虫数	蛹数	合計	
調査日	8/14	(%)	100葉当たり	100葉当たり	100葉当たり	(%)	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	100芽当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	㎡当たり	
京丹後市 1		38.0	72	224	296	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	新芽無し枠調査のみ アオバハゴロモの成虫と幼虫を確認
京丹後市 2		34.0	56	70	126	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	新芽無し枠調査のみ アオバハゴロモの被害を確認
京丹後市 3		0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
京丹後市 4		4.0	2	4	6	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平均値		19.0	32.5	74.5	107.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前年値		9.0	3.5	9.5	13.0	1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	
平年値		4.6	8.2	12.1	20.3	6.3	36.2	17.1	3.2	56.4	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	
発生ほ場率	本年値 (%)	75.0				0.0					0.0					
	前年値 (%)	100.0				25.0					25.0					
	平年値 (%)	60.0				25.0					5.0					

令和8年 チャの虫害発生状況（N o 2）

山城地域		チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロ カイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
		被害芽率	虫数	被害芽率	虫数	寄生芽率	虫数	被害芽率	被害葉数	寄生株率	寄生葉率	発生程度別葉数			発生量 指数
調査日 8/14		(%)	100芽当たり	(%)	100芽当たり	(%)	100芽当たり	(%)	㎡当たり	(%)	(%)	0	1	2	
宇治市 1		8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
宇治市 2		12.0	12	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
宇治市 3		14.0	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.0	4.0	48	2	0	2
宇治市 4		16.0	14	4.0	4	0.0	0	0.0	0	5.0	0.0	50	0	0	0
宇治市 5		44.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
宇治市 6		48.0	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.0	49	1	0	1
城陽市 1		2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
城陽市 2		2.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.0	49	1	0	1
宇治田原町 1		6.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
宇治田原町 2		0.0	0	0.0	0	0.0	0	10.0	10	0.0	4.0	48	1	1	3
宇治田原町 3		2.0	0	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	8.0	46	2	2	6
宇治田原町 4		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.0	49	1	0	1
京田辺市 1		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
京田辺市 2		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2.0	49	1	0	1
木津川市 1		8.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.0	6.0	47	3	0	3
木津川市 2		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.0	6.0	47	3	0	3
和束町 1		12.0	2	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	6.0	47	2	1	4
和束町 2		4.0	0	0.0	0	0.0	0	2.0	3	0.0	6.0	47	3	0	3
和束町 3		2.0	0	0.0	0	0.0	0	18.0	29	0.0	8.0	46	4	0	4
和束町 4		2.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	16	0.0	0.0	50	0	0	0
和束町 5		20.0	0	2.0	0	0.0	0	2.0	0	20.0	22.0	39	11	0	11
和束町 6		2.0	2	0.0	0	0.0	0	4.0	8	0.0	34.0	33	12	5	22
平均値		9.3	2.3	0.5	0.4	0.0	0.0	1.8	3.0	1.8	5.1				3.0
前年値		11.3	4.1	0.5	0.7	0.3	0.6	2.1	3.3	1.4	15.0				18.2
平年値		15.0	4.2	3.9	4.0	0.8	5.7	3.7	8.1	11.1	15.5				8.7
発生ほ場率	本年値（％）	77.3		18.2		0.0		31.8		22.7	63.6				
	前年値（％）	90.0		15.0		5.0		54.5		22.7	63.6				
	平年値（％）	79.6		39.5		12.6		56.0		43.8	63.9				

丹波地域		チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロ カイガラムシ	チャトゲコナジラミ				
		被害芽率	虫数	被害芽率	虫数	寄生芽率	虫数	被害芽率	被害葉数	寄生株率	寄生葉率	発生程度別葉数			発生量 指数
調査日	8/12,13	(%)	100芽当たり	(%)	100芽当たり	(%)	100芽当たり	(%)	㎡当たり	(%)	(%)	0	1	2	
福知山市 1		0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.0	4	0.0	0.0	50	0	0	0
福知山市 2		8.0	0	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
綾部市 1		0.0	0	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
綾部市 2		0.0	0	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	50	0	0	0
舞鶴市 1		0.0	0	2.0	0	0.0	0	6.0	18	0.0	0.0	50	0	0	0
舞鶴市 2		2.0	0	0.0	0	0.0	0	24.0	15	0.0	0.0	50	0	0	0
平均値		1.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	5.3	6.2	0.0	0.0				0.0
前年値		7.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	3.0	8.0	9.2	2.0				1.7
平年値		7.0	11.0	3.8	5.7	0.4	1.2	9.9	12.7	19.5	4.6				4.1
発生ほ場率	本年値（％）	33.3		66.7		0.0		50.0		0.0	0.0				
	前年値（％）	83.3		0.0		16.7		100.0		33.3	66.7				
	平年値（％）	77.7		51.5		15.8		75.8		63.3	51.7				

丹後地域		チャノキイロアザミウマ		チャノミドリヒメヨコバイ		コミカンアブラムシ		ツマグロアオカスミカメ		クワシロ カイガラムシ	チャトゲコナジラミ					
		被害芽率	虫数	被害芽率	虫数	寄生芽率	虫数	被害芽率	被害葉数	寄生株率	寄生葉率	発生程度別葉数			発生量 指数	
調査日		8/14	(%)	100芽当たり	(%)	100芽当たり	(%)	100芽当たり	(%)	㎡当たり	(%)	(%)	0	1	2	
京丹後市 1			-	-	-	-	-	-	-	4	35.0	44.0	28	20	2	24
京丹後市 2			-	-	-	-	-	-	-	7	20.0	0.0	50	0	0	0
京丹後市 3			2.0	0	0.0	0	0.0	0	8.0	0	0.0	6.0	47	3	0	3
京丹後市 4			4.0	0	2.0	0	0.0	0	10.0	1	0.0	4.0	48	1	1	3
平均値			3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9.0	3.0	13.8	13.5				7.5
前年値			30.0	12.0	8.5	7.5	0.0	0.0	4.0	23.3	10.0	20.0				24.0
平年値			12.0	12.9	3.7	3.8	1.3	14.0	4.6	7.3	32.4	24.8				15.7
発生ほ場率	本年値（％）		100.0		50.0		0.0		100.0		50.0	75.0				
	前年値（％）		100.0		100.0		0.0		75.0		75.0	100.0				
	平年値（％）		73.3		75.8		24.2		60.8		82.5	90.0				

※ チャトゲコナジラミの発生程度 0：寄生がみられない 1：1～9匹／葉 2：10匹以上／葉

発生量 指数 = (N1+2×N2)／100×100

チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所: 宇治市(茶業研究所)

誘殺数: 平年並

誘殺盛期: -

月・半旬	R08	平年及び例年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28
4・1	0.8	9.0	0.6	0.3	2.0	0.0	69.0	0.0	0.0	1.0	0.0	17.0
2	2.3	16.8	0.4	1.0	10.0	7.0	93.5	6.0	0.0	3.0	3.0	44.3
3	18.0	50.7	1.0	14.0	16.3	47.0	300.5	10.5	1.0	14.6	4.0	97.8
4	52.0	84.7	12.7	34.5	22.7	57.7	328.0	26.5	19.7	68.4	32.0	245.0
5	95.3	196.5	69.3	82.5	37.0	161.6	604.0	20.7	98.3	287.5	92.0	512.0
6	160.0	178.0	47.0	74.2	19.5	158.8	418.4	83.3	67.0	433.8	177.0	301.0
5・1	125.7	251.8	80.0	65.8	61.5	112.3	357.3	228.5	173.0	660.9	366.0	412.5
2	94.0	275.2	33.0	42.8	65.0	58.1	492.4	75.8	215.3	742.2	642.7	384.5
3	72.5	250.5	105.0	28.8	26.4	80.7	472.0	47.8	370.8	740.6	519.9	112.5
4	21.5	96.3	75.0	6.0	24.1	49.0	57.3	34.0	199.5	241.0	237.4	39.7
5	3.0	25.6	6.3	0.5	3.3	24.3	11.7	6.0	37.5	68.0	90.0	8.8
6	0.7	6.6	1.7	1.0	1.3	5.7	1.5	5.0	22.0	18.8	9.0	0.0
6・1	5.5	1.7	0.0	0.0	1.0	0.0	8.5	0.0	2.0	2.1	0.0	3.3
2	16.8	5.5	0.0	3.0	1.0	0.0	43.3	3.0	0.0	0.2	1.0	3.7
3	75.0	31.3	2.3	6.5	2.0	8.7	127.7	53.2	0.0	52.0	20.3	40.0
4	55.5	44.8	7.7	12.5	11.0	22.1	126.0	91.1	28.7	73.0	42.8	33.0
5	42.5	53.3	12.3	51.0	42.5	58.5	59.0	71.5	19.5	71.4	100.2	47.2
6	52.0	58.3	7.7	48.0	48.5	35.1	36.3	95.2	27.2	169.3	104.8	10.8
7・1	24.0	53.3	14.0	21.2	42.5	17.7	38.7	47.0	50.3	197.1	92.0	12.0
2	17.0	23.0	8.0	5.5	14.0	9.0	31.8	28.0	31.0	68.1	27.4	7.0
3	8.7	9.0	0.8	4.3	7.1	1.0	9.0	4.5	38.4	15.2	5.9	4.0
4	4.5	5.2	0.7	1.0	3.0	1.7	15.2	4.8	17.9	2.0	0.8	5.0
5	1.8	9.2	0.5	1.3	2.4	5.8	40.0	15.6	14.7	1.5	0.0	10.0
6	5.0	17.9	3.0	9.7	0.0	11.5	93.8	4.2	15.0	6.9	21.3	13.3
8・1	5.0	19.7	2.0	3.0	4.6	9.0	65.9	56.0	16.0	3.2	31.4	5.7
2	4.0	16.7	3.0	2.0	7.4	2.0	25.7	68.8	12.7	10.4	33.3	2.0
3		8.0	2.0	1.0	0.0	2.0	7.2	33.5	9.3	1.3	24.0	0.0
4		3.1	0.0	1.0	0.7	3.5	3.8	0.8	7.0	8.7	5.2	0.0
5		1.8	0.0	1.0	0.3	1.5	4.7	1.0	2.5	3.0	2.8	1.0
6		3.7	0.7	0.5	1.5	1.0	16.0	4.0	6.2	3.0	1.0	3.0
9・1		6.6	0.3	0.5	0.5	3.0	15.8	28.3	3.3	4.0	1.0	9.0
2		10.2	0.0	0.0	0.0	4.3	18.8	39.2	7.0	9.0	9.8	14.2
3		23.4	2.4	3.2	1.0	10.1	14.9	111.5	12.5	9.5	54.3	14.8
4		47.6	4.6	2.8	2.0	25.5	75.7	219.2	19.5	10.8	73.3	42.6
5		45.8	13.0	4.5	11.6	26.8	51.5	241.8	11.0	4.9	64.5	28.0
6		25.5	14.0	3.5	15.2	5.4	40.6	92.3	19.0	21.6	37.2	6.4
10・1		24.1	21.7	6.5	15.3	3.3	23.7	119.7	24.3	13.2	10.2	3.0
2		20.0	24.3	4.5	13.3	5.1	14.0	31.8	7.7	31.0	61.8	6.7
3		19.8	11.0	0.0	4.7	9.4	12.0	28.2	56.0	23.2	46.3	7.3
4		9.9	4.0	7.4	5.8	12.0	9.3	3.0	22.7	7.5	17.3	10.0
5		8.6	4.3	12.6	4.9	2.3	2.2	18.0	26.3	5.3	5.1	5.3
6		11.0	7.8	7.0	8.3	-	2.5	11.0	56.0	4.3	1.3	0.8
7月3半旬～8月2半旬	29.0	77.7	10.0	21.3	24.5	31.0	249.6	153.9	114.7	39.2	92.7	40.0
4～10月計	547.3	2059.6	604.1	576.4	561.2	1059.5	4239.2	2070.3	1767.8	4112.5	3069.3	2524.2

チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所: 綾部市(京都府立農業大学校)

誘殺数: 例年比やや少ない

誘殺盛期: 例年比やや早い

月・半旬	R08	平年及び例年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28
4・1	0.1	3.5	0.0	2.1	9.5	0.1	8.8	-	0.6	-	-	-
2	8.6	6.8	0.0	2.1	30.5	0.7	6.6	11.1	0.4	2.9	-	-
3	14.4	31.9	0.0	15.0	144.7	9.3	26.2	24.9	0.0	14.4	6.0	78.4
4	20.7	64.0	24.0	30.3	237.3	34.3	52.0	45.0	27.9	86.3	15.0	88.3
5	39.0	81.7	40.9	52.7	62.5	68.6	135.0	123.6	69.4	203.6	22.1	38.5
6	51.3	96.4	57.1	50.0	63.2	115.7	112.7	172.1	100.2	241.4	12.7	38.5
5・1	105.8	140.0	149.3	60.9	106.7	171.9	106.0	204.4	112.5	389.6	34.7	64.1
2	54.9	132.1	134.7	43.1	135.6	192.6	104.3	138.0	105.5	238.0	147.9	81.3
3	27.0	90.1	111.4	12.5	67.1	125.7	62.9	21.3	74.8	157.3	213.0	55.0
4	4.3	40.9	57.1	5.2	28.1	27.4	32.4	14.8	35.7	37.9	143.6	26.7
5	48.1	22.1	11.4	3.9	5.0	145.7	10.6	5.0	5.7	11.6	15.0	6.6
6	28.9	40.4	0.4	3.4	19.7	360.4	5.1	0.0	3.4	4.0	6.0	1.7
6・1	10.9	4.1	1.9	0.0	18.6	2.1	0.7	0.0	0.9	1.9	0.3	15.0
2	27.1	21.6	6.4	8.6	47.7	2.7	40.1	84.6	0.0	9.3	1.4	15.0
3	115.0	54.0	9.3	27.0	104.9	39.7	61.6	211.4	17.1	52.7	1.4	14.7
4	166.4	71.9	30.9	51.9	255.7	95.0	42.1	91.4	50.0	63.6	24.3	13.6
5	172.4	96.7	62.1	102.1	276.3	133.6	43.9	125.3	71.9	63.6	84.7	3.9
6	59.3	78.3	17.1	26.7	194.3	72.7	38.3	137.0	123.3	63.6	108.7	0.9
7・1	18.7	48.1	9.0	16.1	63.6	57.7	29.3	93.6	115.5	52.9	43.6	0.0
2	5.4	42.7	3.9	28.6	9.3	160.0	45.7	43.3	81.9	36.6	15.6	2.1
3	0.7	24.3	5.0	2.1	5.9	114.3	46.6	-	34.3	0.7	5.4	4.7
4	4.3	15.8	2.1	9.0	3.9	62.9	43.9	-	5.7	7.0	0.7	7.4
5	9.9	18.8	1.7	12.7	5.0	2.9	30.7	80.7	22.8	13.4	7.1	11.4
6	14.6	36.8	3.3	11.1	3.9	7.7	30.4	141.4	47.5	24.9	37.1	60.4
8・1	9.3	35.7	5.7	5.0	9.3	5.9	50.9	118.4	45.0	20.7	42.9	53.5
2	0.0	33.0	12.5	3.0	13.4	5.7	57.0	91.3	21.3	43.6	42.9	39.0
3		17.6	8.3	0.1	12.9	5.7	10.7	45.6	18.8	33.6	31.4	8.6
4		9.2	4.4	0.7	6.0	2.9	10.7	19.7	12.9	10.0	16.4	8.6
5		7.3	2.5	8.1	4.9	1.1	14.4	12.9	4.4	7.9	6.9	10.2
6		13.6	2.0	21.4	13.4	3.4	28.1	29.1	5.1	8.3	10.3	15.2
9・1		28.4	1.1	25.3	38.6	8.6	40.7	85.7	27.4	31.9	11.7	12.7
2		62.2	1.4	23.6	50.0	42.1	172.7	101.4	49.8	70.0	54.8	56.6
3		74.2	13.3	29.9	54.0	37.9	146.9	111.9	77.5	57.3	121.1	92.6
4		96.5	25.7	28.0	55.7	35.3	58.6	160.0	119.3	36.8	342.9	102.9
5		110.5	30.7	22.9	55.0	36.4	235.0	135.2	119.8	82.5	300.6	86.4
6		74.5	38.6	17.1	45.1	21.6	136.9	101.9	10.4	59.7	252.9	60.7
10・1		55.4	35.1	10.3	39.6	17.2	68.9	107.9	10.4	21.8	197.1	45.3
2		43.3	26.0	11.1	43.6	16.3	58.6	76.4	22.5	12.0	114.3	52.1
3		39.3	13.6	32.9	38.4	25.9	43.7	54.6	30.6	5.0	110.0	37.9
4		39.3	3.1	150.0	38.9	25.9	25.7	21.6	12.5	3.6	88.0	24.0
5		34.0	4.9	216.7	41.4	21.3	4.3	21.8	7.1	2.7	11.4	8.6
6		42.2	6.6	286.7	26.6	11.1	24.9	54.6	5.3	1.7	4.5	0.0
7月3半旬～8月2半旬	38.8	164.5	30.3	42.9	41.4	199.4	259.5	-	176.6	110.3	136.1	176.4
4～10月計	1017.1	2079.2	974.5	1469.9	2485.8	2328.0	2304.6	3118.9	1707.1	2286.3	2706.4	1343.1




チャノコカクモンハマキ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所:京丹後市大宮町(口大野団地)

誘殺数: 平年比やや少ない

誘殺盛期:-

月・半旬	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28
4・1	0.0	0.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2	0.0	0.6	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7
3	0.0	1.5	0.0	2.9	5.0	0.0	2.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.7
4	4.4	5.2	6.3	13.1	9.4	0.0	3.6	8.3	0.9	0.0	0.0	1.4
5	9.8	10.7	31.2	20.0	13.6	5.0	6.4	8.0	1.1	0.0	0.0	1.4
6	17.9	15.7	68.6	20.0	20.0	2.6	9.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.6
5・1	11.4	27.9	135.0	35.4	24.5	2.7	2.5	17.9	4.6	0.4	1.3	1.5
2	6.6	23.8	110.0	27.6	22.1	8.0	5.1	10.6	6.0	0.7	2.4	0.5
3	4.5	15.4	86.8	10.0	5.0	5.2	4.6	4.6	6.4	0.7	3.1	0.0
4	6.3	11.3	76.9	4.3	1.6	2.6	2.1	2.9	0.0	0.1	2.1	0.1
5	1.8	2.7	16.5	1.7	0.4	0.0	0.7	2.1	0.0	0.3	1.1	0.6
6	0.9	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.7	0.0	0.3
6・1	0.9	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1.4	1.2	0.0	1.4	6.4	0.0	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
3	10.3	7.6	14.7	6.1	19.1	0.0	2.9	17.1	0.0	0.6	0.0	0.0
4	8.4	17.8	39.2	15.9	52.9	2.1	5.7	22.3	3.0	1.4	0.6	0.6
5	5.6	28.3	53.1	42.1	86.0	3.4	12.1	24.7	4.9	0.0	1.0	2.1
6	3.6	18.8	13.6	19.9	74.9	3.6	13.6	20.7	4.3	0.0	1.4	4.3
7・1	1.9	10.2	8.0	9.7	45.7	0.8	2.1	13.9	1.4	0.0	2.9	4.3
2	0.9	2.7	3.6	2.9	4.3	0.8	2.1	7.3	0.4	0.0	2.4	1.7
3	1.7	1.0	0.8	2.1	3.4	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
4	0.0	1.0	0.7	1.7	2.7	0.0	1.6	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0
5	0.3	2.2	1.1	2.0	2.1	0.7	9.0	2.7	0.0	0.0	0.7	0.0
6	0.7	7.5	1.8	5.1	30.4	3.1	7.7	6.0	6.0	0.0	0.9	0.0
8・1	0.0	7.0	1.3	17.0	22.7	2.1	1.9	7.9	3.3	0.0	0.3	0.0
2	0.5	3.7	0.4	6.0	14.5	0.0	0.7	6.4	1.7	0.0	3.0	0.7
3		1.8	0.6	5.0	1.3	0.0	1.9	5.2	0.0	0.0	0.0	0.3
4		0.7	0.0	1.0	0.5	0.0	1.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
5		0.7	1.3	3.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6		3.1	0.7	10.9	7.8	0.0	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9・1		3.4	0.9	17.1	3.2	1.1	0.7	3.6	0.8	0.0	0.7	1.1
2		6.4	2.1	25.0	3.4	2.0	1.1	4.4	13.4	0.0	0.3	0.9
3		15.4	21.7	54.5	7.9	2.9	5.0	12.1	18.7	0.0	0.0	0.3
4		21.5	37.3	69.9	16.4	3.6	8.0	14.3	22.1	0.0	0.0	1.4
5		19.4	37.9	63.6	18.1	4.9	11.3	14.0	5.0	0.0	2.3	2.6
6		12.3	24.3	33.6	14.3	4.1	11.0	7.1	4.0	0.0	3.1	2.4
10・1		8.9	17.4	28.0	7.9	1.4	6.4	7.1	2.9	0.0	3.6	2.0
2		7.7	13.7	20.1	6.4	2.9	10.4	6.3	2.1	0.0	6.4	2.8
3		4.6	10.7	3.6	4.7	2.4	8.5	5.0	2.1	0.0	3.0	1.5
4		4.0	3.6	19.6	2.9	1.7	3.3	0.0	0.9	0.0	0.6	0.3
5		5.5	2.3	41.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.7
6		9.9	1.4	73.8	0.0	0.0	0.0	0.6	3.4	0.0	0.0	0.0
7月3半旬～8月2半旬	3.2	22.4	6.1	33.9	75.8	6.1	22.2	24.4	11.0	0.0	7.7	0.7
4～10月計	99.8	349.7	847.4	736.6	565.5	69.9	175.8	277.8	120.0	4.9	46.0	37.9



チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)

調査場所: 宇治市(茶業研究所)

誘殺数: 平年並

誘殺盛期: 平年並

月・半旬	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28
4・1	60.3	124.6	8.3	42.5	592.5	30.3	165.8	254.3	6.7	59.3	2.0	84.0
2	46.8	139.5	8.7	59.5	579.5	261.5	59.8	110.0	73.0	33.0	160.0	50.3
3	63.0	84.7	16.0	47.5	224.7	226.5	73.8	3.5	43.0	26.4	134.7	50.8
4	24.0	80.7	22.3	59.3	163.3	42.7	41.8	115.5	101.0	21.6	207.1	32.0
5	10.7	36.6	18.7	41.8	15.0	57.8	11.2	22.0	59.0	11.0	75.3	54.0
6	12.0	20.5	2.0	15.0	18.5	35.5	11.1	22.0	13.0	8.7	62.0	17.0
5・1	1.3	22.9	8.5	3.0	54.5	14.8	10.5	72.5	11.3	8.5	34.0	11.3
2	1.0	9.3	3.5	1.0	15.0	6.3	9.9	17.3	1.5	5.0	28.0	5.8
3	0.0	4.3	6.0	1.0	3.4	3.0	10.4	2.3	3.3	2.8	8.6	2.0
4	2.0	8.8	0.0	2.0	9.1	2.2	57.5	0.0	0.0	4.0	1.4	11.4
5	81.0	68.2	33.3	106.5	63.8	11.8	207.5	73.0	4.7	52.0	3.8	125.6
6	412.7	253.8	158.2	313.5	604.8	139.0	308.3	327.7	89.3	208.5	183.3	205.5
6・1	161.1	343.9	159.5	350.0	582.0	245.0	350.3	743.3	255.0	162.3	366.8	224.8
2	124.2	305.1	149.0	337.0	437.8	443.0	345.5	400.0	245.0	124.4	326.5	242.7
3	66.0	199.0	85.7	125.5	249.3	445.0	154.3	272.6	181.8	77.7	224.9	173.0
4	101.5	106.7	31.3	107.5	103.5	124.3	95.3	138.7	192.7	59.8	134.8	79.0
5	33.5	74.3	13.0	73.0	199.5	91.5	92.5	66.3	27.0	26.9	111.2	41.7
6	87.0	89.6	26.0	46.5	311.4	53.9	207.7	48.4	26.0	45.7	36.8	93.3
7・1	139.0	181.2	49.0	67.3	297.1	55.6	635.3	132.0	30.0	123.7	57.3	365.0
2	111.0	194.5	40.0	72.5	265.8	78.3	592.6	116.0	181.0	140.6	85.1	373.3
3	409.7	210.3	75.0	44.4	209.4	50.5	456.0	374.5	135.0	68.4	148.6	540.7
4	230.5	195.3	38.0	121.7	146.0	37.3	314.5	511.0	146.7	38.0	107.7	491.7
5	131.1	147.6	21.0	104.6	51.2	72.7	260.7	321.5	52.3	17.5	263.3	311.3
6	24.7	130.0	32.0	120.0	104.3	52.0	321.4	369.0	53.0	19.5	71.5	157.7
8・1	15.0	125.6	12.0	14.0	31.6	92.0	289.4	424.0	45.0	28.0	148.5	171.3
2	9.0	91.3	0.5	6.8	14.4	105.0	177.3	220.5	67.3	10.0	105.0	206.0
3		86.1	0.5	9.3	4.0	45.0	85.5	209.8	75.7	6.7	71.5	353.0
4		58.4	1.0	19.5	3.7	28.0	38.8	175.3	79.0	6.7	79.0	153.0
5		38.6	0.0	20.0	1.3	29.0	8.7	37.0	38.5	2.8	105.7	143.0
6		44.0	2.3	26.0	4.5	54.5	60.0	62.5	39.5	3.8	128.8	58.3
9・1		54.7	0.7	12.8	3.5	182.3	120.0	45.3	22.0	0.0	80.8	79.7
2		79.2	3.0	6.7	3.0	318.0	290.0	36.2	23.0	4.0	57.3	50.4
3		76.1	0.8	3.6	12.0	340.6	59.5	22.5	168.5	13.3	75.6	64.6
4		109.5	8.2	5.2	15.0	220.5	372.3	15.8	250.5	15.4	142.3	49.4
5		65.1	8.0	6.2	50.8	201.8	132.5	32.2	96.0	6.9	70.1	46.4
6		52.9	10.0	20.0	54.0	112.4	99.0	49.0	141.0	4.6	13.6	25.2
10・1		48.6	5.0	6.0	18.3	117.7	98.7	103.0	102.7	7.8	17.2	9.5
2		55.8	21.0	9.0	24.2	172.1	60.5	106.6	87.3	3.0	55.0	19.1
3		55.4	22.0	0.0	20.8	222.0	27.5	123.4	50.0	5.2	54.1	29.0
4		31.4	13.0	1.6	18.0	163.5	17.0	14.0	30.0	0.8	28.1	28.4
5		35.6	12.0	11.4	9.3	184.8	6.0	62.3	32.0	2.3	12.3	24.0
6		23.7	6.0	0.0	8.2	148.5	19.5	20.7	7.0	1.6	12.8	13.0
7月3半旬～8月2半旬	820.0	900.0	178.5	411.5	556.9	409.5	1819.3	2220.5	499.3	181.4	844.6	1878.7
4～10月計	2358.1	4163.1	1131.0	2440.7	5598.0	5318.2	6755.9	6273.5	3286.3	1468.2	4092.4	5267.2

チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所: 綾部市(京都府立農業大学校)

誘殺数: 例年比少ない

誘殺盛期: 例年比やや遅い

月・半旬	R08	平年及び例年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28
4・1	17.9	40.6	18.3	11.3	95.5	85.3	16.3	-	16.6	-	-	-
2	13.5	140.4	27.7	22.9	94.5	112.1	11.3	526.6	31.1	296.8	-	-
3	8.1	303.4	41.4	4.4	65.7	145.9	9.5	371.6	54.3	358.9	660.7	1321.4
4	5.7	312.7	75.1	11.3	54.6	185.7	8.2	387.9	100.7	227.3	962.9	1113.2
5	6.4	95.7	52.7	18.8	25.6	232.9	3.6	80.7	57.4	25.0	460.0	0.4
6	6.9	34.0	6.4	7.1	5.8	8.6	6.4	38.7	22.9	5.0	238.4	0.4
5・1	0.8	14.9	25.7	3.7	1.8	17.6	5.1	10.6	0.0	8.3	73.0	3.2
2	0.2	5.7	10.3	1.7	2.5	23.4	2.1	6.0	0.0	3.7	2.1	5.0
3	0.0	8.4	0.0	0.0	44.3	22.9	10.7	0.0	0.0	1.4	1.0	3.6
4	0.0	6.2	0.0	0.0	19.4	26.3	5.6	0.6	0.0	7.1	0.7	2.3
5	31.9	38.8	0.0	25.3	52.4	-	5.0	1.4	0.0	31.4	0.6	233.0
6	117.1	304.7	50.6	79.4	300.9	-	19.7	0.0	0.0	471.3	429.7	1391.1
6・1	186.0	313.9	176.6	114.3	301.4	204.3	228.4	8.6	30.6	1113.0	529.5	434.3
2	220.0	392.2	545.7	345.0	348.1	54.6	261.6	204.7	76.4	1151.4	500.0	434.3
3	165.0	425.1	629.7	249.0	401.6	110.9	290.9	495.7	562.1	539.6	500.0	471.9
4	116.1	475.9	554.1	179.3	490.7	251.4	314.3	827.9	272.9	386.7	859.3	622.1
5	70.7	353.7	409.3	156.4	333.6	114.3	110.3	590.9	80.0	386.7	1115.1	240.4
6	19.3	260.2	88.6	47.9	416.3	62.0	66.1	348.1	9.2	386.7	1065.3	111.3
7・1	38.1	181.7	77.0	48.4	599.3	38.6	76.4	9.3	36.7	687.0	183.6	60.7
2	56.9	355.4	93.1	90.0	702.1	84.3	307.9	569.3	85.6	709.7	278.4	633.6
3	77.9	319.7	188.6	87.9	851.7	64.9	370.9	-	148.6	139.3	242.4	783.1
4	65.7	333.7	146.3	88.7	795.7	42.0	402.7	-	150.7	495.3	152.9	729.3
5	29.7	207.9	83.4	85.0	172.9	15.0	362.1	700.7	109.8	359.4	75.7	115.0
6	6.0	123.4	5.3	81.4	189.6	19.7	143.1	559.1	49.5	26.6	45.1	114.3
8・1	3.6	82.6	1.4	47.5	99.3	3.9	269.6	286.1	0.0	22.1	18.9	77.1
2	0.0	77.5	7.6	57.2	49.7	60.4	327.6	192.5	0.0	6.7	19.3	54.4
3		47.9	3.7	78.3	0.0	150.0	29.3	123.8	0.0	6.6	38.6	48.6
4		66.8	0.0	105.0	7.4	0.0	72.1	262.5	3.0	12.1	50.6	154.9
5		68.3	0.0	53.6	6.1	37.7	66.6	302.1	15.0	15.7	56.7	129.9
6		35.2	2.0	25.3	1.6	57.1	51.4	54.0	27.3	10.9	59.1	63.2
9・1		32.0	4.3	8.1	0.7	17.1	46.4	34.3	15.0	8.5	132.5	52.7
2		29.4	5.7	35.0	3.6	32.9	44.7	42.2	12.7	12.7	70.5	33.6
3		34.2	0.0	39.6	4.9	26.0	63.4	47.5	35.0	13.4	67.6	44.5
4		52.4	0.5	30.4	5.7	25.7	92.1	16.3	139.1	15.8	117.9	80.0
5		68.3	1.2	15.0	12.9	42.9	190.7	13.4	169.2	15.0	108.1	115.0
6		46.9	3.6	17.1	17.6	54.9	151.7	8.8	11.9	11.8	83.4	108.6
10・1		37.2	9.9	12.9	20.3	44.2	115.7	8.6	11.9	5.7	50.0	92.9
2		34.5	11.4	13.1	18.6	23.8	75.7	7.9	21.6	3.8	122.1	47.1
3		27.9	11.4	25.7	4.3	7.4	44.3	3.1	28.1	1.7	117.0	35.7
4		24.2	0.0	24.6	0.7	34.8	30.4	9.6	18.3	1.4	98.3	24.0
5		15.3	0.7	22.9	0.7	47.7	21.4	4.8	6.5	0.6	37.1	10.7
6		14.6	1.3	24.6	2.6	18.9	42.0	15.6	2.9	0.0	36.3	1.7
7月3半旬～8月2半旬	182.9	1144.8	432.6	447.7	2158.9	205.9	1876.0	-	458.6	1049.4	554.3	1873.2
4～10月計	1263.5	5843.3	3370.6	2395.1	6622.7	2608.1	4771.3	7171.5	2412.6	7982.1	9660.4	9998.5

チャノホソガ誘殺数(フェロモントラップ)半旬別推定値

調査場所: 京丹後市大宮町(口大野団地)

誘殺数: 平年比少ない

誘殺盛期: 平年比遅い

月・半旬	R08	平年	R07	R06	R05	R04	R03	R02	H31・R01	H30	H29	H28
4・1	5.0	45.9	3.1	13.4	80.7	9.3	18.6	131.0	1.4	110.0	20.0	151.0
2	2.0	28.6	3.6	28.6	31.6	109.3	1.4	0.7	3.6	50.0	100.0	165.0
3	10.0	51.7	92.0	11.4	68.6	141.1	7.0	3.6	5.0	84.9	444.6	119.0
4	2.5	55.1	63.8	5.0	119.6	151.4	8.7	9.3	16.6	66.4	126.4	155.0
5	2.4	57.3	43.1	0.7	27.9	327.9	0.7	7.6	24.4	25.7	102.9	107.9
6	2.1	23.4	12.1	0.7	6.2	131.1	8.1	2.9	25.0	1.4	81.3	46.7
5・1	0.0	6.3	2.1	0.1	2.5	1.5	2.5	29.3	10.1	1.9	49.1	6.9
2	0.0	3.9	3.9	0.0	2.9	4.5	0.5	12.2	5.3	1.7	29.7	2.6
3	0.0	1.7	3.5	0.0	0.0	4.4	0.8	1.4	3.6	0.0	0.0	0.9
4	0.0	1.2	1.3	0.0	0.0	2.6	1.2	2.1	0.7	1.7	0.0	2.1
5	12.0	27.2	0.3	13.7	199.7	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	1.9	10.6
6	55.7	137.3	153.4	107.7	701.5	54.9	3.4	0.6	8.6	68.0	11.1	66.9
6・1	73.0	252.6	327.1	223.6	1010.8	224.6	11.4	44.1	20.0	158.9	135.0	236.2
2	53.6	452.3	612.9	480.0	1666.7	281.9	47.0	109.3	166.4	253.9	1043.6	341.7
3	30.7	379.3	543.9	322.3	834.1	300.7	97.1	324.3	181.8	429.9	1227.9	342.9
4	17.9	309.3	354.7	179.7	519.3	423.6	19.3	296.4	202.4	479.3	549.0	213.1
5	13.1	156.0	240.0	30.0	203.9	232.0	21.0	242.4	179.9	98.6	380.1	122.7
6	16.4	92.8	36.4	22.0	343.0	102.3	21.4	100.7	62.1	54.4	381.4	35.7
7・1	42.1	153.0	238.7	87.1	670.0	94.2	18.6	33.3	40.4	41.6	25.0	145.0
2	53.1	260.9	429.7	187.9	980.0	145.8	90.0	99.9	46.3	107.9	45.1	169.0
3	28.3	381.7	654.2	259.3	1004.4	126.2	182.7	225.0	497.2	104.4	55.7	162.0
4	41.3	436.0	438.6	206.1	891.0	110.0	359.8	794.3	610.6	77.6	43.3	70.0
5	91.1	265.7	213.1	145.4	372.1	39.3	231.2	468.1	617.9	38.6	40.7	45.3
6	1.7	155.1	50.6	53.1	106.6	38.0	171.9	268.9	545.1	6.9	28.1	49.0
8・1	0.0	63.1	0.7	40.0	26.1	53.5	74.7	170.7	135.4	4.0	17.0	80.7
2	1.0	41.7	0.0	18.9	19.1	145.2	7.9	78.7	61.1	2.4	25.0	447.9
3		52.4	0.0	59.3	6.9	141.5	24.4	126.5	60.3	0.6	17.9	394.1
4		78.8	0.0	143.2	2.8	56.4	42.1	363.1	22.6	0.1	26.9	231.3
5		103.6	0.7	135.5	0.0	12.1	56.5	611.4	12.9	0.0	33.6	40.7
6		59.9	0.3	145.4	10.6	3.4	45.5	244.3	29.7	0.1	43.7	14.6
9・1		32.5	0.0	130.7	6.4	1.1	65.0	24.3	31.9	0.7	55.7	17.3
2		39.4	0.0	60.7	1.3	61.3	138.0	24.7	28.1	1.3	32.6	24.1
3		54.3	5.0	40.3	3.0	152.1	178.6	10.0	44.7	0.9	23.3	32.6
4		53.7	2.0	23.1	6.4	112.1	200.4	13.4	72.1	0.0	47.9	32.9
5		64.1	2.4	17.9	13.9	83.9	181.6	16.1	194.3	2.9	97.6	92.9
6		61.0	7.1	23.6	11.4	59.9	144.4	17.9	218.7	4.6	78.3	83.0
10・1		49.1	7.1	45.4	5.0	52.1	85.0	13.3	180.4	4.6	30.7	38.7
2		27.6	6.3	64.9	5.0	18.6	17.0	10.4	98.6	0.0	55.7	5.0
3		25.7	5.0	84.3	5.0	29.7	0.0	7.9	68.6	5.1	36.0	1.0
4		16.5	0.7	46.0	4.4	36.4	0.7	2.1	36.4	5.6	20.9	1.7
5		12.1	0.3	37.0	2.1	33.6	3.6	2.6	13.3	4.3	12.9	4.3
6		13.1	0.0	39.2	0.4	38.1	-	4.3	7.7	1.7	6.9	0.0
7月3半旬～8月2半旬	163.4	1343.3	1357.2	722.8	2419.3	512.2	1028.2	2005.7	2467.3	233.9	209.8	854.9
4～10月計	555.0	4582.9	4559.7	3533.2	9972.9	4147.6	2589.7	4949.1	4591.9	2305.9	5584.5	4310.0

