

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病 平年並であった。
- 2 白さび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類 平年並であった。
- 4 コナガ 平年並であった。
- 5 ハスモンヨトウ 平年比やや多かった。
- 6 ハイマダラノメイガ 発生を認めなかった（平年並）。
- 7 その他の病害虫 オオタバコガの発生を木津川市①で認めた。オンシツコナジラミの発生を木津川市②で認めた。白斑病の発生及びハモグリバエ類の被害を弥栄町で認めた。ダイコンハムシの発生を久美浜町で認めた。

ダイコン調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）

調査日：令和７年１１月１２、１３日

調査場所		黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ	
		発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (／10株)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)
木津川市①		12.0	0.0	1.2	0.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.8	4.0	0.0	0.0	0.4	0.0	4.0	0.0	0.0
京丹後市弥栄町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平 均	R 7 年	3.0	0.0	0.3	0.4	3.0	0.1	1.0	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0
	平年比	並	並	やや多	並	並	並	並	多	並	並	並	並
	平 年	7.9	3.7	0.3	7.6	7.7	0.7	4.4	0.0	0.1	0.8	0.1	1.4
	R 6 年	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.2	2.0
	R 4 年	2.7	0.0	0.3	0.0	2.7	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7
	R 3 年	53.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 2 年	2.7	0.0	1.5	46.3	19.3	1.3	3.3	0.0	0.1	1.3	0.0	0.0
	R 元 年	14.7	0.7	0.0	5.3	7.3	0.3	3.3	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.1	14.9	11.2	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	6.4
	H 2 9 年	5.6	0.0	0.2	2.6	3.2	4.4	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H 2 8 年	0.0	20.0	0.6	6.3	28.0	0.2	1.6	0.0	0.6	1.6	0.0	0.0
	H 2 7 年	0.0	11.2	0.1	0.3	4.0	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	25.0	0.0	50.0			25.0		50.0			0.0	
	平年比	並	並	並			並		多			並	
	平 年	21.5	14.2	44.0			35.3		14.0			17.7	
	R 6 年	0.0	0.0	66.7			33.3		0.0			33.3	
	R 5 年	0.0	0.0	0.0			0.0		50.0			50.0	
	R 4 年	33.3	0.0	33.3			33.3		0.0			33.3	
	R 3 年	75.0	25.0	0.0			0.0		0.0			0.0	
	R 2 年	33.3	0.0	66.7			16.7		33.3			0.0	
	R 元 年	33.3	16.7	33.3			50.0		16.7			0.0	
	H 3 0 年	0.0	0.0	60.0			40.0		0.0			60.0	
	H 2 9 年	40.0	0.0	40.0			100.0		0.0			0.0	
	H 2 8 年	0.0	33.3	60.0			40.0		40.0			0.0	
	H 2 7 年	0.0	66.7	80.0			40.0		0.0			0.0	