

ダイコン

病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病発生を認めなかった（平年並）。
- 2 白さび病発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 4 コナガ発生を認めなかった（平年並）。
- 5 ハスモンヨトウ発生を認めなかった（平年並）。
- 6 ハイマダラノメイガ . .平年比多かった。
- 7 その他病害虫発生を認めなかった。

ダイコン調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）

調査日：令和８年９月１４日

調査場所		黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ	
		発病株率 （％）	発病株率 （％）	有翅虫数 （／１０株）	無翅虫数 （／１０株）	寄生株率 （％）	幼虫・蛹 （／１０株）	寄生株率 （％）	卵塊数 （／１０株）	幼虫数 （／１０株）	寄生株率 （％）	幼虫数 （／１０株）	寄生株率 （％）
京丹後市久美浜町		0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	5.20	24.0
平 均	R 8 年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	5.20	24.0
	平年比	並	並	並	並	やや少	並	並	並	並	並	多	多
	平年	0.3	0.0	0.13	0.57	1.9	0.08	0.7	0.01	0.11	1.1	0.34	2.7
	R 7 年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.20	2.0	0.00	0.0
	R 6 年	2.7	0.0	0.13	0.13	2.7	0.27	2.7	0.13	0.67	6.7	0.93	6.7
	R 5 年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.27	2.7	0.00	0.13	1.3	0.00	0.0
	R 4 年	0.0	0.0	0.30	0.40	4.0	0.30	2.0	0.00	0.00	0.0	0.30	3.0
	R 3 年	0.0	0.0	0.00	1.50	1.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	R 2 年	0.0	0.0	0.08	0.00	0.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.08	0.8
	R 元年	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	2.10	17.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.07	0.07	1.3	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.40	3.60	5.6	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.30	0.00	3.2	0.00	0.0	0.00	0.10	0.8	0.00	0.0
発 生 ほ場率 （％）	R 8 年	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			100.0	
	平年比	並	並	やや少			並		並			多	
	平年	3.3	0.0	20.0			9.2		16.2			20.3	
	R 7 年	0.0	0.0	0.0			0.0		50.0			0.0	
	R 6 年	33.3	0.0	33.3			33.3		33.3			33.3	
	R 5 年	0.0	0.0	0.0			33.3		33.3			0.0	
	R 4 年	0.0	0.0	25.0			25.0		0.0			50.0	
	R 3 年	0.0	0.0	25.0			0.0		0.0			0.0	
	R 2 年	0.0	0.0	20.0			0.0		0.0			20.0	
	R 元年	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			100.0	
	H 3 0 年	0.0	0.0	16.7			0.0		0.0			0.0	
	H 2 9 年	0.0	0.0	60.0			0.0		20.0			0.0	
	H 2 8 年	0.0	0.0	20.0			0.0		25.0			0.0	