

黒大豆

- 1 葉焼病は、発生を認めなかった(平年並)。
- 2 モザイク病は、平年並の発生であった。
- 3 ハダニ類は、発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 4 アブラムシ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- 5 フタスジヒメハムシは、発生を認めなかった(平年並)。
- 6 サヤムシガ類は、平年比やや少ない発生であった。
- 7 ハスモンヨトウは、発生を認めなかった(平年並)。
- 8 食葉性チョウ目幼虫は、平年比多い発生であった。
- 9 吸蜜性カメムシ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- 10 その他の病害虫は、アザミウマ類、ハモグリバエ類の発生を認めた。

程度別基準						
病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
べと病、葉焼病	発病度	0	1～25	26～50	50～75	76以上
ハダニ類	25小葉当たり虫数	0	1～80	81～330	331～1000	1001以上
吸蜜性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1～5	6～25	26～50	51以上
ハスモンヨトウ	食害度	0	1～10	11～25	26～50	51以上
	白変葉か所数(1a)	0	1～2	3～5	6～7	8以上

* 発病度＝ $((4A+3B+2C+D) \div (4 \times N)) \times 100$
A: 病斑面積76%以上、B: 同面積51～75%、C: 同面積26～50%、D: 1～25%
N: 調査株数
* 食害度＝ $((4A+3B+2C+D) \div (4 \times N)) \times 100$
A: 食害面積51%以上、B: 同面積26～50%、C: 同面積11～25%、D: 1～10%
N: 調査株数

巡回調査結果

調査日：令和6年7月12、16日

調 査 結 果		葉 焼 病		モザイク病		ハダニ類		アブラムシ類		フタスジヒメハムシ		サヤムシガ類				ハスモンヨトウ				食葉性チョウ目幼虫		吸蜜性カメムシ類		備考
		発病株率	発病度	発病株率	寄生株率	25小葉当たり	寄生株率	25小葉当たり	寄生株率	25株当たり	寄生株率	25株当たり	被害株率	25株当たり	食害度	寄生株率	25株当たり	白変葉	寄生株率	25株当たり	寄生株率	25株当たり	種類	
		%		%	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	被害数		%	虫数	カ所数/10a	%	虫数	%	虫数		
平均	久美浜町①	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	4.0	1	0.0	0.0	0	0	4.0	1	0.0	0		
	久美浜町②	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0		
	夜久野①	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0		
	夜久野②	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	20.0	5	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0		
	和知①	0.0	0.00	2.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	4.0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0		
	和知②	0.0	0.00	3.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0		
	丹波①	0.0	0.00	2.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	4.0	1	0.0	0		
	丹波②	0.0	0.00	7.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0		
	R 6 年	0.0	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0		
	平年比(例年比)	並	並	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並	やや少	やや少	やや少	(並)	並	並	並	多	多	並	並		
	平年値(例年値)	1.2	0.29	8.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	2.6	0.7	8.1	2.7	(0.0)	0.1	0.01	0.06	0.2	0.1	0.1	0.01		
	R 5 年	0.5	0.03	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.5	0.1	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0		
	R 4 年	0.0	0.00	3.4	0.5	3.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1		
	R 3 年	0.0	0.00	2.4	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	2.0	0.5	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0		
	R 2 年	2.5	0.63	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	18.5	4.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
	R 元年	0.0	0.00	2.0	1.0	0.6	1.0	0.4	0.0	0.0	2.0	0.5	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0		
	H 3 0 年	5.5	1.38	4.1	0.5	0.1	1.0	0.3	1.0	0.6	0.5	0.1	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	H 2 9 年	3.5	0.88	5.3	1.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.3	6.5	1.9	20.5	8.8	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	H 2 8 年	0.0	0.00	6.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	5.5	1.4	10.5	3.4	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	H 2 7 年	0.0	0.00	5.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	7.0	2.5	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	H 2 6 年	0.0	0.00	40.1	0.5	0.3	1.0	0.6	0.0	0.0	2.5	0.8	7.0	2.3	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
発 生 ほ場率	R 6 年	0.0		50.0	0.0		0.0		0.0		37.5		37.5		0.0	0.0	0.0	0.0	25.0		0.0			
	平年比(例年比)	並		並	やや少		並		並		並		やや少		(並)	並	(並)	並	多		並			
	平年値(例年値)	10.0		67.5	12.5		10.0		7.5		35.0		66.3		(1.8)	1.3	(0.0)	5.0	6.3		1.3			
	R 5 年	12.5		37.5	0.0		0.0		12.5		12.5		12.5		0.0	0.0	0.0	25.0	12.5		0.0			
	R 4 年	0.0		87.5	25.0		12.5		12.5		25.0		87.5		0.0	0.0	0.0	12.5	12.5		12.5			
	R 3 年	12.5		50.0	0.0		12.5		0.0		37.5		75.0		0.0	0.0	0.0	0.0	12.5		0.0			
	R 2 年	25.0		87.5	0.0		0.0		12.5		37.5		100.0		0.0	0.0	0.0	12.5	12.5		0.0			
	R 元年	0.0		62.5	25.0		25.0		0.0		37.5		50.0		0.0	0.0	0.0	0.0	12.5		0.0			
	H 3 0 年	25.0		87.5	12.5		25.0		12.5		12.5		37.5		0.0	0.0	－	0.0	0.0		0.0			
	H 2 9 年	25.0		62.5	25.0		0.0		12.5		50.0		75.0		12.5	12.5	－	0.0	0.0		0.0			
	H 2 8 年	0.0		50.0	12.5		0.0		12.5		75.0		100.0		－	0.0	－	0.0	0.0		0.0			
	H 2 7 年	0.0		50.0	12.5		0.0		0.0		25.0		50.0		－	0.0	－	0.0	0.0		0.0			
	H 2 6 年	0.0		100.0	12.5		25.0		0.0		37.5		75.0		－	0.0	－	0.0	0.0		0.0			