

黒大豆

病害虫等発生状況

- 1
- べと病・・・・・・・・・・・・・
- 2
- 葉焼病・・・・・・・・・・・・・
- 3
- ハダニ類・・・・・・・・・・・・・
- 4
- アブラムシ類・・・・・・・・・・・・・
- 5
- フタスジヒメハムシ・・・・・・・・・・・・・
- 6
- サヤムシガ類・・・・・・・・・・・・・
- 7
- ハスモンヨトウ・・・・・・・・・・・・・
- 8
- 食葉性チョウ目幼虫・・・・・・・・・・・・・
- 9
- 吸実性カメムシ類・・・・・・・・・・・・・
- 1
- 0
- その他の病害虫・・・・・・・・・・・・・

程度別基準						
病害虫名	調査項目	無	少	中	多	量
べと病、葉焼病	発病度	0	1～25	26～50	50～75	76以上
ハダニ類	25小葉当たり虫数	0	1～80	81～330	331～1000	1001以上
吸実性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1～5	6～25	26～50	51以上
ハスモンヨトウ	食害度	0	1～10	11～25	26～50	51以上
	白変葉か所数(1a)	0	1～2	3～5	6～7	8以上

*発病度＝((4A+3B+2C+D)／(4×N))×100
A:病斑面積76%以上、B:同面積51～75%、C:同面積26～50%、D:1～25%
N:調査株数
*食害度＝((4A+3B+2C+D)／(4×N))×100
A:食害面積51%以上、B:同面積26～50%、C:同面積11～25%、D:1～10%
N:調査株数

黒大豆巡回調査結果

調査日：令和7年8月12、13日

調 査 結 果		べと病		葉 焼 病		ハダニ類		アブラムシ類		フタスジヒメハムシ		サヤムシガ類				ハスモンヨトウ				食葉性チョウ目幼虫			吸実性カメムシ類			備考 (調査外株で発生確認)
		発病株率	発病度	発病株率	発病度	寄生株率	虫数	寄生株率	虫数	寄生株率	虫数	寄生株率	虫数	被害株率	被害数	食害度	寄生株率	虫数	白変葉	寄生株率	虫数	種類	寄生株率	虫数	種類	
		%		%		%	頭/25小葉	%	頭/25小葉	%	頭/25株	%	頭/25株	%	箇所/25株		%	頭/25株	箇所数/10a	%	頭/25株		%	頭/25株		
久美浜町①		0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	8.0	4	0.0	0	0.0	0	1.00	4.0	1	7	12.0	3	ジャケガ、ミナミコナメ	4.0	1	イモシジミ	
久美浜町②		0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	16.0	5	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	7	4.0	1	ジャケガ	0.0	0		
夜久野町①		0.0	0.00	0.0	0.0	12.0	170	0.0	0	0.0	0	8.0	2	12.0	4	0.00	0.0	0	5	12.0	4	材カハ、コナ	4.0	1	イモシジミ	アザミ科類、番外アザミ科類 アザミ科類、番外アザミ科被害
夜久野町②		0.0	0.00	0.0	0.0	8.0	2	0.0	0	4.0	1	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0	4.0	1		0.0	0		
和知①		0.0	0.00	0.0	0.0	44.0	567	0.0	0	0.0	0	0.0	0	16.0	6	0.00	0.0	0	0	4.0	1	コナメ	0.0	0		
和知②		0.0	0.00	4.0	1.0	64.0	727	0.0	0	0.0	0	8.0	2	24.0	9	0.00	0.0	0	0	0.0	0		4.0	2	アザミ	
丹波①		36.0	9.00	0.0	0.0	8.0	4	0.0	0	16.0	5	4.0	1	8.0	2	0.00	0.0	0	0	0.0	0	0	4.0	5		
丹波②		4.0	1.00	4.0	1.0	12.0	15	0.0	0	12.0	4	0.0	0	4.0	1	0.00	0.0	0	1	0.0	0	0	8.0	2	イモシジミ、ミナミコナメ	
平均	R 7 年	5.0	1.25	1.0	0.3	18.5	185.6	0.0	0.0	7.0	2.4	2.5	0.6	8.0	2.8	0.13	0.5	0.1	2.5	4.5	1.3		3.0	1.4		
	平年比(例年比)	並	並	やや少	やや少	並	やや多	並	並	多	多	並	やや多	並	並	(やや少)	並	やや少	並	やや多	やや多		多	やや多		
	平年値(例年値)	13.3	3.30	12.5	3.1	18.5	78.1	0.2	0.1	1.2	0.3	2.2	0.6	13.2	5.4	1.06	1.7	1.3	2.4	2.5	0.8		1.4	0.5		
	R 6 年	9.0	2.25	10.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	2.0	1.1	0.00	0.0	0.0	2.0	1.0	0.3		4.0	1.4		
	R 5 年	1.0	0.25	1.5	0.4	11.5	23.5	0.5	0.1	0.0	0.0	1.0	0.3	6.0	2.1	0.22	2.5	1.6	3.9	3.0	0.8		2.0	0.5		
	R 4 年	0.5	0.13	51.0	12.8	3.0	3.9	0.0	0.0	3.0	0.9	0.5	0.1	1.0	0.3	0.25	1.0	0.4	1.5	0.0	0.0		2.5	0.6		
	R 3 年	35.5	8.88	0.0	0.0	3.0	7.8	0.0	0.0	0.5	0.1	4.5	1.3	14.0	4.8	0.25	1.0	2.6	1.9	2.0	0.5		0.5	0.1		
	R 2 年	12.0	3.00	14.5	3.6	1.5	1.8	0.0	0.0	0.5	0.1	1.5	0.5	6.0	2.3	6.88	5.0	2.3	6.6	9.5	4.0		0.0	0.0		
	R元年	0.0	0.00	21.0	5.3	40.0	201.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.0	0.4	8.5	2.5	0.00	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1		1.5	1.5		
	H 3 0 年	6.0	1.50	1.5	0.4	55.5	368.1	0.5	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	5.5	1.4	0.38	0.0	0.0	3.6	3.0	0.8		1.0	0.3		
	H 2 9 年	25.0	6.25	11.0	2.8	20.5	67.0	0.0	0.0	4.5	1.1	2.0	0.6	19.5	7.6	0.50	1.0	0.3	1.4	0.0	0.0		0.5	0.4		
	H 2 8 年	43.5	10.75	6.5	1.6	24.5	19.9	0.5	0.3	0.5	0.1	2.0	0.5	22.0	7.1	-	4.0	2.4	2.0	1.5	0.4		1.0	0.4		
	H 2 7 年	0.0	0.00	7.5	1.9	25.5	87.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.6	47.5	24.9	-	2.5	3.1	1.0	4.0	1.0		0.5	0.1		
発 生 ほ場率	R 7 年	25.0		25.0		75.0		0.0		62.5		37.5		75.0			12.5		50.0	62.5			62.5			
	平年比	並		並		並		多		やや多		並				並		並	多			多				
	平年値	31.3		40.0		56.3		3.8		21.3		26.3		62.5			26.3		53.8	35.0			22.5			
	R 6 年	37.5		75.0		0.0		0.0		25.0		0.0		25.0			0.0		50.0	25.0			50.0			
	R 5 年	12.5		12.5		87.5		12.5		0.0		12.5		50.0			25.0		62.5	62.5			25.0			
	R 4 年	12.5		87.5		12.5		0.0		50.0		12.5		25.0			25.0		62.5	0.0			25.0			
	R 3 年	75.0		0.0		25.0		0.0		12.5		25.0		75.0			25.0		25.0	25.0			25.0			
	R 2 年	50.0		50.0		37.5		0.0		25.0		37.5		50.0			62.5		100.0	37.5			0.0			
	R元年	0.0		62.5		100.0		0.0		12.5		25.0		75.0			0.0		25.0	12.5			25.0			
	H 3 0 年	25.0		37.5		87.5		12.5		12.5		0.0		62.5			0.0		75.0	62.5			12.5			
	H 2 9 年	25.0		25.0		62.5		0.0		62.5		25.0		62.5			25.0		50.0	25.0			25.0			
	H 2 8 年	75.0		25.0		87.5		12.5		12.5		50.0		100.0			50.0		50.0	50.0			25.0			
	H 2 7 年	0.0		25.0		62.5		0.0		0.0		75.0		100.0			50.0		37.5	50.0			12.5			