黒大豆

病害虫等発生状況

１　フタスジヒメハムシ・・・・平年比やや少なかった。
２　チョウ目害虫・・・・・・・平年比多かった。
３　マメシンクイガ・・・・・・被害を認めなかった。
４　その他の病害虫・・・・・・吸実性カメムシ類の発生を認めた。

黒大豆巡回調査結果（２５株２００莢調査）　　調査：令和８年１０月１３、１４日　（%）

調査結果	フタスジヒメハムシ		チョウ目害虫		マメシンクイガ		備考
	食害莢率	ほ場率	食害莢率	ほ場率	食害莢率	ほ場率	
久美浜町①	0.5		0.0		0.0		
久美浜町②	0.0		0.5		0.0		
夜久野町①	1.0		3.0		0.0		
夜久野町②	3.0		3.5		0.0		
和知①	1.0		6.0		0.0		
和知②	0.0		10.5		0.0		
丹波①	1.0		2.0		0.0		
丹波②	2.5		0.5		0.0		
Ｒ８年	1.1	75.0	3.3	87.5	0.0	0.0	
平年比	やや少	並	多	多	－	－	
	やや少		多		－		
平　年	4.3	83.8	1.2	67.5	－	－	
Ｒ７年	2.8	87.5	1.3	75.0	0.0	0.0	
Ｒ６年	5.4	75.0	0.9	87.5	0.0	0.0	
Ｒ５年	1.9	62.5	0.9	50.0	0.0	0.0	
Ｒ４年	6.7	87.5	1.1	75.0			
Ｒ３年	1.1	87.5	1.4	75.0			
Ｒ２年	0.8	75.0	2.6	62.5			
Ｒ元年	11.3	87.5	0.9	75.0			
Ｈ３０年	5.9	100.0	1.0	62.5			
Ｈ２９年	4.6	75.0	0.4	62.5			
Ｈ２８年	2.8	100.0	1.0	50.0			