

エビイモ

病害虫発生状況

- 1

汚斑病

発生を認めなかった。
- 2

モザイク病

発生を認めなかった。
- 3

アブラムシ類

飯岡で発生を認めた。
- 4

ハスモンヨトウ

発生を認めなかった。
- 5

ハダニ類

発生を認めなかった。
- 6

その他の病害虫

発生を認めなかった。

エビイモ調査結果（２５株調査：虫数は１０株換算、アブラムシ類及びハダニ類は中位葉１枚調査）

調査日：令和７年５月１３日

調査場所		汚斑病		モザイク病	アブラムシ類			ハスモンヨトウ		ハダニ類		
		発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	寄生虫数(／10株)			寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	虫数 (／10株)	寄生株率 (%)
					有翅	無翅	計					
京田辺市		0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久美浜町		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平 均	R 7 年	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年比	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R 5 年	2.0	0.4	4.0	1.4	0.0	1.4	12.3	0.0	0.0	0.6	2.0
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												
H 2 7 年												
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	0.0		0.0	100.0				0.0	0.0		
	平年比	—		—	—				—	—		
	平年	—		—	—				—	—		
	R 6 年	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0		
	R 5 年	50.0		50.0	100.0				0.0	50.0		
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												
H 2 7 年												

汚斑病発病程度

発病度＝
$$\frac{6A+4B+2C+D}{6\times\text{調査葉数}}\times100$$

A：病斑面積が4分の3以上である。
B：病斑面積が2分の1～4分の3である。
C：病斑面積が4分の1～2分の1である。
D：病斑面積が4分の1以下である。
E：病斑が認められない。

ハスモンヨトウ被害程度

(発生程度別基準)

程 度	無	少	中	多	甚
食害面積率 (%)	0	1～10	11～25	26～50	51以上