

エビイモ

病害虫発生状況

- 1

汚斑病

.....
- 2

モザイク病

.....
- 3

アブラムシ類

.....
- 4

ハスモンヨトウ

.....
- 5

ハダニ類

.....
- 6

その他の病害虫

.....
- 久美浜町で発生を認めた。
- 久美浜町で発生を認めた。
- 久美浜町で発生を認めた。
- 2地点とも発生を認めた。
- 久美浜町で発生を認めた。
- 発生を認めなかった。

エビイモ調査結果（25株調査：虫数は10株換算、アブラムシ類及びハダニ類は上位葉1枚調査）調査日：令和7年8月13、15日

調査場所		汚斑病		モザイク病	アブラムシ類			ハスモンヨトウ		ハダニ類	
		発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	寄生虫数(／10株)			寄生株率 (%)	幼虫数 (／10株)	虫数 (／10株)	寄生株率 (%)
					有翅	無翅	計				
京田辺市		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	8.0	0.0
久美浜町		8.0	1.3	8.0	0.0	7.6	7.6	16.0	0.4	4.0	275.5
平 均	R 7 年	4.0	0.7	4.0	0.0	3.8	3.8	8.0	2.8	6.0	137.8
	平年比	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平 年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	R 6 年	28.0	4.7	0.0	0.00	1.40	1.4	2.0	2.2	2.0	206.4
	R 5 年	2.0	0.4	4.0	0.40	0.00	0.4	4.0	19.0	24.0	97.6
	R 4 年										
	R 3 年										
	R 2 年										
	R 元年										
	H 3 0 年										
発 生 ほ場率 (%)	H 2 9 年										
	H 2 8 年										
	H 2 7 年										
	R 7 年	50.0		50.0	50.0			100.0		50.0	
	平年比	—		—	—			—		—	
	平 年	—		—	—			—		—	
	R 6 年	50.0		0.0	50.0			50.0		100.0	
	R 5 年	50.0		50.0	50.0			100.0		50.0	
	R 4 年										
	R 3 年										

汚斑病発病程度

発病度＝ $\frac{6A+4B+2C+D}{6 \times \text{調査葉数}} \times 100$

A：病斑面積が4分の3以上である。
B：病斑面積が2分の1～4分の3である。
C：病斑面積が4分の1～2分の1である。
D：病斑面積が4分の1以下である。
E：病斑が認められない。

ハスモンヨトウ被害程度

(発生程度別基準)

程度	無	少	中	多	甚
食害面積率 (%)	0	1～10	11～25	26～50	51以上