

# エビイモ

## 病害虫発生状況

- 1

汚斑病

2地点とも発生を認めた。
- 2

モザイク病

発生を認めなかった。
- 3

アブラムシ類

久美浜町で発生を認めた。
- 4

ハスモンヨトウ

2地点とも発生を認めた。
- 5

ハダニ類

発生を認めなかった。
- 6

その他の病害虫

発生を認めなかった。

エビイモ調査結果（25株調査：虫数は10株換算、アブラムシ類及びハダニ類は中位葉1枚調査） 調査日：令和7年9月16、17日

| 調査場所              |         | 汚斑病         |      | モザイク病       | アブラムシ類     |      |      | ハスモンヨトウ     |                  | ハダニ類        |              |             |
|-------------------|---------|-------------|------|-------------|------------|------|------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                   |         | 発病株率<br>(%) | 発病度  | 発病株率<br>(%) | 寄生虫数(／10株) |      |      | 寄生株率<br>(%) | 卵塊・幼虫数<br>(／10株) | 寄生株率<br>(%) | 虫数<br>(／10株) | 寄生株率<br>(%) |
|                   |         |             |      |             | 有翅         | 無翅   | 計    |             |                  |             |              |             |
| 京田辺市              |         | 4.0         | 0.7  | 0.0         | 0.0        | 0.0  | 0.0  | 0.0         | 4.8              | 28.0        | 0.0          | 0.0         |
| 京丹後市久美浜町          |         | 100.0       | 16.7 | 0.0         | 0.0        | 22.0 | 22.0 | 12.0        | 2.4              | 12.0        | 0.0          | 0.0         |
| 平 均               | R 7 年   | 52.0        | 8.7  | 0.0         | 0.0        | 11.0 | 11.0 | 6.0         | 3.6              | 20.0        | 0.0          | 0.0         |
|                   | 平年比     | —           | —    | —           | —          | —    | —    | —           | —                | —           | —            | —           |
|                   | 平年      | —           | —    | —           | —          | —    | —    | —           | —                | —           | —            | —           |
|                   | R 6 年   | 54.0        | 9.0  | 0.0         | 0.00       | 4.00 | 4.0  | 2.0         | 20.8             | 4.0         | 24.2         | 8.0         |
|                   | R 5 年   | 50.0        | 9.4  | 2.0         | 0.00       | 0.78 | 0.8  | 8.0         | 22.2             | 14.0        | 8.0          | 4.0         |
|                   | R 4 年   |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | R 3 年   |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | R 2 年   |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | R 元年    |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | H 3 0 年 |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
| 発 生<br>ほ場率<br>(%) | H 2 9 年 |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | H 2 8 年 |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | H 2 7 年 |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | R 7 年   | 100.0       |      | 0.0         | 50.0       |      |      |             | 100.0            |             | 0.0          |             |
|                   | 平年比     | —           |      | —           | —          |      |      |             | —                |             | —            |             |
|                   | 平年      | —           |      | —           | —          |      |      |             | —                |             | —            |             |
|                   | R 6 年   | 50.0        |      | 0.0         | 50.0       |      |      |             | 50.0             |             | 50.0         |             |
|                   | R 5 年   | 50.0        |      | 50.0        | 50.0       |      |      |             | 50.0             |             | 50.0         |             |
|                   | R 4 年   |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
|                   | R 3 年   |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
| R 2 年             |         |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
| R 元年              |         |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
| H 3 0 年           |         |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
| H 2 9 年           |         |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
| H 2 8 年           |         |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |
| H 2 7 年           |         |             |      |             |            |      |      |             |                  |             |              |             |

### 汚斑病発病程度

発病度＝ $\frac{6A+4B+2C+D}{6 \times \text{調査葉数}}$  × 100

- A：病斑面積が4分の3以上である。
- B：病斑面積が2分の1～4分の3である。
- C：病斑面積が4分の1～2分の1である。
- D：病斑面積が4分の1以下である。
- E：病斑が認められない。

### ハスモンヨトウ被害程度

(発生程度別基準)

| 程度       | 無 | 少    | 中     | 多     | 甚    |
|----------|---|------|-------|-------|------|
| 食害面積率(%) | 0 | 1～10 | 11～25 | 26～50 | 51以上 |