

エビイモ

病害虫発生状況

- 1

汚斑病

2

モザイク病

3

アブラムシ類

4

ハスモンヨトウ

5

ハダニ類

6

その他の病害虫
- 2

地点とも発生を認めた。

1

一部のほ場で発生を認めた。

1

一部のほ場で発生を認めた。

2

2地点とも発生を認めた。

1

一部のほ場で発生を認めた。虫種はカンザワハダニ。

1

発生を認めなかった。

エビイモ調査結果（２５株調査：虫数は１０株換算、アブラムシ類及びハダニ類は中位葉１枚調査）調査日：令和７年１０月１５、１６日

調査場所		汚斑病		モザイク病 発病株率 (%)	アブラムシ類			ハスモンヨトウ		ハダニ類		
		発病株率 (%)	発病度		寄生虫数(／10株)			寄生株率 (%)	卵塊・幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	虫数 (／10株)	寄生株率 (%)
					有翅	無翅	計					
京田辺市		92.0	15.3	0.0	2.0	0.0	2.0	8.0	0.4	4.0	210.0	48.0
京丹後市久美浜町		100.0	16.7	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	28.0	0.0	0.0
平 均	R 7 年	96.0	16.0	4.0	1.0	0.0	1.0	4.0	1.6	16.0	105.0	24.0
	平年比	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平 年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	R 6 年	100.0	21.3	0.0	0.20	6.40	6.6	12.0	22.8	30.0	14.4	8.0
	R 5 年	100.0	38.0	0.0	0.00	7.40	7.4	10.0	0.0	0.0	4.6	8.0
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												
H 2 7 年												
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	100.0		50.0	50.0			100.0		50.0		
	平年比	—		—	—			—		—		
	平 年	—		—	—			—		—		
	R 6 年	100.0		0.0	50.0			100.0		50.0		
	R 5 年	100.0		0.0	50.0			0.0		50.0		
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												
H 2 7 年												

汚斑病発病程度

$$\text{発病度} = \frac{6A + 4B + 2C + D}{6 \times \text{調査葉数}} \times 100$$

A：病斑面積が4分の3以上である。
B：病斑面積が2分の1～4分の3である。
C：病斑面積が4分の1～2分の1である。
D：病斑面積が4分の1以下である。
E：病斑が認められない。

ハスモンヨトウ被害程度

(発生程度別基準)

程度	無	少	中	多	甚
食害面積率 (%)	0	1～10	11～25	26～50	51以上