

エビイモ

病害虫発生状況

- 1

汚斑病

久美浜町で発生を認めた。
- 2

モザイク病

発生を認めなかった。
- 3

アブラムシ類

2地点とも発生を認めた。
- 4

ハスモンヨトウ

久美浜町で発生を認めた。
- 5

ハダニ類

2地点とも発生を認めた。
- 6

その他の病害虫

発生を認めなかった。

エビイモ調査結果（２５株調査：虫数は１０株換算、アブラムシ類及びハダニ類は中位葉１枚調査）調査日：令和８年９月１４、１５日

調査場所		汚斑病		モザイク病	アブラムシ類			ハスモンヨトウ		ハダニ類		
		発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	寄生虫数(／10株)		寄生株率 (%)	卵塊・幼虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	
					有翅	無翅						計
京田辺市		0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	2.8	8.0
久美浜町		16.0	2.7	0.0	0.0	20.4	20.4	32.0	0.4	4.0	23.2	12.0
平 均	R 8 年	8.0	1.4	0.0	0.2	10.2	10.4	18.0	0.2	2.0	13.0	10.0
	平年比	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	R 7 年	52.0	8.7	0.0	0.00	11.00	11.0	6.0	3.6	20.0	0.0	0.0
	R 6 年	54.0	9.0	0.0	0.00	4.00	4.0	2.0	20.8	4.0	24.2	8.0
	R 5 年	50.0	9.4	2.0	0.00	0.78	0.8	8.0	22.2	14.0	8.0	4.0
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												
発 生 ほ場率 (%)	R 8 年	50.0		0.0	100.0			50.0		100.0		
	平年比	—		—	—			—		—		
	平年	—		—	—			—		—		
	R 7 年	100.0		0.0	50.0			100.0		0.0		
	R 6 年	50.0		0.0	50.0			50.0		50.0		
	R 5 年	50.0		50.0	50.0			50.0		50.0		
	R 4 年											
	R 3 年											
	R 2 年											
	R 元年											
	H 3 0 年											
H 2 9 年												
H 2 8 年												

汚斑病発病程度

発病度＝ $\frac{6A+4B+2C+D}{6 \times \text{調査葉数}}$ × 100

- A：病斑面積が４分の３以上である。
- B：病斑面積が２分の１～４分の３である。
- C：病斑面積が４分の１～２分の１である。
- D：病斑面積が４分の１以下である。
- E：病斑が認められない。

ハスモンヨトウ被害程度

（発生程度別基準）

程度	無	少	中	多	甚
食害面積率（％）	0	1～10	11～25	26～50	51以上