エビイモ

病害虫発生状況

１　汚斑病 ・・・・・・・・・・・・・・　２地点とも発生を認めた。
２　モザイク病 ・・・・・・・・・・・・　発生を認めなかった。
３　アブラムシ類 ・・・・・・・・・・・　２地点とも発生を認めた。
４　ハスモンヨトウ ・・・・・・・・・・　２地点とも発生を認めた。
５　ハダニ類 ・・・・・・・・・・・・・　発生を認めなかった。
６　その他の病害虫 ・・・・・・・・・・　発生を認めなかった。

エビイモ調査結果（２５株調査：虫数は１０株換算、アブラムシ類及びハダニ類は中位葉１枚調査）

調査日：令和８年１０月１４、１５日

調査場所		汚斑病		モザイク病	アブラムシ類				ハスモンヨトウ		ハダニ類	
		発病株率（%）	発病度	発病株率（%）	寄生虫数（／10株）			寄生株率（%）	卵塊・幼虫数（／10株）	寄生株率（%）	虫数（／10株）	寄生株率（%）
					有翅	無翅	計					
京田辺市		8.0	1.3	0.0	0.4	0.4	0.8	8.0	0.8	4.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町		32.0	8.0	0.0	0.0	4.8	4.8	20.0	3.2	16.0	0.0	0.0
平　均	Ｒ８年	20.0	4.7	0.0	0.2	2.6	2.8	14.0	2.0	10.0	0.0	0.0
	平年比	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Ｒ７年	96.0	16.0	4.0	1.00	0.00	1.0	4.0	1.6	16.0	105.0	24.0
	Ｒ６年	100.0	21.3	0.0	0.20	6.40	6.6	12.0	22.8	30.0	14.4	8.0
	Ｒ５年	100.0	38.0	0.0	0.00	7.40	7.4	10.0	0.0	0.0	4.6	8.0
	Ｒ４年											
	Ｒ３年											
	Ｒ２年											
	Ｒ元年											
	Ｈ３０年											
	Ｈ２９年											
	Ｈ２８年											
発　生 ほ場率 （%）	Ｒ８年	100.0		0.0	100.0				100.0		0.0	
	平年比	－		－	－				－		－	
	平年	－		－	－				－		－	
	Ｒ７年	100.0		50.0	50.0				100.0		50.0	
	Ｒ６年	100.0		0.0	50.0				100.0		50.0	
	Ｒ５年	100.0		0.0	50.0				0.0		50.0	
	Ｒ４年											
	Ｒ３年											
	Ｒ２年											
	Ｒ元年											
	Ｈ３０年											
	Ｈ２９年											
	Ｈ２８年											

汚斑病発病程度

$$発病度＝\frac{６Ａ＋４Ｂ+２Ｃ+Ｄ}{６×調査株数}\times 100$$

Ａ：病斑面積が４分の３以上である。
Ｂ：病斑面積が２分の１～４分の３である。
Ｃ：病斑面積が４分の１～２分の１である。
Ｄ：病斑面積が４分の１以下である。
Ｅ：病斑が認められない。