

イネ

病害虫の発生状況

- (1)葉いもち
山城及び南丹で、確認ほ場率が平年比やや多いが、府全体では平年並の発生（表1）。
- (2)穂いもち
発生を認めず、南丹では平年比やや少なく、山城、中丹及び丹後で平年並。府全体では平年比やや少ない（表2）。
- (3)紋枯病
山城及び丹後で発生を認めず平年比少なく～やや少なく、南丹で平年比やや少なく、**中丹で平年比やや多い発生**。府全体では平年比少ない発生（表3）。
- (4)白葉枯病
発生を認めなかった（表13）。
- (5)縞葉枯病
発生を認めなかった（表13）。
- (6)ばか苗病
発生を認めなかった。
- (7)ツマグロヨコバイ
本田見取り調査では平年並の発生で、本田すくい取り調査では平年比やや少ない発生（表4～5）。
- (8)セジロウンカ
本田見取り調査で平年比やや少なく、本田すくい取り調査で平年比少ない発生（表6～7）。
予察灯の初飛来は京田辺市（7月15日）で平年並、亀岡市（7月31日）及び京丹後市（8月7日）では平年比遅い。
- (9)トビイロウンカ
本田見取り調査では発生を認めていない（平年並）（表8）。
予察灯調査では、8月13日現在、誘殺を認めていない。
- (10)ニカメイガ
本田見取り調査では少ない発生（表15）。
- (11)コブノメイガ
本田見取り調査では、発生を認めていない（平年並）（表11）。
- (12)斑点米カメムシ類
本田すくい取り調査では、山城及び中丹で平年並み、**南丹で平年比多く、丹後で平年比やや多い発生。府全体では平年比多い発生**。畦畔すくい取り調査で、府全体で平年並の発生（表9～10）。
- (13)スクミリンゴガイ
山城及び南丹の一部ほ場で発生を認めた（表15）。
- (14)その他
コバネイナゴ及びササキリの発生を広域で認めた（表17～18）。

発病・発生程度別基準

		無	少	中	多	甚
葉いもち	発病度	0	1～20	21～40	41～70	71以上
穂いもち	発病穂率	0	1～10	11～30	31～60	61以上
紋枯病	発病度	0	1～20	21～40	41～70	71以上
セジロウンカ	25株当たり虫数	0	1～250	～1250	～2500	2501以上
	すくい取り虫数	0	1～100	101～300	301～700	701以上
ヒメトビウンカ	25株当たり虫数	0	1～50	～125	～250	251以上
	すくい取り虫数	0	1～10	11～30	31～100	101以上
ツマグロヨコバイ	25株当たり虫数	0	1～125	～375	～750	751以上
	すくい取り虫数	0	1～50	51～750	751～1500	1501以上
斑点米カメムシ類	すくい取り虫数（本田）	0	1～3	4～10	11～30	31以上
イネクロカメムシ	25株当たり虫数	0	1～5	6～10	11～25	25以上
ニカメイガ	被害株率	0	1～30	31～60	61～90	91以上
イネツトムシ	25株当たり幼虫数	0	1～10	11～20	21～40	41以上
フタオビコヤガ	25株当たり幼虫数	0	1～25	26～100	101～250	251以上
コブノメイガ	被害葉率	0	1～5	6～15	16～45	46以上

表1 葉いもち調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*
R 7	66.7	5.5	0.30	50.0	0.8	0.03	33.3	0.2	0.00	11.1	0.1	0.03	36.7	1.4	0.08
平年比	やや多	並	並	やや多	少	やや少	並	やや少	並	並	並	並	並	やや少	並
	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
平年	35.0	6.7	0.28	34.6	7.2	0.34	31.7	3.8	0.25	33.3	4.6	0.22	33.5	5.7	0.27
R 6	16.7	4.7	0.20	12.5	2.0	0.10	83.3	8.0	0.41	66.7	7.6	0.37	41.4	5.3	0.26
R 5	50.0	18.0	0.95	77.8	20.0	1.17	83.3	10.7	0.45	44.4	7.1	0.67	63.3	13.9	0.83
R 4	33.3	8.0	0.60	44.4	10.2	0.41	16.7	0.7	0.03	0.0	0.0	0.00	23.3	4.8	0.25
R 3	83.3	21.3	1.01	66.7	17.3	1.35	33.3	14.7	0.59	33.3	5.8	0.61	53.3	14.1	0.91
R 2	83.3	10.7	0.00	44.4	7.6	0.00	33.3	0.7	0.00	88.9	16.0	0.19	63.3	9.7	0.06
R 1	0.0	0.0	0.00	11.1	0.4	0.11	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	3.3	0.1	0.03
H30	16.7	0.0	0.00	44.4	7.6	0.20	16.7	0.0	0.00	55.6	5.3	0.25	36.7	3.9	0.13
H29	16.7	0.7	0.00	11.1	2.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.9	0.00
H28	50.0	3.3	0.04	22.2	2.7	0.06	16.7	1.3	0.01	44.4	4.4	0.08	33.3	3.1	0.05
H27	0.0	0.0	0.00	11.1	1.8	0.00	33.3	2.0	1.00	0.0	0.0	0.00	10.0	0.9	0.20

※詳細は表12参照。 * 発病葉率は上位2葉調査

表2 穂いもち調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率
R 7	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
平年比	並	並	並	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並	並	少	やや少	やや少
	並	並	並	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並	並	やや少	やや少	やや少
平年	10.0	0.4	0.02	21.1	2.4	0.17	15.0	1.1	0.13	7.8	0.4	0.04	14.0	1.2	0.10
R 6	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	33.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	7.7	0.0	0.00
R 5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	33.3	3.3	0.87	0.0	0.4	0.11	11.5	0.9	0.24
R 4	0.0	0.0	0.00	22.2	0.9	0.05	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	7.7	0.3	0.02
R 3	0.0	0.0	0.00	11.1	4.9	0.47	0.0	0.0	0.00	33.3	1.8	0.18	14.8	2.2	0.22
R 2	0.0	0.0	0.00	33.3	1.8	0.22	16.7	0.7	0.03	22.2	0.9	0.04	20.0	0.9	0.08
R 1	0.0	0.0	0.00	22.2	0.9	0.03	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.3	0.01
H30	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
H29	0.0	0.0	0.00	77.8	10.4	0.62	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	28.0	3.8	0.22
H28	100.0	4.0	0.20	33.3	3.6	0.23	66.7	7.3	0.41	22.2	0.9	0.07	40.0	3.5	0.21
H27	0.0	0.0	0.00	11.1	1.3	0.07	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	4.0	0.5	0.03

※詳細は表12参照。

表3 紋枯病調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度
R 7	0.0	0.0	0.0	25.0	2.7	0.7	50.0	4.7	1.7	0.0	0.0	0.0	17.2	1.7	0.5
平年比	やや少	やや少	やや少	並	やや少	少	やや多	やや多	やや多	少	少	少	やや少	少	少
	やや少	やや少	やや少	並	やや少	少	やや多	やや多	やや多	少	少	少	やや少	少	少
平年	35.0	7.1	2.0	39.0	6.6	1.9	31.7	4.7	1.2	16.7	1.6	0.5	30.0	4.8	1.3
R 6	0.0	0.0	0.0	12.5	2.5	1.3	16.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	6.9	0.8	0.4
R 5	0.0	0.0	0.0	33.3	9.3	2.8	16.7	1.3	0.3	11.1	0.4	0.1	16.7	3.2	0.9
R 4	50.0	5.3	1.3	44.4	7.7	2.2	33.3	1.3	0.3	11.1	1.3	0.3	33.3	4.0	1.1
R 3	33.3	6.0	1.5	22.2	5.8	1.7	16.7	1.3	0.3	22.2	3.6	0.9	23.3	4.3	1.1
R 2	50.0	14.7	3.7	22.2	11.1	3.1	33.3	3.3	0.8	33.3	3.1	1.0	33.3	7.9	2.1
R 1	33.3	5.3	1.3	44.4	10.2	2.6	66.7	14.7	3.7	11.1	2.7	0.7	36.7	7.9	2.0
H30	16.7	4.7	1.2	77.8	6.7	1.6	33.3	6.0	1.5	11.1	0.9	0.2	36.7	4.4	1.1
H29	66.7	15.3	4.0	66.7	4.4	1.3	50.0	16.0	4.0	11.1	1.3	0.3	46.7	8.0	2.1
H28	66.7	14.7	5.2	22.2	1.3	0.4	50.0	2.0	0.5	11.1	0.4	0.2	33.3	3.9	1.3
H27	33.3	5.3	2.2	44.4	7.1	2.0	0.0	0.0	0.0	44.4	2.7	0.9	33.3	4.0	1.3

※詳細は表13参照。

表4 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 7	50.0	1.5	11.1	0.1	50.0	0.7	0.0	0.0	20.0	0.5
平年比	並	やや少	並	並	多	並	並	並	並	やや少
	やや少		並		やや多		並		並	
平年	61.1	15.4	12.2	0.2	26.7	0.8	15.6	0.7	25.4	3.5
R 6	33.3	0.8	0.0	0.0	33.3	0.7	0.0	0.0	13.8	0.3
R 5	16.7	3.0	0.0	0.0	16.7	0.2	33.3	0.4	16.7	0.8
R 4	50.0	0.8	11.1	0.7	16.7	0.7	0.0	0.0	16.7	0.5
R 3	50.0	1.5	11.1	0.1	33.3	1.0	11.1	0.1	23.3	0.6
R 2	66.7	9.7	11.1	0.4	50.0	1.8	11.1	0.1	30.0	2.5
R 1	66.7	6.2	22.2	0.3	33.3	1.0	0.0	0.0	26.7	1.5
H30	100.0	32.8	22.2	0.2	33.3	0.7	0.0	0.0	33.3	6.8
H29	50.0	8.3	11.1	0.4	0.0	0.0	33.3	0.7	23.3	2.0
H28	66.7	22.2	22.2	0.2	33.3	1.0	44.4	5.7	40.0	6.4
H27	83.3	68.5	11.1	0.1	16.7	0.5	22.2	0.2	30.0	13.9

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表5 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 7	50.0	0.8	11.1	0.9	16.7	0.8	0.0	0.0	16.7	0.6
平年比	やや少	やや少	並	並	並	やや少	やや少	やや少	やや少	少
	やや少		並		やや少		やや少		やや少	
平年	66.7	31.8	10.0	2.0	28.3	5.1	21.1	3.2	28.4	8.9
R 6	66.7	2.8	0.0	0.0	16.7	14.5	11.1	0.3	20.7	3.6
R 5	66.7	1.2	11.1	0.1	33.3	0.3	11.1	4.1	26.7	1.6
R 4	83.3	6.3	11.1	3.6	16.7	0.5	0.0	0.0	23.3	2.4
R 3	33.3	0.3	0.0	0.0	33.3	0.8	0.0	0.0	13.3	0.2
R 2	66.7	34.7	11.1	13.3	16.7	2.8	0.0	0.0	20.0	11.5
R 1	66.7	1.0	11.1	0.1	16.7	9.2	44.4	4.9	33.3	3.5
H30	50.0	148.7	11.1	0.3	33.3	1.2	33.3	0.8	30.0	30.3
H29	83.3	44.2	0.0	0.0	33.3	1.2	33.3	6.1	33.3	10.9
H28	66.7	49.8	22.2	2.7	50.0	11.5	44.4	10.7	43.3	16.3
H27	83.3	28.8	22.2	0.3	33.3	9.2	33.3	4.8	40.0	9.1

※詳細は表16参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表6 セジロウンカ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 7	33.3	0.7	44.4	1.1	50.0	0.7	0.0	0.0	30.0	0.6
平年比	少	少	並	並	並	少	少	少	やや少	少
	少		並		やや少		少		やや少	
平年	70.0	32.7	41.5	2.2	66.7	2.9	40.0	2.2	52.8	8.6
R 6	50.0	16.0	37.5	1.3	50.0	1.3	33.3	2.8	51.7	6.0
R 5	66.7	18.8	11.1	0.1	33.3	0.7	33.3	0.9	33.3	4.2
R 4	33.3	5.3	11.1	0.1	66.7	1.3	0.0	0.0	23.3	1.4
R 3	66.7	41.7	33.3	0.8	50.0	1.8	11.1	0.1	36.7	9.0
R 2	66.7	137.2	33.3	3.7	83.3	4.5	11.1	0.1	43.3	29.5
R 1	66.7	10.0	88.9	3.8	66.7	2.2	88.9	7.2	80.0	5.7
H30	83.3	4.0	33.3	0.9	66.7	1.5	44.4	1.2	53.3	1.7
H29	66.7	21.2	22.2	0.4	100.0	4.5	55.6	1.2	56.7	5.6
H28	100.0	19.3	88.9	8.3	100.0	8.7	88.9	7.0	93.3	10.2
H27	100.0	53.7	55.6	2.2	50.0	2.2	33.3	1.7	56.7	12.3

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表7 セジロウンカ調査結果（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 7	16.7	0.7	11.1	0.2	16.7	1.3	22.2	1.7	16.7	1.0
平年比	少	やや少	やや少	少	やや少	並	やや少	やや少	少	少
	少		少		やや少		やや少		少	
平年	51.7	13.2	47.6	7.2	58.3	10.9	66.7	14.1	54.5	11.2
R 6	50.0	7.3	87.5	10.0	50.0	3.3	55.6	1.8	44.8	5.3
R 5	50.0	1.7	55.6	5.7	33.3	2.0	44.4	3.1	46.7	3.4
R 4	16.7	0.5	22.2	0.8	66.7	1.7	0.0	0.0	23.3	0.7
R 3	50.0	7.2	33.3	1.9	16.7	0.2	22.2	0.6	30.0	2.2
R 2	66.7	67.8	33.3	2.6	83.3	11.0	77.8	13.4	63.3	20.6
R 1	33.3	0.8	0.0	0.0	16.7	0.8	88.9	21.6	36.7	6.8
H30	33.3	18.0	33.3	4.9	100.0	22.7	88.9	6.8	63.3	11.6
H29	33.3	2.8	11.1	0.6	100.0	27.7	100.0	22.9	60.0	13.1
H28	100.0	16.2	100.0	24.9	100.0	38.5	100.0	37.3	100.0	29.6
H27	83.3	9.8	100.0	20.9	16.7	0.8	88.9	33.7	76.7	18.5

※詳細は表16参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表8 トビイロウンカ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	並		並		並		並		並	
平年	3.3	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.01
R 6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 2	33.3	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.10
R 1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
H30	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
H29	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
H28	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
H27	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表9 斑点米カメムシ類調査結果（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 7	33.3	0.5	88.9	7.9	66.7	3.7	66.7	7.2	66.7	5.4
平年比	並	並	多	多	並	並	並	多	多	多
	並		多		並		やや多		多	
平年	25.0	1.1	47.1	2.6	58.3	2.9	57.8	2.2	48.2	2.2
R 6	16.7	0.3	37.5	3.1	83.3	5.3	77.8	6.7	55.2	4.0
R 5	33.3	0.5	22.2	0.7	50.0	4.0	77.8	4.0	46.7	2.3
R 4	33.3	3.7	44.4	1.6	83.3	1.5	44.4	1.9	50.0	2.1
R 3	33.3	1.3	66.7	2.3	66.7	1.7	55.6	1.2	56.7	1.7
R 2	0.0	0.0	66.7	9.4	50.0	5.3	22.2	0.3	36.7	4.0
R 1	16.7	0.2	11.1	0.1	50.0	1.7	66.7	4.2	36.7	1.7
H30	16.7	0.8	44.4	1.3	66.7	2.3	44.4	0.9	43.3	1.3
H29	33.3	2.5	55.6	0.8	66.7	5.0	77.8	1.1	60.0	2.1
H28	66.7	1.5	66.7	2.3	33.3	1.3	44.4	0.9	53.3	1.5
H27	0.0	0.0	55.6	4.0	33.3	1.0	66.7	1.2	43.3	1.8

※詳細は表17参照。 * 虫数は、1調査当たりの平均値

表10 斑点米カメムシ類調査結果（8月第3～4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 7	66.7	1.3	33.3	1.1	0.0	0.0	55.6	2.3	40.0	1.3
平年比	並	少	並	並	少	少	やや多	並	並	やや少
	やや少		並		少		並		並	
平年	66.7	9.9	28.2	1.1	33.3	1.8	36.7	2.2	39.5	3.3
R 6	50.0	6.5	37.5	1.5	50.0	6.3	55.6	5.1	48.3	4.5
R 5	83.3	2.2	11.1	0.1	0.0	0.0	55.6	1.2	36.7	0.8
R 4	66.7	6.2	33.3	0.9	50.0	1.3	22.2	0.2	40.0	1.8
R 3	66.7	4.7	11.1	0.1	16.7	0.5	22.2	0.2	26.7	1.1
R 2	50.0	21.0	44.4	1.6	50.0	4.3	44.4	6.1	46.7	7.4
R 1	50.0	15.0	22.2	0.4	50.0	1.3	55.6	5.3	43.3	5.0
H30	100.0	22.7	22.2	0.4	33.3	0.8	33.3	1.4	43.3	5.3
H29	83.3	13.3	33.3	0.6	33.3	1.3	33.3	1.3	43.3	3.5
H28	66.7	6.8	33.3	3.9	16.7	0.7	33.3	1.0	36.7	3.0
H27	50.0	1.0	33.3	1.6	33.3	1.2	11.1	0.1	30.0	0.9

※詳細は表18参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表11 コブノメイガ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率
R 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	並		並		並		並		並	
平年	28.3	2.8	11.1	0.9	5.0	0.4	6.7	0.1	12.0	0.9
R 6	50.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.4	13.8	0.8
R 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 3	16.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.1
R 2	100.0	23.3	44.4	8.4	33.3	4.0	22.2	0.4	46.7	8.1
R 1	66.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	23.3	0.0
H30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H28	33.3	0.7	33.3	0.0	16.7	0.0	22.2	0.0	26.7	0.1
H27	16.7	0.0	11.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.3

※詳細は表15参照。 * 上位2葉調査

表12 水稻巡回調査結果①（8月第3～4半旬：25株見取り調査）

地 点		葉いもち				穂いもち				備 考	
		発病 株率	発病 度	程 度	上位葉 発病 葉率	発病 株率	発病穂数		発病 穂率		程 度
							a	b			
京都市西京区		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京都市伏見区		68.0	17	少	1.65	0.0	0	0	0.00	無	
久御山町		0.0	0	無	0.00	－	－	－	－		出穂前
八幡市		4.0	1	少	0.00	－	－	－	－		出穂前
精華町		12.0	3	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
木津川市		48.0	12	少	0.17	0.0	0	0	0.00	無	
山城平均	7 年	22.0	5.5	少	0.30	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	6 年	4.7	1.2	少	0.20	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
亀岡市 1		4.0	1	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
亀岡市 2		16.0	4	少	0.13	0.0	0	0	0.00	無	
京都市京北		8.0	2	少	0.11	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市美山町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市園部町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市八木町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	番外で葉いもち
京丹波町 1		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 2		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 3		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
南丹平均	7 年	3.1	0.8	少	0.03	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	6 年	2.0	0.5	少	0.10	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
綾部市		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市長田		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	番外で葉いもち
福知山市半田		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市夜久野町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市大江町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
舞鶴市		4.0	1	少	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
中丹平均	7 年	0.7	0.2	少	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	6 年	8.0	2.7	少	0.41	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
宮津市		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
与謝野町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
伊根町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市峰山町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市大宮町		4.0	1	少	0.26	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市網野町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市丹後町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市弥栄町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市久美浜町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
丹後平均	R7	0.4	0.1	少	0.03	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	R6	7.6	2.0	少	0.37	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
府平均	R7	5.6	1.4	少	0.08	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	R6	5.3	1.5	少	0.26	0.0	0.0	0.0	0.00	無	

* 発病穂数

a：穂首部が罹病して白穂、またはかなりの不稔

b：穂首部以外で一次枝梗以上が侵され、枯死

表13 水稻巡回調査結果②（8月第3～4半旬：25株見取り調査）

地 点		紋枯病							白葉枯病			縞葉枯病			その他
		発病 株率	発病程度				発病 度	程度	発病 株率	発病 度	程度	発病 株率	発病 度	程度	
			A	B	C	D									
京都市西京区		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京都市伏見区		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
久御山町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
八幡市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
精華町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
木津川市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
山城平均	7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
亀岡市 1		12.0	0	0	0	3	3	少	0.0	0	無	0.0	0	無	
亀岡市 2		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	ごま葉枯病
京都市京北		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹市美山町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹市園部町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹市八木町		12.0	0	0	0	3	3	少	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹波町 1		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹波町 2		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹波町 3		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹平均	7 年	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	6 年	2.5	0.0	0.0	0.6	0.0	1.3	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
綾部市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
福知山市長田		4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無	
福知山市半田		4.0	1	0	0	0	4	少	0.0	0	無	0.0	0	無	
福知山市夜久野町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
福知山市大江町		20.0	0	0	0	5	5	少	0.0	0	無	0.0	0	無	
舞鶴市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
中丹平均	7 年	4.7	0.2	0.0	0.0	1.0	1.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	6 年	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
宮津市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
与謝野町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	ごま葉枯病
伊根町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市峰山町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市大宮町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	ごま葉枯病
京丹後市網野町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市丹後町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市弥栄町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市久美浜町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
丹後平均	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
府平均	R7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R6	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	

表14 水稻巡回調査結果③（8月第3～4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

地 点		ツマグロヨコバイ					ヒメトビウンカ					セジロウンカ					トビイロウンカ					
		寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫		幼虫	計	程度
																		長翅	短翅			
京都市西京区		0.0	0	0	0	無	28.0	1	6	7	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京都市伏見区		12.0	1	4	5	少	0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無
久御山町		4.0	0	1	1	少	16.0	0	6	6	少	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無
八幡市		0.0	0	0	0	無	28.0	0	11	11	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
精華町		12.0	3	0	3	少	16.0	5	2	7	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
木津川市		0.0	0	0	0	無	28.0	1	12	13	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
山城平均	7年	4.7	0.7	0.8	1.5	少	19.3	1.2	6.2	7.3	少	2.7	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	6年	2.0	0.2	0.7	0.8	少	4.0	0.0	1.0	1.0	少	27.3	7.2	8.8	16.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市 1		0.0	0	0	0	無	24.0	2	8	10	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
亀岡市 2		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京都市京北		0.0	0	0	0	無	16.0	1	7	8	少	12.0	1	2	3	少	0.0	0	0	0	0	無
南丹市美山町		4.0	1	0	1	少	16.0	1	5	6	少	4.0	1	0	1	少	0.0	0	0	0	0	無
南丹市園部町		0.0	0	0	0	無	12.0	1	4	5	少	16.0	0	6	6	少	0.0	0	0	0	0	無
南丹市八木町		0.0	0	0	0	無	24.0	3	7	10	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹波町 1		0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	4.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹波町 2		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹波町 3		0.0	0	0	0	無	16.0	0	4	4	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
南丹平均	7年	0.4	0.1	0.0	0.1	少	12.9	0.9	4.1	5.0	少	4.0	0.2	0.9	1.1	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	6年	0.0	0.0	0.0	0.0	無	1.0	0.0	0.3	0.3	少	4.0	0.0	1.3	1.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市		0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無
福知山市長田		12.0	1	2	3	少	28.0	1	9	10	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無
福知山市半田		40.0	0	0	0	無	48.0	0	12	12	少	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無
福知山市夜久野町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
福知山市大江町		0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
舞鶴市		4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
中丹平均	7年	9.3	0.2	0.5	0.7	少	15.3	0.2	4.2	4.3	少	2.7	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	6年	1.3	0.5	0.2	0.7	少	14.7	3.5	1.3	4.8	少	10.7	4.7	3.7	8.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
与謝野町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
伊根町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市峰山町		0.0	0	0	0	無	16.0	2	2	4	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市大宮町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市網野町		0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市丹後町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市弥栄町		0.0	0	0	0	無	8.0	2	1	3	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市久美浜町		0.0	0	0	0	無	12.0	1	2	3	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
丹後平均	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	無	4.4	0.6	0.7	1.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R6	0.0	0.0	0.0	0.0	無	1.8	0.6	0.0	0.6	少	8.4	0.9	1.9	2.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R7	2.9	0.2	0.3	0.5	少	12.1	0.7	3.5	4.2	少	2.3	0.1	0.5	0.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R6	0.7	0.1	0.2	0.3	少	4.5	0.9	0.5	1.4	少	11.2	2.6	3.4	6.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無

表15 水稲巡回調査結果④（8月第3～4半旬：25株見取り調査）

地 点		イネツトムシ				ニカメイガ		フタヒツシ		コブノメイガ				イネコハメシ		イネカメシ		スクミリンゴガイ		その他
		食害株率	ツト数	幼虫数	程度	被害株率	程度	幼虫数	程度	被害葉率	程度	被害株率	本田被害	虫数	程度	虫数	程度	25株卵塊数	周辺卵塊	
京都市西京区		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	3		
京都市伏見区		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0	○	
久御山町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
八幡市		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	1		
精華町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
木津川市		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0	○	
山城平均	7年	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.0	無	0.7	2/6	
	6年	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.16	少	3.3	3/6	0.0	無	0.3	少	0.5	3/6	
亀岡市 1		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	13		
亀岡市 2		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
京都市京北		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
南丹市美山町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		クモヘリ4
南丹市園部町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
南丹市八木町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0	○	番外に卵塊
京丹波町 1		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
京丹波町 2		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
京丹波町 3		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
南丹平均	7年	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/9	0.0	無	0.0	無	1.4	1/9	
	6年	0.0	0.0	0.0	無	0.5	少	0.0	無	0.00	無	0.0	0/8	0.0	無	0.3	少	0.0	1/8	
綾部市		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
福知山市長田		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
福知山市半田		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
福知山市夜久野町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
福知山市大江町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
舞鶴市		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
中丹平均	7年	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.0	無	0.0	0/6	
	6年	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	2.3	少	0.0	0/6	
宮津市		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
与謝野町		0.0	0	0	無	4.0	少	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
伊根町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		アカシ ¹ L1
京丹後市峰山町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
京丹後市大宮町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		クモヘリL1
京丹後市網野町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		ホソヘリL1
京丹後市丹後町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	少	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
京丹後市弥栄町		0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
京丹後市久美浜町		0.0	0	0	無	4.0	少	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	無	0		
丹後平均	R7	0.0	0.0	0.0	無	0.9	少	0.0	少	0.00	無	0.0	0/9	1.0	少	0.0	無	0.0	0/9	
	R6	0.0	0.0	0.0	無	2.2	少	0.1	少	0.02	無	0.4	1/9	1.0	少	0.3	少	0.0	0/9	
府平均	R7	0.0	0.0	0.0	無	0.3	少	0.0	無	0.00	無	0.0	0/30	0.0	無	0.0	無	0.57	3/30	
	R6	0.0	0.0	0.0	無	0.8	少	0.0	無	0.04	無	0.8	1/29	0.0	無	0.7	少	0.10	6/29	

表16 水稲巡回調査結果⑤（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点		ツマグロヨコバイ				ヒメトビウンカ				セジロウンカ				トビイロウンカ				
		成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫		幼虫	計	程度
														長翅	短翅			
京都市西京区		1	0	1	少	7	1	8	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京都市伏見区		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
久御山町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
八幡市		0	0	0	無	5	0	5	少	0	4	4	少	0	0	0	0	無
精華町		3	0	3	少	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
木津川市		1	0	1	少	0	3	3	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
山城平均	7年	0.8	0.0	0.8	少	2.0	0.7	2.7	少	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	6年	2.8	0.0	2.8	少	2.8	0.3	3.2	少	5.7	1.7	7.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市1		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
亀岡市2		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京都市京北		1	5	6	少	10	30	40	多	0	2	2	少	0	0	0	0	無
南丹市美山町		0	2	2	少	0	20	20	中	0	0	0	無	0	0	0	0	無
南丹市園部町		0	0	0	無	3	2	5	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
南丹市八木町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹波町1		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹波町2		0	0	0	無	1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹波町3		0	0	0	無	1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
南丹平均	7年	0.1	0.8	0.9	少	1.7	5.8	7.4	少	0.0	0.2	0.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	6年	0.0	0.0	0.0	少	0.8	0.6	1.4	少	4.0	6.0	10.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
福知山市長田		0	1	1	少	16	0	16	中	8	0	8	少	0	0	0	0	無
福知山市半田		2	2	4	少	2	0	2	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
福知山市夜久野町		0	0	0	無	2	0	2	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
福知山市大江町		0	0	0	無	17	0	17	中	0	0	0	無	0	0	0	0	無
舞鶴市		0	0	0	無	1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
中丹平均	7年	0.3	0.5	0.8	少	6.3	0.0	6.3	少	1.3	0.0	1.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	6年	2.2	12.3	14.5	少	0.5	2.2	2.7	少	2.0	1.3	3.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市		0	0	0	無	1	3	4	少	1	0	1	少	0	0	0	0	無
与謝野町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
伊根町		0	0	0	無	0	0	0	無	7	7	14	少	0	0	0	0	無
京丹後市峰山町		0	0	0	無	5	7	12	中	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市大宮町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市網野町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市丹後町		0	0	0	無	1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市弥栄町		0	0	0	無	7	10	17	中	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市久美浜町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
丹後平均	R7	0.0	0.0	0.0	無	1.6	2.2	3.8	少	0.9	0.8	1.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R6	0.3	0.0	0.3	無	0.2	0.1	0.3	少	0.6	1.2	1.8	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R7	0.3	0.3	0.6	少	2.6	2.5	5.2	少	0.5	0.4	1.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R6	1.1	2.5	3.6	少	0.9	0.7	1.6	少	2.8	2.6	5.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無

表17 水稲巡回調査結果⑥（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点		イネトミ				斑点米カメムシ類			その他カメムシ類		コハネ 付け	サ サ	その他
		幼虫	蛹	成虫	幼虫	種類	虫数	程度	種類	虫数			
京都市西京区		0	0	0	0	イネL1	1	少		0	0	0	
京都市伏見区		0	0	0	0		0	無		0	3	0	イネミS 1
久御山町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
八幡市		0	0	0	0		0	無		0	0	1	
精華町		0	0	0	0		0	無		0	0	1	
木津川市		0	0	0	0	ホソハリ2	2	少		0	0	1	
山城平均	7年	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5	少		0.0	0.5	0.5	
	6年	0.0	0.0	0.0	0.0		0.3	少		0.0	0.5	1.0	
亀岡市1		0	0	0	0		0	無		0	0	1	
亀岡市2		0	0	0	0	アカシジ 2	2	少		0	1	0	
京都市京北		0	0	0	0	アカシジ 2、クモヘリ4、アカヒゲ 1、 シラホシ1	8	中		0	7	12	
南丹市美山町		0	0	0	0	クモヘリ22、ホソハリ1、シラホシ4、 トゲシラホシ1	28	多		0	2	0	
南丹市園部町		0	0	0	0	アカシジ 2	2	少		0	0	2	
南丹市八木町		0	0	0	0	シラホシ1、アカヒゲ 1	2	少		0	0	2	
京丹波町1		0	0	0	0	イネA7L15、アカヒゲ 2、クモヘリ2	26	多		0	1	3	
京丹波町2		0	0	0	0	クモヘリA1	1	少		0	3	0	
京丹波町3		0	0	0	0	トゲシラホシ2	2	少		0	0	0	
南丹平均	7年	0.0	0.0	0.0	0.0		7.9	中		0.0	1.6	2.2	
	6年	0.0	0.0	0.0	0.0		3.1	少		0.0	1.4	0.3	
綾部市		0	0	0	0	イネA1	1	少		0	0	1	
福知山市長田		0	0	0	0		0	無		0	1	1	
福知山市半田		0	0	0	0	イネ1、クモヘリ2、アカヒゲ 2、アカシジ 2	7	中		0	0	4	
福知山市夜久野町		0	0	0	0		0	無		0	1	0	
福知山市大江町		0	0	0	0	イネA1	1	少		0	3	0	
舞鶴市		0	0	0	0	シラホシ8、アカヒゲ 2、アカシジ 2、クモヘリ1	13	多		0	0	7	
中丹平均	7年	0.0	0.0	0.0	0.0		3.7	少		0.0	0.8	2.2	
	6年	0.0	0.0	0.0	0.0		5.3	中		0.0	0.5	4.0	
宮津市		0	0	0	0		0	無		0	0	7	
与謝野町		0	0	0	0	イネA4L4、シラホシ3、ホソハリ7、アカ ヒゲ 5、アカシジ 5	24	多		0	0	6	
伊根町		0	0	0	0	アカヒゲ 1、ホソハリ1	2	少		0	0	4	
京丹後市峰山町		0	0	0	0	アカシジ 1	1	少		0	0	0	
京丹後市大宮町		0	0	0	0	シラホシ5、クモヘリ110、アカシジ 8	23	多		0	0	0	
京丹後市網野町		0	0	0	0	イネA4L14	14	多		0	0	0	
京丹後市丹後町		0	0	0	0		0	無		0	1	0	
京丹後市弥栄町		0	0	0	0	アカシジ 1	1	少		0	4	0	
京丹後市久美浜町		0	0	0	0		0	無		0	1	0	
丹後平均	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		7.2	中		0.0	0.7	1.9	
	R6	0.0	0.0	0.0	0.0		6.7	中		0.0	0.7	1.4	
府平均	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		5.4	中		0.00	0.9	1.8	
	R6	0.0	0.0	0.0	0.0		4.0	中		0.00	0.8	1.5	

(種名のカメムシ、カミカメは略)

表18 水稻巡回調査結果⑦（８月第３～４半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

地 点		斑点米カメムシ類									その他 カメムシ類	コバネ イナゴ	ササキ	その他
		シラホシ カメムシ	トゲ シラホシ カメムシ	ホソハラ カメムシ	クモヘリ カメムシ	アカヒゲ ホソミド リカスミカメ	アカシ カスミカメ	その他 斑点米カメムシ類	計	確認 ほ率				
京都市西京区		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
京都市伏見区		1	0	0	0	0	0	0	1	○	0	0	0	
久御山町		0	0	0	0	2	0	0	2	○	0	0	0	
八幡市		0	0	0	0	0	4	0	4	○	0	0	0	
精華町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	1	
木津川市		0	0	0	0	0	1	0	1	○	0	2	2	
山城平均	7 年	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	1.3	66.7	0.0	0.5	0.5	
	6 年	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	5.7	0.0	6.5	50.0	0.0	0.2	1.0	
亀岡市 1		3	0	1	0	0	1	0	5	○	0	0	0	
亀岡市 2		1	0	0	0	0	1	0	2	○	0	0	0	
京都市京北		1	0	2	0	0	0	0	3	○	0	3	0	
南丹市美山町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
南丹市園部町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	1	
南丹市八木町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
京丹波町 1		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
京丹波町 2		0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	0	
京丹波町 3		0	0	0	0	0	0	0	0		0	5	0	
南丹平均	7 年	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	33.3	0.0	1.3	0.1	
	6 年	0.0	0.3	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	37.5	0.0	2.4	0.5	
綾部市		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
福知山市長田		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	ヒメヒ [＊] 1
福知山市半田		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	
福知山市夜久野町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2	
福知山市大江町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	イナミズ [＊] 1
舞鶴市		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14	
中丹平均	7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	
	6 年	1.5	0.5	0.8	1.5	0.0	0.7	1.3	6.3	50.0	0.0	0.7	2.3	
宮津市		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
与謝野町		1	0	0	0	0	0	0	1	○	0	0	1	
伊根町		1	0	7	0	0	1	0	9	○	0	1	0	
京丹後市峰山町		0	0	1	0	0	5	0	6	○	0	1	0	
京丹後市大宮町		2	0	1	1	0	0	0	4	○	0	3	0	
京丹後市網野町		0	0	1	0	0	0	0	1	○	0	1	1	
京丹後市丹後町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
京丹後市弥栄町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
京丹後市久美浜町		0	0	0	0	0	0	0	0		0	9	0	
丹後平均	R7	0.4	0.0	1.1	0.1	0.0	0.7	0.0	2.3	55.6	0.0	1.7	0.2	
	R6	0.0	0.3	0.9	0.0	0.0	3.4	0.4	5.1	55.6	0.0	1.1	0.9	
府平均	R7	0.3	0.0	0.4	0.0	0.1	0.4	0.0	1.3	40.0	0.0	1.0	0.8	
	R6	0.3	0.3	0.6	0.5	0.1	2.3	0.4	4.5	48.3	0.0	1.1	1.1	