

イネ

病害虫の発生状況

- (1) 葉いもち
山城及び丹後では**平年比やや多く**、南丹では**平年比多く**、中丹では平年並の発生。府全体では**平年比多い発生**（表1）。
- (2) 穂いもち
南丹の一部ほ場で発生を認めたが、その他の地域では発生を認めていない（平年並）。府全体では平年並の発生（表2）。
- (3) 紋枯病
山城では発生を認めず（平年比やや少ない）、南丹では平年比少なく、中丹及び丹後では平年並の発生。府全体では平年比少ない発生（表3）。
- (4) 白葉枯病
発生を認めなかった（表13）。
- (5) 縞葉枯病
発生を認めなかった（表13）。
- (6) ばか苗病
発生を認めなかった。
- (7) ツマグロヨコバイ
本田見取り調査では**平年比やや多く**、本田すくい取り調査では平年並の発生（表4～5）。
- (8) セジロウンカ
本田見取り調査では平年並で、本田すくい取り調査で平年比少ない発生（表6～7）。
予察灯の初飛来は京田辺市（8月9日）で平年比やや遅く、亀岡市（7月6日）及び京丹後市（6月20日）で平年比やや早い。
- (9) トビイロウンカ
本田見取り調査では発生を認めていない（平年並）（表8）。
予察灯調査では、8月16日現在、誘殺を認めていない。
- (10) ニカメイガ
本田見取り調査では、丹後の一部ほ場で発生を認めた（表15）。
- (11) コブノメイガ
本田見取り調査では、南丹では発生を認めず（平年並）、山城、中丹及び丹後で**平年比やや多い発生**。府全体では**平年比やや多い発生**（表11, 15）。
- (12) 斑点米カメムシ類
本田すくい取り調査では、山城で平年並、南丹、中丹及び丹後で**平年比やや多い発生**。府全体では**平年比やや多い発生**。畦畔すくい取り調査では、山城及び中丹で**平年比やや多く**、南丹及び丹後で平年並の発生。府全体では**平年比やや多い発生**（表9～10）。
- (13) スクミリンゴガイ
山城及び南丹の一部ほ場で発生を認めた（表15）。
- (14) その他
コバネイナゴ及びササキリの発生を広域で認めた（表17～18）。

発病・発生程度別基準

		無	少	中	多	甚
葉いもち	発病度	0	1～20	21～40	41～70	71以上
穂いもち	発病穂率	0	1～10	11～30	31～60	61以上
紋枯病	発病度	0	1～20	21～40	41～70	71以上
セジロウンカ	25株当たり虫数	0	1～250	～1250	～2500	2501以上
	すくい取り虫数	0	1～100	101～300	301～700	701以上
ヒメトビウンカ	25株当たり虫数	0	1～50	～125	～250	251以上
	すくい取り虫数	0	1～10	11～30	31～100	101以上
ツマグロヨコバイ	25株当たり虫数	0	1～125	～375	～750	751以上
	すくい取り虫数	0	1～50	51～750	751～1500	1501以上
斑点米カメムシ類	すくい取り虫数(本田)	0	1～3	4～10	11～30	31以上
イネクロカメムシ	25株当たり虫数	0	1～5	6～10	11～25	25以上
ニカメイガ	被害株率	0	1～30	31～60	61～90	91以上
イネツトムシ	25株当たり幼虫数	0	1～10	11～20	21～40	41以上
フタオビコヤガ	25株当たり幼虫数	0	1～25	26～100	101～250	251以上
コブノメイガ	被害葉率	0	1～5	6～15	16～45	46以上

表1 葉いもち調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*	確認 ほ場率	発病 株率	発病 葉率*
R 8	66.7	13.3	0.48	88.9	20.4	2.14	33.3	1.3	0.04	66.7	8.9	0.56	66.7	11.7	0.91
平年比	やや多	並	やや多	多	多	多	並	並	並	やや多	やや多	やや多	多	やや多	多
	やや多			多			並			やや多			多		
平年	41.7	8.9	0.31	37.9	7.4	0.34	31.7	3.7	0.15	34.4	4.7	0.22	36.1	6.1	0.26
R 7	66.7	22.0	0.30	44.4	3.1	0.03	33.3	0.7	0.00	11.1	0.4	0.03	36.7	5.6	0.08
R 6	16.7	4.7	0.20	12.5	2.0	0.10	83.3	8.0	0.41	66.7	7.6	0.37	41.4	5.3	0.26
R 5	50.0	18.0	0.95	77.8	20.0	1.17	83.3	10.7	0.45	44.4	7.1	0.67	63.3	13.9	0.83
R 4	33.3	8.0	0.60	44.4	10.2	0.41	16.7	0.7	0.03	0.0	0.0	0.00	23.3	4.8	0.25
R 3	83.3	21.3	1.01	66.7	17.3	1.35	33.3	14.7	0.59	33.3	5.8	0.61	53.3	14.1	0.91
R 2	83.3	10.7	0.00	44.4	7.6	0.00	33.3	0.7	0.00	88.9	16.0	0.19	63.3	9.7	0.06
R 1	0.0	0.0	0.00	11.1	0.4	0.11	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	3.3	0.1	0.03
H30	16.7	0.0	0.00	44.4	7.6	0.20	16.7	0.0	0.00	55.6	5.3	0.25	36.7	3.9	0.13
H29	16.7	0.7	0.00	11.1	2.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.9	0.00
H28	50.0	3.3	0.04	22.2	2.7	0.06	16.7	1.3	0.01	44.4	4.4	0.08	33.3	3.1	0.05

※詳細は表12参照。 * 発病葉率は上位2葉調査

表2 穂いもち調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率	確認 ほ場率	発病 株率	発病 穂率
R 8	0.0	0.0	0.00	11.1	0.4	0.02	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	3.8	0.2	0.01
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	やや少	並	並
	並			並			並			並			並		
平年	10.0	0.4	0.02	20.0	2.3	0.16	15.0	1.1	0.13	7.8	0.4	0.04	13.6	1.2	0.10
R 7	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
R 6	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	33.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	7.7	0.0	0.00
R 5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	33.3	3.3	0.87	0.0	0.4	0.11	11.5	0.9	0.24
R 4	0.0	0.0	0.00	22.2	0.9	0.05	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	7.7	0.3	0.02
R 3	0.0	0.0	0.00	11.1	4.9	0.47	0.0	0.0	0.00	33.3	1.8	0.18	14.8	2.2	0.22
R 2	0.0	0.0	0.00	33.3	1.8	0.22	16.7	0.7	0.03	22.2	0.9	0.04	20.0	0.9	0.08
R 1	0.0	0.0	0.00	22.2	0.9	0.03	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	6.7	0.3	0.01
H30	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
H29	0.0	0.0	0.00	77.8	10.4	0.62	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	28.0	3.8	0.22
H28	100.0	4.0	0.20	33.3	3.6	0.23	66.7	7.3	0.41	22.2	0.9	0.07	40.0	3.5	0.21

※詳細は表12参照。

表3 紋枯病調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度	確認 ほ場率	発病 株率	発病 度
R 8	0.0	0.0	0.0	11.1	0.4	0.1	16.7	1.3	0.5	11.1	0.4	0.1	10.0	0.5	0.2
平年比	やや少	やや少	やや少	少	少	少	やや少	並	並	並	並	やや少	少	少	少
	やや少			少			並			並			少		
平年	31.7	6.6	1.8	36.8	6.2	1.8	36.7	5.1	1.3	12.2	1.4	0.4	28.4	4.6	1.3
R 7	0.0	0.0	0.0	22.2	2.7	0.7	50.0	4.7	1.7	0.0	0.0	0.0	16.7	1.7	0.5
R 6	0.0	0.0	0.0	12.5	2.5	1.3	16.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	6.9	0.8	0.4
R 5	0.0	0.0	0.0	33.3	9.3	2.8	16.7	1.3	0.3	11.1	0.4	0.1	16.7	3.2	0.9
R 4	50.0	5.3	1.3	44.4	7.7	2.2	33.3	1.3	0.3	11.1	1.3	0.3	33.3	4.0	1.1
R 3	33.3	6.0	1.5	22.2	5.8	1.7	16.7	1.3	0.3	22.2	3.6	0.9	23.3	4.3	1.1
R 2	50.0	14.7	3.7	22.2	11.1	3.1	33.3	3.3	0.8	33.3	3.1	1.0	33.3	7.9	2.1
R 1	33.3	5.3	1.3	44.4	10.2	2.6	66.7	14.7	3.7	11.1	2.7	0.7	36.7	7.9	2.0
H30	16.7	4.7	1.2	77.8	6.7	1.6	33.3	6.0	1.5	11.1	0.9	0.2	36.7	4.4	1.1
H29	66.7	15.3	4.0	66.7	4.4	1.3	50.0	16.0	4.0	11.1	1.3	0.3	46.7	8.0	2.1
H28	66.7	14.7	5.2	22.2	1.3	0.4	50.0	2.0	0.5	11.1	0.4	0.2	33.3	3.9	1.3

※詳細は表13参照。

表4 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 8	83.3	3.0	22.2	0.7	50.0	0.7	22.2	0.9	40.0	1.2
平年比	多	並	やや多	多	やや多	並	やや多	やや多	多	並
	やや多		やや多		やや多		やや多		やや多	
平年	55.6	8.7	12.2	0.2	30.0	0.8	13.3	0.7	24.4	2.2
R 7	50.0	1.5	11.1	0.1	50.0	0.7	0.0	0.0	20.0	0.5
R 6	33.3	0.8	0.0	0.0	33.3	0.7	0.0	0.0	13.8	0.3
R 5	16.7	3.0	0.0	0.0	16.7	0.2	33.3	0.4	16.7	0.8
R 4	50.0	0.8	11.1	0.7	16.7	0.7	0.0	0.0	16.7	0.5
R 3	50.0	1.5	11.1	0.1	33.3	1.0	11.1	0.1	23.3	0.6
R 2	66.7	9.7	11.1	0.4	50.0	1.8	11.1	0.1	30.0	2.5
R 1	66.7	6.2	22.2	0.3	33.3	1.0	0.0	0.0	26.7	1.5
H30	100.0	32.8	22.2	0.2	33.3	0.7	0.0	0.0	33.3	6.8
H29	50.0	8.3	11.1	0.4	0.0	0.0	33.3	0.7	23.3	2.0
H28	66.7	22.2	22.2	0.2	33.3	1.0	44.4	5.7	40.0	6.4

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表5 ツマグロヨコバイ調査結果（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 8	50.0	1.8	33.3	2.0	66.7	3.5	0.0	0.0	33.3	1.7
平年比	やや少	並	多	やや多	多	並	並	並	やや多	やや少
	やや少		やや多		やや多		並		並	
平年	63.3	29.0	8.9	2.1	26.7	4.3	17.8	2.7	26.1	8.1
R 7	50.0	0.8	11.1	0.9	16.7	0.8	0.0	0.0	16.7	0.6
R 6	66.7	2.8	0.0	0.0	16.7	14.5	11.1	0.3	20.7	3.6
R 5	66.7	1.2	11.1	0.1	33.3	0.3	11.1	4.1	26.7	1.6
R 4	83.3	6.3	11.1	3.6	16.7	0.5	0.0	0.0	23.3	2.4
R 3	33.3	0.3	0.0	0.0	33.3	0.8	0.0	0.0	13.3	0.2
R 2	66.7	34.7	11.1	13.3	16.7	2.8	0.0	0.0	20.0	11.5
R 1	66.7	1.0	11.1	0.1	16.7	9.2	44.4	4.9	33.3	3.5
H30	50.0	148.7	11.1	0.3	33.3	1.2	33.3	0.8	30.0	30.3
H29	83.3	44.2	0.0	0.0	33.3	1.2	33.3	6.1	33.3	10.9
H28	66.7	49.8	22.2	2.7	50.0	11.5	44.4	10.7	43.3	16.3

※詳細は表16参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表6 セジロウシカ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 8	66.7	12.5	44.4	1.1	33.3	0.7	22.2	5.2	40.0	4.5
平年比	並	並	やや多	並	少	少	並	やや多	並	並
	並		並		少		並		並	
平年	63.3	27.4	40.4	2.1	66.7	2.7	36.7	2.1	50.2	7.4
R 7	33.3	0.7	44.4	1.1	50.0	0.7	0.0	0.0	30.0	0.6
R 6	50.0	16.0	37.5	1.3	50.0	1.3	33.3	2.8	51.7	6.0
R 5	66.7	18.8	11.1	0.1	33.3	0.7	33.3	0.9	33.3	4.2
R 4	33.3	5.3	11.1	0.1	66.7	1.3	0.0	0.0	23.3	1.4
R 3	66.7	41.7	33.3	0.8	50.0	1.8	11.1	0.1	36.7	9.0
R 2	66.7	137.2	33.3	3.7	83.3	4.5	11.1	0.1	43.3	29.5
R 1	66.7	10.0	88.9	3.8	66.7	2.2	88.9	7.2	80.0	5.7
H30	83.3	4.0	33.3	0.9	66.7	1.5	44.4	1.2	53.3	1.7
H29	66.7	21.2	22.2	0.4	100.0	4.5	55.6	1.2	56.7	5.6
H28	100.0	19.3	88.9	8.3	100.0	8.7	88.9	7.0	93.3	10.2

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表7 セジロウカ調査結果（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 8	16.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	1.7	10.0	0.6
平年比	やや少	少	少	少	少	少	やや少	やや少	少	少
	少		少		少		やや少		少	
平年	45.0	12.3	38.8	5.2	58.3	10.9	60.0	10.9	48.5	9.4
R 7	16.7	0.7	11.1	0.2	16.7	1.3	22.2	1.7	16.7	1.0
R 6	50.0	7.3	87.5	10.0	50.0	3.3	55.6	1.8	44.8	5.3
R 5	50.0	1.7	55.6	5.7	33.3	2.0	44.4	3.1	46.7	3.4
R 4	16.7	0.5	22.2	0.8	66.7	1.7	0.0	0.0	23.3	0.7
R 3	50.0	7.2	33.3	1.9	16.7	0.2	22.2	0.6	30.0	2.2
R 2	66.7	67.8	33.3	2.6	83.3	11.0	77.8	13.4	63.3	20.6
R 1	33.3	0.8	0.0	0.0	16.7	0.8	88.9	21.6	36.7	6.8
H30	33.3	18.0	33.3	4.9	100.0	22.7	88.9	6.8	63.3	11.6
H29	33.3	2.8	11.1	0.6	100.0	27.7	100.0	22.9	60.0	13.1
H28	100.0	16.2	100.0	24.9	100.0	38.5	100.0	37.3	100.0	29.6

※詳細は表16参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表8 トビイロウカ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り・払い落とし調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	並		並		並		並		並	
平年	3.3	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.01
R 7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
R 2	33.3	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.10
R 1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
H30	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
H29	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
H28	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

※詳細は表14参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表9 斑点米カメムシ類調査結果（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 8	16.7	0.3	77.8	7.9	83.3	3.8	55.6	4.9	60.0	4.7
平年比	並	やや少	やや多	やや多	やや多	並	並	やや多	やや多	やや多
	並		やや多		やや多		やや多		やや多	
平年	28.3	1.1	50.4	2.9	61.7	3.2	57.8	2.8	50.5	2.6
R 7	33.3	0.5	88.9	7.9	66.7	3.7	66.7	7.2	66.7	5.4
R 6	16.7	0.3	37.5	3.1	83.3	5.3	77.8	6.7	55.2	4.0
R 5	33.3	0.5	22.2	0.7	50.0	4.0	77.8	4.0	46.7	2.3
R 4	33.3	3.7	44.4	1.6	83.3	1.5	44.4	1.9	50.0	2.1
R 3	33.3	1.3	66.7	2.3	66.7	1.7	55.6	1.2	56.7	1.7
R 2	0.0	0.0	66.7	9.4	50.0	5.3	22.2	0.3	36.7	4.0
R 1	16.7	0.2	11.1	0.1	50.0	1.7	66.7	4.2	36.7	1.7
H30	16.7	0.8	44.4	1.3	66.7	2.3	44.4	0.9	43.3	1.3
H29	33.3	2.5	55.6	0.8	66.7	5.0	77.8	1.1	60.0	2.1
H28	66.7	1.5	66.7	2.3	33.3	1.3	44.4	0.9	53.3	1.5

※詳細は表17参照。 * 虫数は、1調査当たりの平均値

表10 斑点米カメムシ類調査結果（8月第3～4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数	確認ほ場率	虫数
R 8	83.3	15.7	22.2	1.1	66.7	1.8	44.4	2.1	50.0	4.5
平年比	やや多	やや多	並	並	多	やや多	並	並	多	並
	やや多		並		やや多		並		やや多	
平年	68.3	10.0	28.2	1.1	30.0	1.7	41.1	2.4	40.5	3.4
R 7	66.7	1.3	33.3	1.1	0.0	0.0	55.6	2.3	40.0	1.3
R 6	50.0	6.5	37.5	1.5	50.0	6.3	55.6	5.1	48.3	4.5
R 5	83.3	2.2	11.1	0.1	0.0	0.0	55.6	1.2	36.7	0.8
R 4	66.7	6.2	33.3	0.9	50.0	1.3	22.2	0.2	40.0	1.8
R 3	66.7	4.7	11.1	0.1	16.7	0.5	22.2	0.2	26.7	1.1
R 2	50.0	21.0	44.4	1.6	50.0	4.3	44.4	6.1	46.7	7.4
R 1	50.0	15.0	22.2	0.4	50.0	1.3	55.6	5.3	43.3	5.0
H30	100.0	22.7	22.2	0.4	33.3	0.8	33.3	1.4	43.3	5.3
H29	83.3	13.3	33.3	0.6	33.3	1.3	33.3	1.3	43.3	3.5
H28	66.7	6.8	33.3	3.9	16.7	0.7	33.3	1.0	36.7	3.0

※詳細は表18参照。 * 虫数は、1調査地点当たりの平均値

表11 コブノメイガ調査結果（8月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城		南丹		中丹		丹後		京都府	
	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率	確認ほ場率	株率
R 8	50.0	2.0	0.0	0.0	16.7	0.7	22.2	0.0	20.0	0.5
平年比	やや多	やや多	並	並	やや多	やや多	やや多	並	やや多	やや多
	やや多		並		やや多		やや多		やや多	
平年	26.7	2.8	10.0	0.8	5.0	0.4	6.7	0.1	11.4	0.9
R 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 6	50.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.4	13.8	0.8
R 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 3	16.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.1
R 2	100.0	23.3	44.4	8.4	33.3	4.0	22.2	0.4	46.7	8.1
R 1	66.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	23.3	0.0
H30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H28	33.3	0.7	33.3	0.0	16.7	0.0	22.2	0.0	26.7	0.1

※詳細は表15参照。 * 上位2葉調査

表12 水稲巡回調査結果①（8月第3～4半旬：25株見取り調査）

地 点		葉いもち				穂いもち				備 考	
		発病 株率	発病 度	程 度	上位葉 発病 葉率	発病 株率	発病穂数		発病 穂率		程 度
							a	b			
京都市西京区		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京都市伏見区		4.0	1	少	0.14	－	－	－	－		出穂前
久御山町		0.0	0	無	0.00	－	－	－	－		出穂前
八幡市		0.0	0	無	0.00	－	－	－	－		出穂前、番外で葉いもち
精華町		28.0	7	少	2.55	－	－	－	－		出穂前
木津川市		48.0	12	少	0.17	－	－	－	－		出穂前
山城平均	R8	13.3	3.3	少	0.48	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	R7	22.0	5.5	少	0.30	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
亀岡市 1		4.0	1	少	0.21	0.0	0	0	0.00	無	
亀岡市 2		20.0	5	少	0.53	0.0	0	0	0.00	無	
京都市京北		96.0	24	中	16.12	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市美山町		4.0	1	少	0.17	0.0	0	0	0.00	無	
南丹市園部町		4.0	1	少	0.14	4.0	0	1	0.14	少	
南丹市八木町		16.0	4	少	0.59	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 1		20.0	5	少	1.11	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 2		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹波町 3		20.0	2	少	0.36	0.0	0	0	0.00	無	
南丹平均	R8	20.4	4.8	少	2.14	0.4	0.0	0.1	0.02	少	
	R7	3.1	0.8	少	0.03	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
綾部市		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市長田		4.0	1	少	0.12	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市半田		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市夜久野町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
福知山市大江町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
舞鶴市		4.0	1	少	0.14	0.0	0	0	0.00	無	
中丹平均	R8	1.3	0.3	少	0.04	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	R7	0.7	0.2	少	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
宮津市		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
与謝野町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
伊根町		12.0	3	少	0.74	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市峰山町		40.0	10	少	2.58	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市大宮町		16.0	4	少	0.97	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市網野町		4.0	1	少	0.16	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市丹後町		4.0	2	少	0.38	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市弥栄町		0.0	0	無	0.00	0.0	0	0	0.00	無	
京丹後市久美浜町		4.0	1	少	0.18	0.0	0	0	0.00	無	
丹後平均	R8	8.9	2.3	少	0.56	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
	R7	0.4	0.1	少	0.03	0.0	0.0	0.0	0.00	無	
府平均	R8	11.7	2.9	少	0.91	0.2	0.0	0.0	0.01	無	
	R7	5.6	1.4	少	0.08	0.0	0.0	0.0	0.00	無	

* 発病穂数

a：穂首部が発病して白穂、またはかなりの不稔

b：穂首部以外で一次枝梗以上が侵され、枯死

表13 水稻巡回調査結果②（8月第3～4半旬：25株見取り調査）

地 点		紋枯病							白葉枯病			縞葉枯病			その他
		発病 株率	発病程度				発病 度	程度	発病 株率	発病 度	程度	発病 株率	発病 度	程度	
			A	B	C	D									
京都市西京区		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京都市伏見区		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
久御山町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
八幡市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
精華町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
木津川市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
山城平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
亀岡市 1		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	ごま葉枯病
亀岡市 2		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京都市京北		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹市美山町		4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹市園部町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹市八木町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹波町 1		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹波町 2		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹波町 3		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
南丹平均	R8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
綾部市		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
福知山市長田		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	ごま葉枯病
福知山市半田		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
福知山市夜久野町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
福知山市大江町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
舞鶴市		8.0	0	0	1	1	3	少	0.0	0	無	0.0	0	無	
中丹平均	R8	1.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R7	4.7	0.2	0.0	0.0	1.0	1.7	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
宮津市		4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	無	0.0	0	無	ごま葉枯病
与謝野町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
伊根町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	ごま葉枯病
京丹後市峰山町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市大宮町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市網野町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市丹後町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市弥栄町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
京丹後市久美浜町		0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	無	0.0	0	無	
丹後平均	R8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
府平均	R8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	
	R7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	少	0.0	0.0	無	0.0	0.0	無	

表14 水稻巡回調査結果③（8月第3～4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

地 点		ツマグロヨコバイ					ヒメトビウンカ					セジロウンカ					トビイロウンカ					
		寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫	幼虫	計	程度	寄生 株率	成虫		幼虫	計	程度
																		長翅	短翅			
京都市西京区		4.0	0	1	1	少	4.0	0	1	1	少	4.0	1	0	1	少	0.0	0	0	0	0	無
京都市伏見区		4.0	1	0	1	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
久御山町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
八幡市		8.0	0	3	3	少	24.0	0	8	8	少	72.0	0	46	46	少	0.0	0	0	0	0	無
精華町		24.0	0	12	12	少	20.0	2	4	6	少	52.0	1	25	26	少	0.0	0	0	0	0	無
木津川市		4.0	0	1	1	少	20.0	1	5	6	少	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無
山城平均	R8	7.3	0.2	2.8	3.0	少	12.0	0.5	3.2	3.7	少	22.7	0.3	12.2	12.5	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	4.7	0.7	0.8	1.5	少	19.3	1.2	6.2	7.3	少	2.7	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市 1		0.0	0	0	0	無	4.0	1	0	1	少	4.0	1	0	1	少	0.0	0	0	0	0	無
亀岡市 2		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京都市京北		8.0	0	5	5	少	4.0	1	0	1	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無
南丹市美山町		0.0	0	0	0	無	8.0	2	0	2	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
南丹市園部町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
南丹市八木町		0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	20.0	0	7	7	少	0.0	0	0	0	0	無
京丹波町 1		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹波町 2		4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹波町 3		0.0	0	0	0	無	4.0	0	2	2	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	0	無
南丹平均	R8	1.3	0.0	0.7	0.7	少	2.7	0.4	0.3	0.8	少	3.6	0.1	1.0	1.1	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	0.4	0.1	0.0	0.1	少	12.9	0.9	4.1	5.0	少	4.0	0.2	0.9	1.1	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市		4.0	0	1	1	少	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
福知山市長田		0.0	0	0	0	無	28.0	1	9	10	少	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無
福知山市半田		8.0	1	1	2	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
福知山市夜久野町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	8.0	0	2	2	少	0.0	0	0	0	0	無
福知山市大江町		4.0	0	1	1	少	12.0	1	2	3	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
舞鶴市		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
中丹平均	R8	2.7	0.2	0.5	0.7	少	7.3	0.3	2.0	2.3	少	2.7	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	9.3	0.2	0.5	0.7	少	15.3	0.2	4.2	4.3	少	2.7	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市		0.0	0	0	0	無	4.0	1	0	1	少	4.0	0	3	3	少	0.0	0	0	0	0	無
与謝野町		0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
伊根町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市峰山町		4.0	0	1	1	少	16.0	0	4	4	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市大宮町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市網野町		4.0	6	1	7	少	16.0	2	3	5	少	64.0	6	38	44	少	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市丹後町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市弥栄町		0.0	0	0	0	無	4.0	0	1	1	少	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
京丹後市久美浜町		0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	無	0.0	0	0	0	0	無
丹後平均	R8	0.9	0.7	0.2	0.9	少	4.9	0.3	1.0	1.3	少	7.6	0.7	4.6	5.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	無	4.4	0.6	0.7	1.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R8	2.7	0.3	0.9	1.2	少	6.1	0.4	1.4	1.8	少	8.4	0.3	4.2	4.5	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	2.9	0.2	0.3	0.5	少	12.1	0.7	3.5	4.2	少	2.3	0.1	0.5	0.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無

表15 水稲巡回調査結果④（8月第3～4半旬：25株見取り調査）

地 点	イネツトムシ				ニカメイガ		アザヒコガ		コブノメイガ				イカリカミシ		イカメシ	スクミリンゴガイ		その他
	食害 株率	ツト 数	幼虫 数	程 度	被害 株率	程 度	幼虫 数	程 度	被害 葉率	程 度	被害 株率	本田 被害	虫数	程 度	虫数	25株 卵塊数	周辺 卵塊	
京都市西京区	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0	○	
京都市伏見区	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0	0	○	
久御山町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	1		
八幡市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.90	少	4.0	○	0	無	0	0		
精華町	12.0	4	1	少	0.0	無	0	無	0.98	少	8.0	○	0	無	0	0		
木津川市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0	○	
山城平均	R8	2.0	0.7	0.2	少	0.0	無	0.0	無	0.31	少	2.0	3/6	0.0	無	0.0	0.2	3/6
	R7	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.0	0.7	2/6
亀岡市 1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0	○	
亀岡市 2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
京都市京北	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	2	0		
南丹市美山町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
南丹市園部町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
南丹市八木町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0	○	
京丹波町 1	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	1	0		
京丹波町 2	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
京丹波町 3	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	5	0		
南丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/9	0.0	無	0.9	0.0	2/9
	R7	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/9	0.0	無	0.0	1.4	1/9
綾部市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
福知山市長田	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
福知山市半田	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
福知山市夜久野町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
福知山市大江町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
舞鶴市	4.0	1	0	無	0.0	無	0	無	0.14	少	4.0	○	0	無	0	0		
中丹平均	R8	0.7	0.2	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.02	少	0.7	1/6	0.0	無	0.0	0.0	0/6
	R7	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	無	0.00	無	0.0	0/6	0.0	無	0.0	0.0	0/6
宮津市	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0	0		
与謝野町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		番外：ニカメイガ
伊根町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
京丹後市峰山町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		シラホシ
京丹後市大宮町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		ヒョウタンガ 1
京丹後市網野町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
京丹後市丹後町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0	○	0	無	0	0		
京丹後市弥栄町	0.0	0	0	無	0.0	無	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
京丹後市久美浜町	0.0	0	0	無	4.0	少	0	無	0.00	無	0.0		0	無	0	0		
丹後平均	R8	0.0	0.0	0.0	無	0.4	少	0.0	無	0.00	無	0.0	2/9	1.0	少	0.0	0.0	0/9
	R7	0.0	0.0	0.0	無	0.9	少	0.0	無	0.00	無	0.0	0/9	1.0	少	0.0	0.0	0/9
府平均	R8	0.5	0.2	0.0	無	0.1	少	0.0	無	0.07	少	0.5	6/30	0.0	無	0.3	0.03	5/30
	R7	0.0	0.0	0.0	無	0.3	少	0.0	無	0.00	無	0.0	0/30	0.0	無	0.0	0.57	3/30

表16 水稲巡回調査結果⑤（8月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点		ツマグロヨコバイ				ヒメトビウンカ				セジロウンカ				トビイロウンカ				
		成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫	幼虫	計	程度	成虫		幼虫	計	程度
														長翅	短翅			
京都市西京区		2	4	6	少	4	1	5	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京都市伏見区		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
久御山町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
八幡市		0	0	0	無	0	1	1	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
精華町		4	0	4	少	3	2	5	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
木津川市		1	0	1	少	0	1	1	少	2	0	2	少	0	0	0	0	無
山城平均	R8	1.2	0.7	1.8	少	1.2	0.8	2.0	少	0.3	0.0	0.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	0.8	0.0	0.8	少	2.0	0.7	2.7	少	0.0	0.7	0.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
亀岡市 1		1	7	8	少	1	1	2	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
亀岡市 2		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京都市京北		4	5	9	少	0	3	3	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
南丹市美山町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
南丹市園部町		0	0	0	無	2	0	2	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
南丹市八木町		0	0	0	無	3	17	20	中	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹波町 1		1	0	1	少	2	0	2	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹波町 2		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹波町 3		0	0	0	無	1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
南丹平均	R8	0.7	1.3	2.0	少	1.0	2.3	3.3	少	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	0.1	0.8	0.9	少	1.7	5.8	7.4	少	0.0	0.2	0.2	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
綾部市		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
福知山市長田		2	0	2	少	2	7	9	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
福知山市半田		12	5	17	少	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
福知山市夜久野町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
福知山市大江町		1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
舞鶴市		1	0	1	少	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
中丹平均	R8	2.7	0.8	3.5	少	0.3	1.2	1.5	少	0.0	0.0	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	0.3	0.5	0.8	少	6.3	0.0	6.3	少	1.3	0.0	1.3	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
宮津市		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
与謝野町		0	0	0	無	1	2	3	少	0	0	0	無	0	0	0	0	無
伊根町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市峰山町		0	0	0	無	5	2	7	少	1	1	2	少	0	0	0	0	無
京丹後市大宮町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市網野町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市丹後町		0	0	0	無	0	3	3	少	10	3	13	少	0	0	0	0	無
京丹後市弥栄町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
京丹後市久美浜町		0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	無	0	0	0	0	無
丹後平均	R8	0.0	0.0	0.0	無	0.7	0.8	1.4	少	1.2	0.4	1.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	0.0	0.0	0.0	無	1.6	2.2	3.8	少	0.9	0.8	1.7	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
府平均	R8	1.0	0.7	1.7	少	0.8	1.3	2.1	少	0.4	0.1	0.6	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無
	R7	0.3	0.3	0.6	少	2.6	2.5	5.2	少	0.5	0.4	1.0	少	0.0	0.0	0.0	0.0	無

表17 水稲巡回調査結果⑥（８月第３～４半旬：本田20回振りすくい取り調査）

地 点		イナゴ		アゲハ		斑点米カメムシ類			その他カメムシ類		コバネ イナゴ	ササ キリ	その他
		幼虫	蛹	成虫	幼虫	種類	虫数	程度	種類	虫数			
京都市西京区		0	0	0	0	アカシジ 1、イナゴ	2	少		0	0	4	
京都市伏見区		0	0	0	0		0	無		0	1	0	
久御山町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
八幡市		0	0	0	0		0	無		0	0	1	
精華町		0	0	0	0		0	無		0	1	3	
木津川市		0	0	0	0		0	無		0	1	0	
山城平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.3	少		0.0	0.5	1.3	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5	少		0.0	0.5	0.5	
亀岡市 1		0	0	0	0	アカシジ 2	2	少		0	0	0	イナゴ 1
亀岡市 2		0	0	0	0	トゲシラホシ	1	少		0	0	0	
京都市京北		0	0	0	0	イナゴ、ホソバ、クモヘリ	3	少		0	1	1	
南丹市美山町		0	0	0	0	クモヘリ25、トゲシラホシ	26	多		0	0	0	
南丹市園部町		0	0	0	0	アカシジ 9	9	中		0	0	0	
南丹市八木町		0	0	0	0	トゲシラホシ	1	少		0	0	1	
京丹波町 1		0	0	0	0	イナゴ28、クモヘリ	29	多		0	1	3	
京丹波町 2		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹波町 3		0	0	0	0		0	無		0	1	1	
南丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		7.9	中		0.0	0.3	0.7	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		7.9	中		0.0	1.6	2.2	
綾部市		0	0	0	0	アカシジ 1	1	少		0	3	6	
福知山市長田		0	0	0	0		0	無		0	0	1	
福知山市半田		0	0	0	0	クモヘリ1、アカシジ 3	4	中		0	0	2	
福知山市夜久野町		0	0	0	0	ホソバ2	2	少		0	12	2	
福知山市大江町		0	0	0	0	アカシジ 15	15	多		0	3	4	
舞鶴市		0	0	0	0	クモヘリ	1	少		0	0	7	
中丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		3.8	少		0.0	3.0	3.7	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		3.7	少		0.0	0.8	2.2	
宮津市		0	0	0	0		0	無		0	2	1	
与謝野町		0	0	0	0	アカシジ 6	6	中		0	0	1	イナゴ 1
伊根町		0	0	0	0	クモヘリ17、シラホシ、ホソバ	19	多		0	2	2	
京丹後市峰山町		0	0	0	0	ホソバ2、アカシジ 1	3	少		0	0	3	
京丹後市大宮町		0	0	0	0	クモヘリ	1	少		0	2	0	
京丹後市網野町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹後市丹後町		0	0	0	0	アカシジ 15	15	多		0	2	0	
京丹後市弥栄町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹後市久美浜町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
丹後平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		4.9	中		0.0	0.9	0.8	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		7.2	中		0.0	0.7	1.9	
府平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		4.7	中		0.00	1.1	1.4	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		5.4	中		0.00	0.9	1.8	

(種名のカメシ、カミカミは略)

表18 水稲巡回調査結果⑦（8月第3～4半旬：畦畔20回振りすくい取り調査）

地 点		斑点米カメムシ類										その他 カメムシ類	コハネ イゴ	ササリ	その他	
		シラホシ カメムシ	トゲ シラホシ カメムシ	ホソハリ カメムシ	クモハリ カメムシ	ヒョウタ ンナガ カメムシ 類	アカヒゲ ホソミドリ カスミカメ	アカシジ カスミカメ	その他 斑点米カメムシ類	計	確認 比率					
京都市西京区		0	0	0	0	0	2	9		0	11	○	0	0	0	
京都市伏見区		0	0	0	0	0	2	0		0	2	○	0	6	0	
久御山町		2	0	1	0	0	17	0		0	20	○	0	0	10	ヒメトビ ²
八幡市		0	0	0	0	0	28	25		0	53	○	0	0	0	
精華町		0	0	0	0	0	8	0		0	8	○	0	2	3	ツマク ² R4、セジ ² R2
木津川市		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	2	5	ツマク ² R5、ヒメトビ ² 5
山城平均	R8	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	9.5	5.7		0.0	15.7	83.3	0.0	1.7	3.0	
	R7	0.2	0.0	0.0	0.0	—	0.3	0.8		0.0	1.3	66.7	0.0	0.5	0.5	
亀岡市 1		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
亀岡市 2		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
京都市京北		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
南丹市美山町		0	0	0	8	0	0	0		0	8	○	0	0	0	
南丹市園部町		0	0	0	0	0	0	2		0	2	○	0	0	0	
南丹市八木町		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
京丹波町 1		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
京丹波町 2		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	12	0	
京丹波町 3		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	1	1	
南丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2		0.0	1.1	22.2	0.0	1.4	0.1	
	R7	0.6	0.0	0.3	0.0	—	0.0	0.2		0.0	1.1	33.3	0.0	1.3	0.1	
綾部市		1	0	0	0	0	0	0		0	1	○	0	0	0	
福知山市長田		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
福知山市半田		1	0	0	0	0	0	0	ブチヒゲ ¹	1	2	○	0	2	7	
福知山市夜久野町		1	0	6	0	0	0	0		0	7	○	0	2	0	
福知山市大江町		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	1	0	
舞鶴市		0	1	0	0	0	0	0		0	1	○	0	0	5	
中丹平均	R8	0.5	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	1.8	66.7	0.0	0.8	2.0	
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	
宮津市		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	ヒメトビ ¹
与謝野町		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
伊根町		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
京丹後市峰山町		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
京丹後市大宮町		2	1	0	0	6	0	1		0	10	○	0	1	2	
京丹後市網野町		0	0	6	0	1	0	0		0	7	○	0	2	0	
京丹後市丹後町		0	0	0	0	0	0	1		0	1	○	0	0	0	セジ ² R3
京丹後市弥栄町		0	0	0	0	0	0	1		0	1	○	0	1	0	
京丹後市久美浜町		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	9	0	
丹後平均	R8	0.2	0.1	0.7	0.0	0.8	0.0	0.3		0.0	2.1	44.4	0.0	1.4	0.2	
	R7	0.4	0.0	1.1	0.1	—	0.0	0.7		0.0	2.3	55.6	0.0	1.7	0.2	
府平均	R8	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	1.9	1.3		0.0	4.5	50.0	0.0	1.4	1.1	
	R7	0.3	0.0	0.4	0.0	—	0.1	0.4		0.0	1.3	40.0	0.0	1.0	0.8	

発生指標 ●：好適条件

1・準好適条件1

3・準好適条件3

？・判定不能

社団法人 日本植物防疫協会

2. 準好適条件2

4・準好適条件4

一、好適条件なし

[illegible]

湿潤期間中の平均気温が20～25℃であり、湿潤時間が十分で、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温が20～25℃の範囲内

1. 湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が20℃未満

2. 湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が25℃以上

3. 湿潤時間は10時間以上だが、湿潤時間中の平均気温が15～25℃の範囲外

4. 湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数よりも短い

令和8年8月16日現在

予察灯（60W）へのトビイロウンカ初飛来日

年度	京田辺市	亀岡市	京丹後市
R 8	未飛来	未飛来	未飛来
R 7	9月23日	未飛来	9月10日
R 6	8月24日	9月25日	8月13日
R 5	9月20日	9月27日	9月21日
R 4	10月17日	未飛来	未飛来
R 3	未飛来	未飛来	8月26日
R 2	8月4日	8月6日	8月5日
R 1	8月8日	9月13日	8月21日
H30	未飛来	未飛来	8月29日
H29	未飛来	未飛来	未飛来
H28	未飛来	未飛来	未飛来
H27	未飛来	未飛来	未飛来
H26	9月1日	未飛来	7月14日
H25	8月20日	8月21日	8月21日
H24	未飛来	未飛来	9月10日
H23	9月10日	8月16日	未飛来
H22	9月13日	8月16日	9月11日
H21	8月20日	9月17日	8月21日
H20	未飛来	9月30日	8月23日
H19	10月10日	9月22日	8月30日
H18	7月16日	未飛来	9月5日
H17	9月13日	9月13日	7月12日
H16	未飛来	未飛来	7月30日
H15	8月28日	8月28日	8月28日
H14	未飛来	未飛来	未飛来
H13	未飛来	未飛来	未飛来
H12	未飛来	未飛来	未飛来
H11	9月25日	9月17日	7月11日
H10	7月3日	7月10日	6月28日
H 9	7月12日	8月21日	9月13日
H 8	9月5日	8月29日	未飛来
H 7	8月1日	8月18日	8月6日
H 6	未飛来	9月21日	9月6日
H 5	8月7日	8月1日	8月9日
H 4	7月27日	9月1日	7月11日
H 3	7月4日	6月26日	7月1日
H 2	6月23日	7月12日	7月16日

: 警報発表年
 : 注意報発表年（H10は多発年）
 : 防除所ニュースor技術情報発表年

令和8年8月16日現在

予察灯（60W）へのセジロウンカ初飛来日

年度	京田辺市	亀岡市	京丹後市
R 8	8月9日	7月6日	6月20日
	やや遅い	やや早い	やや早い
平年	7月4日	7月11日	6月27日
R 7	7月15日	7月31日	8月7日
R 6	7月2日	7月1日	6月20日
R 5	9月22日	8月13日	6月30日
R 4	6月30日	7月21日	7月12日
R 3	7月9日	7月2日	7月8日
R 2	8月2日	7月2日	6月11日
R 1	6月29日	8月19日	6月7日
H30	6月30日	7月13日	7月1日
H29	8月11日	8月24日	7月14日
H28	8月5日	10月1日	6月25日

太字 : 早発年（平年値より6日以上早い）

: 遅発年（平年値より6日以上遅い）、未飛来年

※ 平年値は7月6半旬までの飛来日より算出。

アカスジカスミカメラ寮灯(60W)半旬別勝敗数

調査場所:京田辺市

月・半旬		R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0.1	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
5	0	0.7	0	2	0	0	0	0	—	0	0	2	2
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6・1	0	0.2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	0.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
5	0	1.3	1	1	1	5	0	0	0	0	1	4	0
6	2	1.7	2	0	0	9	0	1	0	5	0	0	0
7・1	0	1.0	0	0	1	3	0	2	0	1	3	0	0
2	4	0.8	0	1	0	4	0	2	1	0	0	0	0
3	5	1.2	1	0	3	4	0	0	0	0	4	0	0
4	8	1.4	0	2	1	3	1	1	1	2	0	1	1
5	4	1.6	0	7	4	1	0	0	2	0	1	1	1
6	1	2.8	0	8	8	1	1	0	0	3	1	6	6
8・1	0	2.3	1	4	3	1	1	2	5	2	0	4	4
2	0	0.6	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0
3	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
4	0	0.2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	0.4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9・1	0	0.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0.4	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0.7	0	1	2	0	2	1	0	0	0	1	1
5	0	0.5	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0
6	0	0.8	0	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0
10・1	0	0.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4~8.3計	13	9.1	1	21	17	6	5	3	10	14	2	12	12
4~10月計	27	20.7	11	28	36	38	11	11	14	23	19	15	15


調査場所:亀岡市(農林センター)

月・半旬		R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	0.3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
4	6	1.7	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	1
5	0	1.8	5	0	0	3	0	0	2	0	2	6	6
6	2	1.9	3	0	0	2	1	2	3	4	4	0	0
6・1	0	1.2	0	0	1	0	1	8	1	1	0	0	0
2	2	0.8	0	0	2	0	1	0	2	3	0	0	0
3	12	3.2	2	3	17	2	0	8	0	0	0	0	0
4	51	6.8	21	17	6	12	1	2	2	4	2	1	1
5	24	19.7	84	27	10	19	3	21	11	13	9	0	0
6	24	29.7	50	13	26	59	26	21	49	33	20	0	0
7・1	12	20.0	54	21	21	40	26	4	17	12	5	3	3
2	59	14.3	28	39	23	11	11	5	11	9	3	0	0
3	3	13.3	61	18	32	7	2	4	4	5	0	0	0
4	34	13.9	36	12	67	4	11	2	2	5	0	0	0
5	12	17.5	41	28	88	3	6	0	4	5	0	0	0
6	8	9.6	24	13	43	8	4	1	3	0	0	0	0
8・1	1	8.2	17	8	26	5	6	3	13	1	3	0	0
2	11	6.4	22	7	5	3	5	4	12	0	6	0	0
3	8	4.6	10	2	8	4	0	3	6	1	12	0	0
4	8	3.6	8	5	8	1	3	6	1	0	4	0	0
5	5	5.5	20	8	4	0	16	2	0	0	5	0	0
6	7	7.2	39	7	13	0	8	1	0	0	4	0	0
9・1	0	4.5	24	2	11	0	4	1	1	0	2	0	0
2	4	4.8	16	24	4	0	2	0	0	1	1	0	0
3	3	6.5	30	12	14	0	2	0	1	0	0	0	0
4	4	12.4	21	69	31	0	4	0	2	0	1	0	0
5	3	3.3	12	6	6	3	0	2	0	2	2	0	0
6	4	5.4	4	19	13	3	1	0	7	0	5	2	2
10・1	2	2.0	2	2	1	4	3	2	1	2	2	1	1
2	0	1.4	0	3	0	0	3	0	0	4	3	1	1
3	0	0.5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.7	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0.3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6	0	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4~8.3計	74	60.2	150	70	237	27	32	13	40	12	21	0	0
4~10月計	319	233.1	647	371	482	200	146	103	152	112	102	16	16


調査場所:京丹後市(丹後農業研究所)

月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
4	4	1.1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	1.6	8	4	0	2	0	1	0	1	0	0
6	3	2.8	4	11	1	3	1	1	0	2	0	5
6・1	7	3.4	6	4	3	2	2	8	4	2	1	2
2	0	4.7	4	4	1	1	1	11	8	12	1	4
3	4	3.2	6	0	6	1	0	14	1	0	2	2
4	12	2.8	2	2	0	9	1	1	1	4	0	8
5	13	11.3	58	16	4	11	1	1	6	1	6	9
6	13	16.6	11	3	11	22	3	1	59	25	25	6
7・1	13	18.6	10	3	8	30	15	7	51	33	24	5
2	27	15.9	6	4	6	16	8	5	48	13	47	6
3	23	7.0	3	1	9	30	0	0	6	12	4	5
4	26	13.9	2	0	52	60	0	1	9	8	4	3
5	23	11.6	1	2	11	61	4	1	11	12	7	6
6	15	7.3	5	3	8	34	3	0	4	7	7	2
8・1	8	4.4	7	1	6	11	1	1	10	1	6	0
2	21	2.7	5	2	2	3	4	0	4	1	4	1
3	3	2.2	1	6	5	1	1	2	1	4	0	1
4	9	3.9	2	23	3	3	0	1	3	3	1	0
5	5	2.9	3	6	0	9	5	2	0	3	0	1
6	6	3.8	0	17	1	3	4	5	1	4	3	0
9・1	0	2.8	7	0	2	2	0	11	1	2	0	3
2	2	2.7	13	2	2	0	1	5	0	3	1	0
3	3	7.8	12	5	12	10	4	14	0	20	0	1
4	4	5.8	8	14	13	2	5	1	0	13	1	1
5	5	3.0	8	7	4	2	2	2	0	5	0	0
6	6	3.2	13	1	9	0	1	0	1	2	1	4
10・1	0	1.4	9	0	1	1	0	1	0	0	1	1
2	2	5.1	5	4	5	0	1	1	0	0	0	0
3	3	1.7	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0.6	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	5	0.5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4~8.3計	102	42.1	21	14	84	170	13	5	39	33	28	14
4~10月計	225	172.6	133	329	67	98	230	195	146	77	66	280

アカスジカスミカメ予察灯(60W)誘殺数
(京田辺市)



アカスジカスミカメ予察灯(60W)誘殺数
(亀岡市)



アカヒゲホソミドリカスミカメラ寮灯(60W)半旬別誘殺数
調査場所:京田辺市

		7.4～8.3計											発生量: 平年比やや多	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28		
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
4	0	0.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6・1	0	0.4	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0
2	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1
3	0	0.7	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3
4	0	1.5	2	0	1	0	2	0	1	1	5	3	3	3
5	0	1.6	3	0	1	2	0	3	0	0	3	4	4	4
6	0	1.9	3	0	0	2	2	2	0	8	2	7	2	2
7・1	0	2.9	4	1	3	1	0	1	8	2	9	3	3	3
2	0	2.7	2	0	0	0	0	0	3	2	16	2	2	2
3	5	3.2	1	0	1	0	0	0	3	9	16	2	2	2
4	5	1.1	1	2	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0
5	2	0.8	0	0	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0
6	1	1.9	2	0	5	0	2	0	0	4	4	2	2	2
8・1	0	1.9	2	1	1	0	0	0	5	8	1	1	1	1
2	0	0.6	0	1	3	0	0	0	0	1	0	1	1	1
3	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4	0	0.5	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
5	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	0	0.6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
9・1	0	0.4	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
3	0	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
5	0	0.2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10・1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0.1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7.4～8.3計	8	6.5	5	4	13	1	3	0	7	19	9	4	4	4
4～10月計	15	30.7	20	9	16	8	27	53	58	24	11	81		

調査場所:京岡市(農林センター)

		7.4～8.3計											発生量: 平年比やや多	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28		
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3	0	0.3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.9	5	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2	0.3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
6・1	5	1.3	2	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11	3.7	10	16	2	5	0	4	0	0	0	0	0	0
3	21	7.2	30	0	24	7	3	5	3	4	0	0	0	0
4	28	7.2	33	3	13	16	2	0	2	1	1	1	1	1
5	13	6.4	23	5	12	8	1	1	5	1	8	0	0	0
6	13	8.0	22	4	13	16	6	0	5	7	7	0	0	0
7・1	10	11.9	61	13	7	25	3	0	2	3	5	0	0	0
2	13	6.7	26	12	4	16	4	0	4	0	1	0	0	0
3	30	2.5	15	2	1	3	1	0	1	0	2	0	0	0
4	10	3.2	7	3	9	4	2	0	4	1	2	0	0	0
5	8	1.2	2	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1.8	8	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
8・1	0	1.1	0	3	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0
2	0	0.3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.4	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1.4	4	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	0	1.1	5	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
6	0	1.2	5	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9・1	0	1.2	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.7	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4	0	1.1	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1.1	2	5	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1
6	0	0.6	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10・1	0	0.4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0.3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4～8.3計	20	8.0	20	8	30	7	6	0	4	3	2	0	0	0
4～10月計	166	42.6	130	110	36	9	26	21	30	4	18	42		

調査場所:京丹後市(丹後農業研究所)

調査場所:京丹後市(丹後農業研究所)													7.4～8.3計			発生量:平年比多		
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28						
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6・1	3	0.7	0	0	3	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	2	2	
2	2	2.3	4	0	0	0	0	1	2	8	2	6	6	6	6	6	6	
3	3	6.2	16	1	3	1	5	7	0	2	1	26	26	26	26	26	26	
4	9	4.3	2	2	0	2	4	1	8	5	3	16	16	16	16	16	16	
5	6	6.8	34	3	0	1	0	0	5	1	11	13	13	13	13	13	13	
6	3	4.3	3	1	0	0	0	0	11	3	21	1	1	1	1	1	1	
7・1	1	3.0	3	0	1	0	4	3	4	4	10	10	10	10	10	10	10	
2	2	4.5	9	2	3	5	9	1	6	10	10	2	2	2	2	2	2	
3	8	2.2	1	1	2	4	2	0	3	6	1	10	10	10	10	10	10	
4	5	3.5	1	2	4	1	0	2	4	10	1	10	10	10	10	10	10	
5	3	2.7	0	0	0	0	1	0	10	11	2	3	3	3	3	3	3	
6	5	1.1	2	0	1	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	
8・1	2	1.1	1	0	3	2	0	0	3	0	1	1	1	1	1	1	1	
2	5	0.5	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	
3	3	0.8	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	4	4	4	4	
4	0	0.5	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
5	0	1.0	0	6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
9・1	0	0.5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
2	0	0.5	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
3	1	0.4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
4	0	0.6	0	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.5	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10・1	0	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4～8.3計	23	9.7	5	2	8	4	1	2	22	24	11	18	18	18	18	18	18	
4～10月計	60	50.0	77	28	25	18	30	21	56	64	74	107	107	107	107	107	107	

頭数

— R8
— 平年
- - - R7

月・半旬

頭数

70
60
50
40
30
20
10
0

— R8
— 平年
- - - R7

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月・半旬

市川市コノハダチドリ(日本コノハダチドリ)の頭数(市川市)

頭数

— R8
— 平年
- - - R7

月・半旬

イネカメムシ点灯(60W)半旬別調査数

調査場所: 京田辺市

		7.4～8.3計										発生量: 平年比やや多	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28	
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7・1	0	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1.1	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	1.8	5	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	3.1	10	19	0	1	0	0	1	0	0	0	0
6	1	3.9	13	37	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8・1	0	1.4	2	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0.2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0.3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	0.6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.9	0	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0
9・1	0	0.6	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4～8.3計	7	10.7	19	79	2	1	3	0	1	2	0	0	0
4～10月計	8	15.0	25	103	13	1	4	1	1	2	0	0	0


調査場所: 亀岡市(農林センター)

		7.4～8.3計										発生量: 平年並	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28	
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
7・1	0	1.5	1	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	4.9	12	17	7	10	3	0	0	0	0	0	0
3	6	2.8	11	1	14	1	0	0	0	0	0	0	1
4	12	13.9	38	33	29	7	30	0	2	0	0	0	0
5	9	12.8	18	49	30	7	17	0	7	0	0	0	0
6	10	7.6	22	22	15	2	7	0	6	0	2	0	0
8・1	13	13.6	23	38	16	20	12	6	11	6	4	0	0
2	8	17.2	14	27	15	38	11	28	14	12	4	9	0
3	0	10.3	6	13	23	23	10	14	6	6	2	0	0
4	0	4.2	4	11	4	14	1	2	3	3	2	0	0
5	0	6.9	6	19	7	8	22	6	0	3	0	0	0
6	0	5.5	5	5	14	6	9	6	2	5	3	0	0
9・1	0	2.3	4	2	1	5	1	10	0	0	0	0	0
2	0	0.7	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0
3	0	1.2	0	1	2	0	6	2	1	0	0	0	0
4	0	2.2	1	7	2	0	3	2	4	3	0	0	0
5	0	2.4	2	3	0	0	6	5	5	0	3	0	0
6	0	0.4	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
10・1	0	0.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4～8.3計	52	75.4	121	182	128	97	87	48	46	24	12	9	0
4～10月計	58	111.6	169	245	198	132	157	82	64	37	21	11	0


調査場所: 京丹後市(丹後農業研究所)

調査場所: 京丹後市(丹後農業研究所)													7.4～8.3計		発生量: 平年比やや多	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28				
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0.3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	4	0.6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	1	1.1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	7	0.2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	6	2.6	3	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8・1	3	1.0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0.3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	4	1.0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	4.3	6	33	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	2.5	3	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	3.2	5	16	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
9・1	0	1.8	7	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	1.2	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	1.4	0	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0.4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0.2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.4～8.3計	21	6.2	13	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4～10月計	25	22.3	49	128	38	7	1	0	0	0	0	0	0	0		

イネカメムシ予察灯(60W)誘殺数
(京田辺市)



イネカメムシ予察灯(60W)誘殺数
(亀岡市)



イネカメムシ予察灯(60W)誘殺数
(京丹後市)

