

カ ブ

病害虫発生状況

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | べと病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 2 | 軟腐病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 3 | 黒斑病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 4 | 白斑病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 5 | 白さび病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 6 | アブラムシ類 | 平年比やや多かった。 |
| 7 | コナガ | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 8 | ハモグリバエ類 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 9 | その他病害虫 | 右京区①でハイマダラノメイガ、同②でウワバ類、ハダニ類、峰山町の調査外株でシロイチモジヨトウの発生を認めた。 |

カブ調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）

調査日：令和７年９月11、12日

調査場所		べと病 発病株率 (%)	軟腐病 発病株率 (%)	黒斑病 発病株率 (%)	白斑病 発病株率 (%)	白さび病 発病株率 (%)	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類 被害株率 (%)
							有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	
京都市右京区 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1.20	8.0	0.00	0.0	0.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	241.20	28.0	0.00	0.0	0.0
京丹後市峰山町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
平 均	R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	80.80	12.0	0.00	0.0	0.0
	平年比	並	並	並	並	並	並	多	多	並	並	並
	平年	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.22	1.99	3.3	0.13	1.3	0.5
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	16.53	4.0	0.80	8.0	0.0
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.13	1.3	0.00	0.0	1.3
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	0.00	4.0	0.00	0.0	0.0
	R 3 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	1.00	3.0	0.00	0.0	0.0
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.27	2.7	0.0
	R 元年	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.10	1.30	6.0	0.20	2.0	0.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.00	1.3	0.00	0.0	0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.67	2.7	0.00	0.0	4.0
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
	H 2 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.80	0.30	10.7	0.00	0.0	0.0
発 生 ほ場率 (%)	R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7			0.0		0.0
	平年比	並	並	並	並	並	やや多			並		並
	平年	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	42.5			18.3		10.0
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7			100.0		0.0
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		33.3
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		0.0
	R 3 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0			0.0		0.0
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			33.3		0.0
	R 元年	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0			50.0		0.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		66.7
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0
	H 2 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			0.0		0.0